






(8599)











Course de Chirurgie.

gie.

Suite des Maladies de
l'organe de la vue.

Troisième Volume.

+
organiques

Des Affections⁺ des parties cons-
tituantes le globe de l'œil.

Toutes les membranes et humeurs
ayant une organisation et une structure
différentes peuvent être affectés
de maladies d'un caractère différent,
dont certaines peuvent ceindre
attaquer tout l'œil à la fois, tel que
le Cancer, l'Inflammation, suite d'un coup porté
sur l'œil. Sans en parler nous n'en
avons pas des affections de la Corne et de la rétine
en ce qu'on ne les connaît pas encore.

l'œil
l'œil

2 ce qui tient l'œil toute en égarement
pas été bien étudié.

Maladies de la conjonctive

l'inf.

Cette membrane qui recouvre
le devant de l'œil peut d'abord
affetée d'inf., qui quand elle a lieu cause
ce qu'on nomme ophtalmie, laquelle
peut englober de l'œil.

Il arrive quelquefois qu'elle a
en même temps lieu le devant de la
la paupière correspondante, ce qui donne
ce qu'on appelle l'œil de chat, ce qui produit des taches
de la paupière, ce qui le prouve, c'est que
lorsqu'ils approchent de l'œil, ils
présentent une tache blanche, qu'on
ne voit que par le mouvement.

Vessicule
à la membrane

Il est une autre Maladie qui
à la même attaque la conjonctive, laquelle
membrane paraît être d'un autre, parce qu'elle
même qu'elle n'a été. Et qu'on voit
un grand nombre de petites Vessicules, qui
développent de petites Vessicules, qui
contiennent des Pus, de même plus
car cela à lieu par la paupière, au cas
qu'on ne peut pas voir ces Vessicules, et
par conséquent qu'on ne peut pas les voir.

Je suis consulté il y a quelques jours avec
d'autres personnes, par un allaladin qui
venoit qu'on dit qu'il a autre il se débarrassait
de sa peau de petites verrues en quantité
assez considérables qui lorsqu'elles croissent ils
en sortent des poudres, ce que nous n'avons pas
vu dans le moment, qui malgré la grande
quantité de linge qu'il pouvoit changer
en tout toujours toujours, l'indiscret et par
son naturel extrêmement sale et malpropre.
Mais pas ainsi que ces autres personnes qui
celle leur, qui pour être traitée de même à leur
un plusieurs fois.

Les autres allaladins dont la conjonction est
susceptibles sont très multipliés, on les appelle
aussi ceux arétoires pour les différentes
dénominations qu'on leur a données. Elles sont
presque toutes la terminaison d'une infection
aiguë, ou bien chronique.

D'abord petite allalaire peut être le siège
de petites phlébites, qu'on même manie que
cela à lieu par la suite d'infection très forte, les phlébites
on ne peut point le voir directement, mais on peut
bien s'en apercevoir. De petites verrues peuvent encore
se former à la suite d'une infection qui n'est
absolument encore du pas une certaine quantité
lesquels ont une tendance à croître dans les
corne transparente, c'est qu'on voit qu'on leur
importance latente assez fréquemment si on les
de petit ulcère, ou qu'on n'en a pas encore qui
peuvent tellement croître qu'ils puissent se
faire dans la chambre antérieure.

Il est quatre autres maladies que le vulgaire confond sous le nom de Cic, qui cependant diffèrent entre elles, qui sont le ulcère - l'éléphant, le lécume et le pétégrion. Le lécume n'est point autrement parlé une maladie puis qu'on désigne sous ce nom les Cicatrices qui sont la suite d'une rupture de petite vérole, mais lui ont donné le nom d'éléphant, qui ne doit point être confondu avec, en que ce sont deux maladies différentes.

Indurcoma
ou cicatrice

1^{re} Les Cicatrices qui résultent de la guérison d'ulcères ou bien d'une plaie sont absolument impossibles à guérir, malgré l'attention qu'on y apporte au passage des rayons lumineux. On a dit qu'il fallait pour les guérir les enduire avec du camphre ou du beurre de mouton qui n'est en usage, mais qui est maintenant tombée en désuétude, parce qu'on ne voit guère en usage qui empêcherait que fait qu'à cause de cela, les cicatrices qui résultent de la guérison de la guérison de la guérison, qu'on les détruit avec un peu de cautère ou avec un peu de cautère.

2^o La conjonctive peut encore être atteinte d'une affection que l'on désigne sous le nom de lécume qui consiste dans de petites taches opaques, grisâtres qui interceptent le passage des rayons lumineux, qui semblent les empêcher de passer à travers, qui les occasionnent, et semblent ternir à l'état par conséquent de petite vérole, qui se voit dans la conjonctive. Il existe tout, au lieu même.

l'un seul aspect sont les faces distinguées &
autres affections De l'œil, que des Pathologistes
ont désigné sans le nom d'état d'ophtalmie variqueuse
Au moment les malades de cette affection
que pour l'empêcher de sortir de l'œil de
par l'ouverture, mais on a remarqué qu'il y avait
moins en face l'excision et non l'excision
section en travers par conséquent de deux ou
trois jours on voit la cicatrice arrivée bien
Au observons que l'on doit faire autant d'excision
qu'il y a d'ouvertures variqueuses.

30^e 11. 24. l'Auger qui peut aussi se faire
dans les petites taches de l'Auger
existantes dans le tissu cellulaire sans passer à
la conjonction sans pour cela la rupture, qui
interrompt le passage des rayons lumineux. Il
s'agit donc dans les cas d'une ophtalmie qui
est qd^e la petite Vierge existant dans certains
cas de l'œil, dont on ne connaît
point trop la nature, à moins qu'il ne soit
produit par l'épanchement d'un fluide. Il est
qd^e petit, tandis que d'autrefois il est de
grande étendue, par conséquent en même temps
en un plus ou moins grand nombre. L'entée
des fibres qui se point dans le siège de la corne
aucun inconvénient en résulte, mais il n'en est
pas ainsi lorsqu'il y a, qui en pareille
circonstance, interrompt tout passage des
rayons lumineux, qui qd^e il ne recouvre point
toute la pupille, permet encore de voir.
Malgré que cette maladie est d'ordinaire

6. il ne faut pas cependant se désespérer, surtout
lorsqu'elle existe chez les enfants, après quelques
années disparaître & par les lentes efforts de la
nature, sans doute à cause de l'énergie des ptes
vitales plus grandes chez eux. Sans le savoir
je aurais encore un individu qui ne reconstruit
point la corne transparente, on pourrait
parvenir encore à faire voir les maladies in
traitables l'opération que fit M^r. Dumoulin
dans ces derniers temps. Sans l'impossibilité de la
faire, on peut employer les moyens résolutifs
pour détruire une espèce de tumeur aux parties,
c'est dans cette vue qu'on emploie l'acétate
candy, la cire de Saint-Bras, dans l'intention
de détruire la portion de la corne
le lieu affecté et se résorber, ce qui est difficile
de croire, puisque si cela était il y en aurait
aussi l'effet ailleurs, qui est évident.

Second 11^e. Le Ptérygion qui consiste en une tumeur
& plusieurs opaque, arrivant à la corne transparente, ayant
une figure triangulaire, dont le sommet est dirigé
vers le centre de la corne, tandis que la base se
trouve du côté de l'axe des commissures d'une
figure blanchâtre jaunâtre interceptant le passage
des rayons lumineux, susceptible d'être résorbé
de l'atténuer. Il peut arriver spontanément, ou bien
la suite d'une inflammation aiguë et chronique,
pourrait rester stationnaire, ou bien on peut
acquiescer une très grande étendue. Sa présence
intercepte le passage des rayons lumineux. Les
des moyens irritants indigents peuvent être employés
qui peuvent dans certains cas arriver de leur effet.

produire qqe bons effets. Il y a cependant
dès maintenant ^{très} grand usage d'un
part parequin armé, qui ne s'emploie
n'empêche point son progrès, qu'il allant en
augmentant intercepte entièrement le passage
des rayons lumineux; D'autre part qu'il s'agit
souvent de la Cicatrice qui en résulterait
toujours moins considérable que lui.

Ulcère de la Corne et de la Sclérotique.

Il arrive sans qu'on sache à quel l'attribue
plus à la corne qu'à la sclérotique. Les causes Causes
qui y donnent lieu sont la présence d'un dépôt
dépôt qui se forme comme nous l'avons dit
entre la corne et la conjonctive, qui mis à
nu le contact y détermine sans doute à cause du
de l'air et de l'humidité lacrymale qui
se trouve habituellement sur la membrane
conjonctive par la lubrification des mouvements
des paupières, la présence de corps irritants sur
les yeux les déterminant, de même qu'ils
peuvent encore arriver spontanément.

Il est ord. une petite tumeur, qqe n'est pas
rare de la corne en présence d'une tumeur
qui la recouvre et dont le siège sur la papille
intercepte le passage des rayons lumineux. Il
pourrait pénétrer assez profondément, on finit
qqt. de permettre à l'humidité lacrymale de passer
de même qu'à l'air, en faisant évaporer par
sa présence d'une petite tumeur.

On pourrait se le faire l'idée de faire usage d'aillement
des caustiques et des pommades et de tout appliquer
toute fois que l'on croyait avoir mis un
remède à l'usage par la difficulté

8. qu'on a de l'usage maintenant. C'est pour cela qu'on
fait usage d'acétates, qui dans les cas où
on fait rien on doit avoir recours à l'usage
de caustiques; c'est de la pierre infernale, et
qu'elle ne peut avoir recours dans un très
si la maladie ne guérit point, malgré la
copieuse que présentent les états et qu'on
méthodes pour l'usage, l'est, ce qui est un espoir
de préservation, puisqu'on se attire dans les
cas de bons effets.

De la Procidence ou hernie de l'estomac

C'est la fois qu'il existe une petite ouverture
à la corne transparente il peut se former
qui existe dans la partie d'une petite partie
de la membrane iris on trouve celle des
causes qui y donnent lieu, sont de petites
ou d'une autre cause qui donne lieu à
division. Il est bon de faire remarquer
à confondre qq. cette espèce de hernie avec
le Hérnia qui sont cependant deux maladies
bien différentes.

Une fois la petite ouverture existante, elle
donne alors passage au l'estomac à l'intérieur acquies
qui étant fort que la corne s'affaît et se
rapproche de la partie postérieure de
l'est. se trouvant alors, proche l'iris, elle
pénètre dans l'ouverture qu'elle lui présente, et
passant de manière à former qu'elle est
petite tumeur du volume d'une tête de mouche
ce à quoi on la figure, la quelle est toujours
accompagnée d'un très fort. Lorsqu'il y
a qq. temps qu'elle dure, il est pas rare de la

peu contractée. D'hermine avec la circonstance
de l'insertion qui lui laisse passage. Lorsqu'elle
est un peu considérable cette hernie elle couvre giff.
tout l'abdomen. D'une manière qu'on ne puisse plus la
voir. giff. il y a changement de direction de
forme & de position par le poids, sans
par son déplacement en descendant.

Les anciens pathologistes n'ayant qu'un regard continu
qu'à la position d'iris strabisme. On fait la
réduction au moyen d'une légère compression
qu'ils exercent sur la petite tumeur de la même
manière que pour les viscères abdominaux qu'ils
font avec d'une légère saignée, qui est
d'autant plus aisée à faire qu'elle est moins
ancienne. parce qu'il n'y avait point encore
d'hermine; mais ce moyen est maintenant
abandonné. On a voulu encore en faire
l'excision, mais cela n'est admissible que dans
les cas où la partie proéminente, au lieu
contractée d'hermine, qui par conséquent est
ancienne. Il faudrait bien si l'on voulait
en prévenir l'engorgement, y appliquer la pierre
infusale, parce que le moyen consistant en
l'usage de l'huile affecté, alors il succèdera une
cicatrice qui s'élèvera à tant d'élévation;
On bien si on voulait en faire l'excision, appliquer
la pierre infusale immédiatement après.

Herminie de la Corde

Lorsqu'elle à lieu elle s'élève par les mêmes
signes que pour l'iris, sur qu'on ne se
distingue pas qui ne diffère seulement
que par son volume un peu plus considérable
Les causes qui y donnent lieu, sont de même.

Secundum
Pluviosum

que par un endosse une ouverture à la corne
Maximilien pathologistes ont considérée la petite
luminance qui tapisse la chambre antérieure
de l'œil comme susceptible de recevoir formes
hernie ce qui n'est point, parce que si cela étoit
on verrait l'humour quelle contient, qui ne se voit
que par la transpiration (humour aqueux) sortant
Viduo illud, toutes les fois qu'on ouvre l'œil
l'humour quelle forme, qui au moment de l'ouverture
Taureau et peu de temps après. Au cas plutôt quelle
La sclérotique forme par l'humour vitreux qui se passe à travers
dans le cas de la sclérotique
Délure

Il faut toujours il faut toutes les fois qu'il
succède à une plaie, l'action de la vision, puis
de la vision par la position horizontale de
l'œil et par une légère compression exercée
sur elle, dans le cas où elle est antérieure et apicale
il faut par conséquent, pour déterminer une sclérotique
différence commune à la sclérotique
et à la corne, à la Carcinome

Il y a tout infiniment varié au même temps
qu'elle présente les de l'œil dans l'œil
antérieure qui tantôt sont à large poignet
tantôt qui d'autrefois sont plus amples allongés
offrent le caractère fongueux d'autres l'acromie
par sa mollesse dans celle et la dureté dans
celle-ci, qui est jaunâtre grisâtre, acquiescent
dans certains cas une tumeur considérable, sans
qu'il y ait la surface de l'œil, qui le plus souvent
est la cause du cancer. On doit pour guérir
les cataractes en pratique l'excision, soit humoreuse
de la ligature, soit par les instruments tranchants
Il arrive, qu'il soit par négligence du malade

à faire ce qui convient pour la guérison, au
d'autrement, l'œil défigure en cause entièrement
qui exige alors qu'on en fasse l'amputation.
C'est dans quelle circonstance la faire
le plutôt possible afin de ménager le plus
qu'on peut de l'œil pour avoir un moyen
capable de fixer un œil artificiel, qui tendra
autant mieux qu'il sera plus considérable.

2^e Du Staphylome.

Ce nomme aussi un gonflement de la
cornée, ou même toute quelle forme une
élévation à la partie antérieure de l'œil en forme
de corne en même temps quelle a presque la
transparence et s'élève de l'iris, formant
une cavité à l'intérieur de laquelle on se
trouve contenue des humeurs et ses membranes
qui ont changé de caractère sur laquelle
il est impossible de se méprendre. Il survient
ordr. à une inflammation aiguë ou chronique,
à quel lieu spécialement chez les enfants, qui
quand cela arrive la corne présente le plus
d'épaisseur que chez l'adulte.

Cette maladie tend toujours à faire des
progrès laquelle cause une difformité
très grande, sans y remédier dès qu'on s'en
l'imbrasse ou qu'on s'en fait la ligature à sa
base, puis ensuite de l'écarter l'œil en enfonçant
d'une pincette, ce qui est abandonné à la
les humeurs dans cette circonstance reviennent.
Les praticiens modernes préfèrent de faire
une amputation à la partie inférieure au
moyen de l'écision, et même à toute la partie

12 antérieure dans une étendue considérable, qui
s'élève à par aux humeurs, en même temps
que par une détermination une inflammation qui cause
un malaise tout leil, qui par la déperdition
qui s'opère toute la partie affectée se
entraîne par elle. L'inflammation n'est pas de
trop grande, parce que si elle l'était, des
accidents plus graves la suivraient trop grande
inflammation qu'elle causerait, qui occasionnerait
de former petit à petit.

Seconda
14 Supplément

Affection de l'humeur aqueuse.
Il se parait point qu'elle soit susceptible de
affection particulière, il y a une l'hydropisie
de l'œil, mais elle ne parait pas être due qu'à
elle seule, l'humeur vitrée parait aussi y participer.
De l'hydropisie.

Envisageant que la cause de cette forme
par le trouble de l'humeur aqueuse, par son
mélange avec des pur, forment une
petite quantité qui s'étend sur les
larmes de la corne transparente qui antérieurement
dans la chambre antérieure. Les larmes
peuvent occasionner qu'il ne parait cause
que dans une lésion purulente, de la même
manière que cela a lieu pour les membranes
sécheresses, par suite d'une vive ophtalmie. On
le reconnaît à l'humeur aqueuse qui perd sa
transparence, qui se fait blanc à la partie inférieure
de la chambre antérieure de l'œil. Après la première
inflammation et par suite. L'antérieur des purulents
qui d'après cela est facile à distinguer d'avec

Calbugat qui commence à sa partie inférieure.
D. plus il présente l'aspect d'une tache blanche
disparaissant par interval lorsque l'ablation
est point considérable. Il arrive q. q. que
lorsque le fluide se trouve en grande quantité,
il donne lieu à une crevasse de la corne.

Au rapport jusqu'à dans ces derniers temps
pour le guérir d'après la punction de l'œil,
mais on ne doit point la pratiquer, par ce qu'on
la faisant cela blesse pas que l'ablation
parvenue en force s'élève d'ail. ainsi l'œil
doit d'autant plus être résisté sur cela, qu'il
a été prouvé dans ces derniers temps que
les humeurs de l'œil changeant de nature, peuvent
revêtir à leur état naturel, par le moyen de la
ablation opérant dans cet état. Il est guéri
que l'œil trop grande accumulation qui menacent
de rupture peut déterminer à la punction
affection de l'œil.

De l'écoulement

Au la l'écoulement confondue avec la catarrhe,
mais qui maintenant se être distinguée par les
différences, le quel consiste dans le défaut de
transparence de l'humour vitré, ce qui donne
lieu à l'écoulement des rayons lumineux
sur la rétine, d'un en résulta le défaut de la
vue.

Il dépend tantôt d'une simple accumulation d'humeurs
des humeurs tantôt du défaut de transparence
de l'humour vitré par une cause q. q. inconnue,
la répulsion de certains virus cal. les vénériens.

64 Au se reconnaît par l'inspection de l'œil
lignes qui n'est point toujours très facile de
distinguer de la cataracte, ce qui importe
cependant à l'usage, puisque dans l'ophtalmie
est incurable, tandis que dans l'autre au moins
elle se peut guérir. Voici ce qui doit être distingué
d'abord la pupille n'est point aussi dilatée que
dans la cataracte. L'humour vitré n'est point
aussi clair, elle est au contraire grisâtre, ce qui
à bien loin dans la cataracte, mais pas avec
uniformité, qui d'ailleurs se trouve avec les rayons
de la pupille, s'élargissant en s'éloignant d'un cercle
grisâtre à son pourtour, les ophtalmies ne sont
pas vides dans les temps d'obscurité et elle
peut à l'obscurité, ce qui tient dans celles-ci au
resserrement de l'iris produit par l'effet des
rayons lumineux sur elle, de manière que les
ophtalmies voyent dans la cataracte au contraire, ce
qui ne se voit point dans le glaucome.
C'est pourquoi cette ophtalmie est incurable, à moins qu'on
ne puisse mettre en usage les moyens capables
de combattre les fibres que l'air a bien des fois
qu'on a vu dans l'œil et que le chirurgien, par
ce qui on ne peut d'autant maintenant d'après
les observations qu'on rapporte à l'histoire de
Hydropisie de l'œil.
Elle résulte de l'augmentation de l'humour vitré
et de l'épaisseur, au lieu seulement de celle-ci,
qui peut suffire. Il paraît qu'entre le défaut
d'équilibre qui se trouve entre l'absorption et

L'oblation, il peut encore y avoir affection
dans la structure de la membrane hyalide,
q^qst. Membrane changée de nature.

Elle est le plus fréquente chez les enfants
que chez les adultes, puisque souvent il y a
tumeurs blanches chez les plaies du nez qui ne sont
pas guéries. Il paraît que cette hydropisie est due
à la détérioration de certains Vaisseaux, ou à l'écoulement
de capillaires.

Les personnes qui en sont affectées, ressentent
souvent des douleurs de cette Maladie, telle
que la difficulté de voir les objets, de même
qu'il y a des douleurs, qui paraissent être
d'oppression près des yeux les objets affectés
les yeux. C'est dans cette affection acquise
q^qst. un volume très considérable, augmenté de
l'écoulement de larmes qui en résultant au point
l'iris et se rapproche de la corne transparente,
pour la pression que lui forme l'humour vitré.

On fait q^qst. usage pour cette Maladie de l'écoulement
moyens irritants, ou d'émoussés, dit-on, l'écoulement,
qui dans tous les cas est presque incurable.
On pense ainsi guérir les Malades en touchant
le point blanc en un moyen dans certains
cas, afin d'émousser l'écoulement et d'écarter
celui qui le gêne afin que l'écoulement puisse
se réparer, ce qui se fait par des moyens
ou par une portion de son excès, ou par
un instrument tranchant tranchant, ou par
la fonction. On a fait celles-ci avec
un trépan, d'une aiguille à cataracte, ou
d'une simple pointe d'une lancette.

26 Le lieu pour la pratique est point d'impie
 les uns s'arrêtent au traversant la corne d'impie
 d'autres dans la sclérotique à deux lignes de
 celle-ci. Il en est de même du lieu. Les uns la
 font en bas, d'autres en dedans, puis d'autres en
 en dehors. On dit aussitôt d. p. pas faire sortir le
 Second cristallin, pour faire sortir l'humour vitré.
 De la Catarracte ou opacité du
 1^{er} cristallin.

C'est qu'en regardant la commencement du
 siècle d'après qu'on est parvenu à connaître
 au point de l'humour vitré sur la catarracte
 que l'on croyait être produite par une membrane
 flottante, vacillante, dans l'intérieur de l'œil, ce qui
 n'est point. Elle consiste dans l'opacité du
 cristallin, au lieu dans le défaut de transparence
 de la membrane que l'enveloppe, ce qui est fait
 de la membrane d'après cela, catarracte ~~du~~
 cristallin catarracte membraneux. Allant
 du cristallin, on distingue la cristalline
 proprement dite, puis celle qui est dite du défaut
 de transparence de l'humour de Morgagny qui
 l'enveloppe, ce qui la fait appeler catarracte de
 Morgagny. Comme le cristallin est susceptible
 de produire différents caractères, la cristalline
 a reçu des dénominations différentes lorsqu'elle
 est blanche, jaunâtre, grisâtre, présentant la forme
 ordinaire elle cause le nom de cristalline
 que l'on a cru dans certains cas être vain
 lorsqu'on a été trompé, sans que l'œil l'efface
 essentiellement, ce qui ne s'impose, c'est la double
 cristalline de l'attribution, désigné sur le nom

Le genre Sirène; lorsqu'on caresse et on
chuchote en ou au espère de flûte lactante X
ou la mamme lactante; lorsqu'il y tend, mais
qu'il ne l'ait point éclose. C'est une imitation
de l'écaille d'écaille d'écaille, ou si les
parties qu'il comprime sont absorbées, d'annonces
à l'écaille d'écaille, alors on la mamme lactante
vaillante.

La Cataracte peut arriver dans toutes
mannes de la vie, mais elle est spécialement
dans les personnes âgées, ainsi que chez les
enfants, mais surtout chez les personnes âgées
qui donnent lieu à des distinctions
prédisposantes et effrayantes. De ces personnes
instantanément, la vie se trouve dans les objets qui
demandent l'attention de la vue, la vue se trouve
travail sur des choses fines, tels que les fleurs
les bijoux, la vue se trouve dans les bijoux
ou au contraire pour les personnes âgées, qui
habitent les lieux ou les rayons solaires sont
très réfléchis, c'est pourquoi que la cataracte
est si commune dans les pays chauds. De même
que chez ceux qui voyagent pendant longtemps
les nègres. Pour les personnes âgées, la vue se trouve
sur la tête, les communications, la vue se trouve
de certains vices, en particulier de l'écaille
une inflammation intense.

De différentes causes, on peut dire qu'il y a
la même espèce de cataracte; il y en a qui
sont près à toute la tête, d'autres à la tête.

178 juger de l'opie existante. Dans certains cas
des lents rapprochés que nous fait le spectacle
commun nous allons l'opie. L'opie cependant
l'opie. C'est-à-dire elle s'opie. L'opie
l'opie que d'autrefois ce n'est plus l'opie
l'opie. Les lentes ne sont plus l'opie
prises de la lumière le n'est que l'opie
ils commencent d'abord à se rapprocher
comme nos traces d'un nuage, de l'opie
de certaines lentes, qui s'opie
augmente, ne voyent pas l'opie, lesquels
sont l'opie encore un peu l'opie
finissent entièrement par ne plus l'opie
soit par l'opie du cristallin soit par
l'opie concomitante de l'opie d'opie,
ou enfin par le défaut de la l'opie
de la pupille.

D'après cela j'ai à l'opie d'opie, il
est impossible de se méprendre l'opie
qui d'ailleurs est facile à reconnaître en l'opie
un corps l'opie, opie dans la l'opie
le cristallin qui s'opie accompagné d'un
cercle l'opie, ce qui prouve qu'il y a l'opie
l'opie concomitante de la l'opie
que l'un lui distingue, d'opie par les
lignes qui s'opie à l'opie, qui d'ailleurs
ne se trouve pas aussi l'opie de la pupille
que ce dernier. Il est bien de l'opie
chez les l'opie avec un l'opie qu'ils l'opie
assez l'opie, de manière que l'opie

alors on dirait qu'il existe une catarrhe
qu'ils ne voyent point, pendant ce cas pas.

Cette circonstance joint à la difficulté qu'il y
a à caractériser telle ou telle espèce de catarrhe
amblyopie des moments le praticien; que cela
n'est point absolument essentiel pour cette de
qui quand il la croit est et n'est pas
pour lui faire humeur qu'espécialement pour
le traitement, qu'il y fasse. En général
elle est presque toujours traitée d'hyperopie,
aristotélie chez les Néocrates et chez eux on elle
est causée par la rétrogression de l'acuité.
Même, un drame lorsqu'elle succède à une
ophtalmie.

Une autre cause qu'il faut qu'un
seul soit, joint tant les deux pour toutes au bout
d'un temps p. m. long; Une fois caractérisée
elle prouve la cécité.

Quantité de moyens ont été employés. Certainement
pour opérer les altérations; D'autres eux appartenant
à la médecine ils ne réussissent que dans
les cas où elle est produite par la rétrogression
de certain fibres, sans les de praticiens d'abord
en avoir en les combattant tel que les fibres.
Aussi ne constituent la seule ressource
qu'on ait est l'extinction du cristallin qui
se fait au moyen d'une opération.

Sans douter que grand les médicaments
Médicaments ne réussissent point que l'on doit
avoir recours à l'opacification de la Catarrhe.
L'écoulement
si on doit
toujours
opérer.

20 cependant cette dernière ne doit point être faite
dans tous les cas, il en qui se rapproche de
non ainsi que lorsque les personnes sont très âgées
qu'il ne faut point la pratiquer par conséquent
elle peut et doit être évitée. Les accidents qui
en résultent entraînent la perte du danger.
Il ne faut pas non plus la pratiquer dans les cas
de gonorrhée, de blennorrhée, parce que non
seulement on exposerait les malades au danger
de l'opération, mais en outre ils en retireraient
aucun avantage. On reconnaît cet état, au défaut
d'écoulement d'un urètre malade au point de
la cristalline au défaut de la dilatation et
contraction de la bourse qui agit plus à l'ordinaire
avant, ce qui tient au défaut de
sympathie qu'elle a plus avec la bourse, alors
qu'elle ne peut pas plus l'impression que pour
lui sauver les rayons lumineux. Il ne faudrait
point cependant au premier abord s'arrêter
de suite que la maladie existe (gonorrhée)
parce qu'il arrive souvent que les maladies précitées
occupent cet état sans qu'après cela ils ne
soient atteints, c'est à quoi est la question à faire
attention, la quel a donné un insuccès à
l'opération, en ce que la cristalline peut avoir acquis un
état de gonorrhée.
Il ne faut point non plus la pratiquer qu'
après tout est, lorsque les deux sont affectés
de Cataracte il faut mieux attendre qu'ils soient
tous les deux aussi avancés et non l'opération
celui ou on pourrait le faire, parce qu'il
a remarqué qu'elle réussit mieux dans
les cas où elle la faisait sur les deux à la fois.

au possèdent le faire, mais est dans le cas. 91
de l'on apprendrait qu'on attendait la
laine perde l'impetuosité des rayons lumineux,
qu'ils ne puissent point la ressembler par suite.
En fait attendre la suite que le cristallin
soit devenu opaque ou opaque sur le cristallin
anciens, ne s'attachant point pour cela des
qu'ils y mettaient; puisqu'ils s'attachent d'abord
que la cataracte était auparavant par l'opacité
du cristallin, lequel dans ce moment présente
une certaine solidité, qu'ensuite il se ramollit
liquide, c'est à dire plus ou moins reprenant
son ancien état, s'opacifiant qu'il est opaque
qu'ils opacifient. Mais il est bien de faire
connaître que précédant il ne se reproduit
différents temps dans la cataracte qu'une
fois qu'il présente le degré de solidité qu'il
a lorsqu'on opère son état de maturité.
Il se ramollit toujours, et ainsi de suite.
L'opacité que nous attachons une autre
fois, à ce dernier terme, que quand on
nous parle, on nous fait à l'opacité par la
aque nous avons vu, mais bien sûr
qu'il soit devenu plus opaque et qu'il ne
puisse plus distinguer les distinctions de la
lumière des ténèbres. Car il est bien évident
que quand l'op. il présente l'état de maturité.
ce qui constitue la cataracte laiteuse,
cette, jamais il ne s'opacifie solidement.
Lorsqu'on est en opacité l'opacité ou y prépare
de la suite, on doit y préparer l'opacité. Haut d'opacité
de l'opacité.

[illegible]

24. En suivant la méthode chronologique pour la
 catastrophe, nous devons passer d'abord de la
 De celle par abaissement, puis de celle par extraction
 par extraction mais celle-ci est la même employée maintenant
 nous aimons mieux nous passer qu'à présent, nous
 disons seulement que de tout les instruments
 qu'elle présente qui ont fait imaginer celle
 à Daxiel, qui n'est qu'une modification de
 ce qu'on faisait lorsque la cristalline se trouvait
 dans la chambre antérieure, qui d'aurait été
 à son extraction toutes les fois qu'il y avait
 presque aussitôt qu'il l'en eût retirée. Elle fut mise
 en pratique, après l'avoir lui-même examiné
 lequel en donna le premier la méthode
 son succès. D'après cela si fut le change
 puisque sur deux opérations qui avaient été
 catastrophe, il en est restée pas deux qui sont
 la même aussi est-ce pour cela que nous ne
 parlerons pas chronologiquement de tous les
 procédés mis en usage puisque nous en tenons
 un plus de l'autre. Et l'autre que son seul
 temps de l'opération, car bien même quand dans
 le seul instrument.

Nous passerons maintenant de les rapporter
 Groupes de l'opération en quatre temps. 1^o à la fixation de la capsule
 de l'œil. 2^o à l'incision de la corne transparente
 3^o à l'ouverture de la capsule cristalline,
 4^o enfin à l'extraction de la cristalline.
 1^o De fixation de l'œil pour qu'il ne bouge pas
 afin que l'on fasse plus sûrement la
 incision de la corne transparente, que l'on
 ne puisse par l'iris et qu'on ne l'ait point
 de l'œil... Enfin tout les praticiens sachant
 point toujours fixé, il n'est que ne l'ait point

pas, tel que l'est celui, si vous le voulez - 25
incassablement qu'un bon reproche, et
l'association de l'homme libre qui a une tunique
à l'autre avant la cristalline, qui quand elle
arrive, produit presque toujours la cécité.

Les yeux, au contraire, ont une
méthode et un ordre précis, ce qui n'a point
toujours été fait de la même manière. En effet
il y en a qui se servent de petits instruments
qui sont des instruments que l'on introduit
entre les paupières, et qui saisissent la bête de
la lèvre. D'autres d'une manière d'opérer qui
élève la paupière supérieure, et même
l'empêche qu'elle ne baisse l'inférieure avec le doigt
et que l'éponge. Une sorte de loup
est aussi employé par M. Guérin, qu'on
trouve dans le monde. De l'instrument commun
le nom de Lapin, ou de l'autre qui la
saisit, qui a été également employé.

On voit encore souvent bien la bête de l'opérer
à l'œil avec le doigt, ou avec le doigt, par
l'introduction des paupières, soit à cette fin, que
l'on veut faire l'opération de la bête de l'opérer
supérieure, tandis que l'inférieure est maintenue
avec le doigt indicateur de la main opposée.
avec la quelle le doigt opère.
2. Une fois l'œil fait, on divise la corne par la cécité
de la bête, on agit toujours avec la cécité
en ayant l'œil ne fait point trop d'effort, car
on ne peut pas le faire diminuer au point de
compression que la division est faite, par
cette fin de l'homme libre, par la cécité
que l'on fait, soit à l'œil, que la cécité
qui en résulte n'est point tout à fait adhérente.

26 au centre de la corne transparente après avoir
que les cicatrices qui résulteraient de la réunion
avec les parties voisines n'interceptent le
passage des rayons lumineux, en produisant de
l'obscurité sous le voile de l'écaille. La force de
cette membrane accroit de lui pour le faire
naître peut toujours être la même, on peut le
faire dans trois endroits différents, en haut, en
bas, puis obliquement de dehors en dedans.

La supériorité n'a jamais été faite, il est
qu'il s'agit par elle, qu'elle pratiquerait de
manière à avoir son point fixe du côté de la
partie supérieure; l'inférieure au contraire
présente l'inverse; l'oblique se pratique de bas
en haut. De ces trois manières, c'est l'oblique qui
présente le moins d'inconvénients qui est la
plus mise en usage. Elle peut se rapporter à la
manière de la cicatrice qui résulteraient de
les deux autres; Vis à vis la pupille qui est plus
assise, de plus que les rayons de la pupille
supérieure ne sont que faibles, son application
est plus grande qu'elle est, mais, qu'elle est plus
et dans ce cas le cristallin ne pouvant point être
grandissant, on conçoit au bout, son point
dans celui-ci, l'écaille.

Pour faire la division de la corne, on ne
s'est point toujours servi de mêmes instruments
aussi on a vu cela sans inconvénient, que non
pouvant les mêmes de l'opération de la
pour cela indiquer la manière de diviser la
Membrane, ce qui n'a point point fin à l'écaille, et
pour l'opération de l'écaille.

Les instruments au premier procédé qui est
celui de Daniel étoient au nombre de quatre,

288 Un nouveau Soutien de l'oeil d'un
instrument qui étoit pincé et plat en un
temps, qui présentait une petite ouverture
la place d'où fut qu'on y introduisoit qui se
portait sur le lambeau en même temps
pratiquait la division qui fut pratiquée
alors par un pinceau, malgré la
qu'il étoit de pincer l'oeil.
C'est un instrument qui présentait
ouverture à sa face antérieure, dans laquelle
étoit contenue une espèce de lance qui frottoit
sur le globe de l'oeil et divisait la corne.
C'est un chirurgien d'assigner d'une espèce
de pique montée sur un manche suffisamment
long, dont le côté est courbé pour s'accommoder
à la faiblesse que l'on a le nez, qui sert à la
pincer dans la corne transparente d'un côté
grand angle, en même temps que de l'autre
est à l'opposé, qui doit servir à cette pincée
mal placée elle ne courroit que pour la
en qui l'oeil de l'oeil).

Le second a enfin inventé dans ces derniers temps,
un instrument qui agit en même temps
la pincée de l'oeil et qui divise la corne.
C'est un instrument qui agit en même temps
l'autre, qui agit au moyen de l'oeil
l'autre l'opération de la corne ne peut
point lors même que la corne est bien divisée
tandis que d'autrefois le contraire arrivoit,
malgré qu'elle fût mal cegée par une
et la pincée n'est pas inopérante, que l'on
ne peut pas dire.
C'est un instrument de la corne pratiquée au point
de la capsule de la capsule cristalline qui se fait
au moyen d'un petit instrument inventé par

Sage, appelée Ophtalmie qui ressemble Cap. 99
au pharyngotomie. D'une larme de David, au
Chen du vent. Il en est qui ne s'insistent
point, par exemple le cristallin tout q. q. q.
lui-même par une simple pression exercée
sur l'œil après avoir divisé la corne au
moyen de la rapture de la capsule cristalline,
mais il faut en général avoir du service
La corne est un de ceux qui disoit que l'on
pourrait s'en passer, jusqu'à ce qu'il y eut
cristallin. Il faut savoir que la corne est un moyen
que cette dernière est divisée et est prêt à d'une simple
sortie. Après de sorte de cristallin. Les plus premiers
est, il présente une incision, c'est qu'on
sachant pas bien directement la profondeur
jusqu'où il faut le porter il s'agit q. q. q. q.
divise un peu de cristallin, ce qui rend son
extraction au plus difficile, le quel est
l'on s'en sert comme on le fait. Si on
divise la capsule cristalline on même s'en
qu'il ouvrirait la corne transparente s'en
commence qu'il se présente. Il se sert
parce cela d'une assistance, commençant par
diviser la corne. Etant divisée la pointe
dans la pupille, entre la capsule cristalline
et la sclérotique, l'ophtalmie il retire la pupille
l'instrument en le ramenant dans la chambre
antérieure puis finissant la chambre de sclérotique.
Après l'opération de la capsule cristalline, il faut sortir du
sac cristallin le cristallin. q. q. q. il sort de lui cristallin
même par la simple extraction de la membrane
hyaloïde. En supposant qu'il s'agit d'un
on doit en dilater la sortie par la simple
pression que l'on exerce sur l'œil en la
pression légèrement, si malgré cela il s'agit

sur la tunique) Vient à fait, on saisit le
Cristallin, on distille la membrane cristalline,
avec, on le fait passer sous le lambeau,
divisé au grand attrait d'un du Cristallin,
d'une légère friction sur le globe de l'œil et les
paupières.

Lorsqu'on a deux yeux à opérer deux ou trois fois
personne doit en faire l'un après l'autre,
au lieu d'être les deux ensemble, c'est à dire
campusueu d'abord par division la cornea
haut, puis ensuite de venir à l'autre immédiat
après, sans faire tant de suite de suite le
Cristallin. Cette dernière manœuvre est celle
mise en usage par les Oculistes indiens,
et d'ailleurs par eux, c'est par conséquent obligé
de faire le plus d'abord d. petites frictions sur
l'œil, pour faire sortir le cristallin qui
est en circonstance qui le fatigue; qui
agissant sur l'autre d'une autre apparence, peut
être suivie d'accidents; ensuite de l'opération
espérant voir aussitôt qu'il est opéré, ne
fluyant pas dans que cas, ne vaudrait point
être plus qu'un Supra, ce qui sont à l'opérateur
des soins inévitables bien légers.

La Cristallin étant sorti, il arrive qu'il est accompagné
que la membrane cristalline est devenue enroulée les
apague, de manière à ne point laisser passer aucun
les rayons lumineux, et par conséquent obscurant
à ce qu'on les verra chasser dans l'œil avec
une furie pour les extraire; mais on a
scusé dans ces derniers temps l'incertitude
qu'il y avait de le faire par ce moyen. L'opération
se peut être bien plus la globe oculaire.
Maintenant on les laisse, et on ne les opère.

Ne sont considérables & je dis lorsqu'ils sont, parce
qu'ils accompagnent les portions de
de la membrane cristalline, qu'on les attrait
sans cela on les laisse, parce qu'ils s'opposent
à penser qu'ils étoient détachés dans leur
origine et que la nature en fait l'objet
dans le cas où on veut les extraire, on
se sert de petites pincettes pour aller les saisir
au même temps que l'on sert de l'aiguille
cataracte pour les détacher au lieu d'y
Pincettes: c'est en général ce qui constitue la
difficulté de l'opération de la cataracte.
Si on n'a pu s'en faire à l'insu d'une dissolution
Lorsqu'ils sont toujours en contact avec la
Vitreuse, on pourrait se servir de l'aiguille
à cataracte de sape et les arracher
de la chambre antérieure, bien qu'on s'en serve
qu'ils se dissolvent le mieux.

Quoique la cataracte par contraction, ne
s'accompagne pas d'augmentation de la cataracte, mais
de la cataracte par contraction de la cataracte, qui est la
par contraction, cependant elle peut par elle-même
suivre d'augmentation. S'il y a une cataracte
quelque soit l'origine de la cataracte, mais
qui quand elle est gâtée, une hémorragie
est le résultat; l'inflammation peut être
la suite; qui peut déterminer la fonte
de l'œil; qui peut être détachée dans la grande
circonférence par la cristalline, il est facile
dans ce cas l'opérateur a ce qu'il veut pour
par cette ouverture, il faut arracher la
petite partie. Après l'opération de la cristalline
l'œil peut se présenter à l'opérateur, alors on

conduit comme il a été dit ailleurs; q^u le
corps vitré sort avant le cristallin, ~~et se résout~~
abandonne l'opération pour en la pratiquer q^uque
temps après, au moins que tout de suite au
moment où elle cherche le cristallin avec l'épingle
à Cataracte. D. Boerhaave assure qu'il n'y a point
exercice de pression sur l'œil. A l'autrefois une
partie du humeur vitré sort en même temps que
le cristallin, qui est alors un événement
factuel qui peut servir à la rupture de la
membrane hyaloïde, ou à l'inflammation qui
survient; quand à l'humeur elle se reproduit
facilement si elle arrive au place le lambeau
sur de l'œil qu'il doit occuper et la p^{re}st^{re}
le collade dans une situation horizontale. Il est
des cas q^uest malgré que cette humeur se coule
que l'opération réussit; mais le plus commun
est qu'elle résulte une inflammation de l'œil et l'œil se
conserve en un mauvais état.
L'opération q^uest l'opération soit pratiquée, ce qui fait
voici la conduite qu'il y a à tenir, D'après avoir opéré
il ne faut point laisser le collade examiner
les sujets, parce que leur impression peut
être recueillie et organe déterminé q^uest une
inflammation violente, alors on rapproche
convenablement les paupières après avoir
appliqué le lambeau sur la corne. Il est
indiqué d'y appliquer un peu topique, q^uest
aurait pour décongestionner d'y appliquer q^uest
lotion de liqueurs résolutive, telle que l'eau
végétale minérale, de stasie, de Rose. Si on
se dispense au point de constater d'y appliquer
l'emplâtre ou l'huile catartique dans les cas où
on aurait opéré qui est un seul œil.

Il faudroit également les caupion fait le d'imp
suis l'usage le + estalade dans un lieu
à l'heure et on ne le horizontalment. Il est mis
à la d'acte pendant 7 jours jure et la t'acte
causent et est subordonné aux accidents
surviennent et il ne survient qu'un légion
d'infirmité pour prouver l'adhérence du
couléau, les douleurs sont plus considérables
si on examine l'ail, au bout de 7 jours
on voit que la t'acte est plus adhérente
les caupion de l'homme a qu'une, et on
laisse le malade toujours dans la même
d'abord de cinq à six jours on peut l'ail
estalade appeler la l'acte, et on le
de si facile.

Malgré qu'il ne soit point sur un d'imp
il peut se faire que l'opération ne réussisse
ce qui peut tenir au d'la coïncidence d'un
ou il peut arriver malgré que la d'acte
soit irrémédiable, que les estalades causent
la l'acte des t'actes, ce qui peut d'acte
au d'acte de coïncidence de l'homme d'acte
que les rayons lumineux ne sont pas
réfractés pour faire une impression sur la
d'acte, les estalades dans cette circonstance
commune dans la pratique exposée pour
la d'acte a partie des l'actes d'acte
ce qui d'acte. En fait cette opération peut ne pas
à ce que l'acte d'acte du d'acte d'acte d'acte
ne réussisse. Selon l'acte ce qui d'acte d'acte
point une d'acte d'acte, qu'il y a
l'acte d'acte d'acte, qu'il y a
d'acte que la d'acte d'acte. Si elle
pas les t'actes d'acte, les d'acte
général, les d'acte d'acte. Quand elle d'acte

tant le globe de l'œil il ya des dardures très
vives, ce qui se porte à une cataracte de second
aussi qu'un gloire, mais qd'il se convertit
en un foyer purulent, alors soit qu'on en
fasse l'excision ou qu'elle s'épave spontanément
l'œil se guérit et se convertit le plus ord. en
un moyen.

Leçon du
11 floride

Opération de la Cataracte par Abaissement

Elle consiste à déplacer la cristalline de l'œil
de l'œil, pour le placer dans un endroit où
il ne puisse point interrompre les rayons
lucifères, cette méthode est la plus ancienne
que celle par extraction, elle se pratique
qu'elle ne consistait point de l'abaissement. Dans le
déplacement de la cristalline, mais encore dans la
parité de sa dissolution, ainsi que celle de
la membrane, et il a appliqué cette
espèce d'opération à toutes les cataractes comme
par l'abaissement, cataractes au membraneux.

Anciennement on se servait pour la pratique
d'aiguille très variées, mais celle qui est en
usage en dernier lieu s'approchant
de celle de la sonde de l'œil par faitement
droite, se pratique de la même
manière que pour celle par extraction d'ord. commun.
L'œil se voit librement et l'œil se voit à une
la sclérotique à une ligne et demie de l'œil
ensemble avec la sclérotique, à l'angle externe
de l'œil et l'on fait passer la pointe au
delà de la cristalline, s'il est parvenu au centre
la direction de manière que ce soit la partie
placée qui s'appelle son lieu, puis pressant

36 Pour la pointe en relevant la manche il
que la capsule se rompt & quelle laisse passer
le cristallin mais qd elle ne se rompt pas elle
distend et le cristallin ~~reste~~ ^{reste} en sa place qui est
et l'on retire l'instrument. Par cette maniere
quand le cristallin ~~est~~ ^{est} devenu comme une ligne
telle que dans la Cataracte l'aituse il en
résultait un mélange des humeurs de l'œil.
Les inconvénients Sans doute aussi que pendant longtemps
on a pris ~~la~~ ^{la} ~~retention~~ ^{retention} du cristallin dans la
naturelle pour une cataracte secondaire et qu'on
pourrait reprendre sa place naturelle. Quoiqu'il
soit la capsule ne s'efface que distendue, il en résulterait
encore de même si le cristallin n'était point
hors de la capsule, c'est ~~elle~~ ^{elle} ~~repousse~~ ^{repousse} la pupille
puissant qui l'ait fait abandonner, joint qd
l'inconvénient est tel que la piqure des nerfs
tendons et des apophyses. En évitant l'op-
er. se quelle ne conviendrait que dans la cataracte
cristalline apurement dit et qd elle ne pourrait être
employé pour les cataractes l'aituses, casieuses
et d'autres humeurs, c'est pourquoi que les anciens
disaient que pour l'opération il fallait que la
Cataracte fût mure. Un autre inconvénient
qu'on y a trouvé, c'est que le cristallin peut
se déplacer et venir se placer dans la chambre
antérieure en traversant la pupille, c'est ainsi
est inconvénient qui donne lieu à l'op. de la
Cataracte par l'attraction par laquelle est attiré
le cristallin par la corne par l'attraction.

Opération de la Cataracte de l'oeil
Ille consiste comme la précédente dans le
déplacement du cristallin mais elle est diffi-
cile et qu'il s'applique à toutes les différences

espèce de Cataractes, pour cela il a modifié 37
l'aiguille dont il se sert, qui diffère des autres
en ce qu'elle est recourbée à sa pointe, et plus
fine que les autres, et dans quelques cas, dont on
se sert ordi., pour cela on introduit dans la
sclérotique à une ligne de distance de la cornée
à l'angle externe de l'œil, puis on tire ^{par un fil} la capsule
parvenue derrière la pupille, puis on tire la ^{capsule} capsule
et l'on pousse la cristalline ^{vers la pupille} vers la pupille
et l'on place entre l'iris et le corps vitré, Voilà la
manière dont on opère quand le cataracte est
cristallin. Si le cataracte est ^{lenticulaire} lenticulaire ou
lenticulaire, il a digne quantité que la capsule est
apportée la ^{manière} manière de s'en faire, et se mule avec
l'humour aqueux, ce qui facilite ^{la dissolution} la dissolution
si elle est membraneuse, il s'agit de s'en débarrasser
mettre en l'amblyopie la capsule cristalline
et par le moyen de la pointe de l'aiguille on
en ramène les ^{petits} petits lambeaux dans la
chambre antérieure, parce que là il se trouve
l'humour aqueux qui ^{facilite} facilite la dissolution.
L'opération terminée, les soins sont les mêmes
que dans celle par extraction, mais l'opération
ne se fait qu'une fois, de 10 à 15 semaines
après, mais alors l'œil entre dans ses fonctions.
Quand aux ^{autres} autres elle est ^{plus} plus simple
l'opération que pour celle par extraction, mais
le cataracte s'étendant y est plus commun
Il est, malgré cela, des cas où l'opération
est préférable à l'autre, ^{si} si la personne avait
une aptitude continuelle de que la cornée
garnie de points, ou que l'œil fut très
enfoncé ou enfin que la personne ne pût
être opérée de temps pour se faire opérer
dans tous ces cas la méthode de l'opération est préférable.

Cause. Elle survient dans ces pays où à la suite
de contagion, 2^e après l'opération de la catarrhe
de l'œil à la suite de cette contraction.

signes

en la langue en fait la distinction et
les symptômes sont pleins d'intensité que dans
de la conjonctive, enqûe l'œil est point d'une
manière générale et commune au l'engorgement
du volume et causés d'autres très vifs, au
même de déterminer de l'écoulement dans ces cas
qui peut faire périr le malade par l'intensité
des symptômes, lorsqu'elle existe, elle n'est
présent d'autres moyens que pour elle de la

Elle peut être terminée de différents manières
1^{re} par résolution qui quand elle arrive le
malade sort toujours en état extrêmement
2^{de} par suppuration qui dans ce cas l'œil est rempli
d'un pus épais et procure l'écoulement
des symptômes. Elle donne lieu à l'engorgement
du volume de l'œil lorsque elle arrive au
point uniforme il offre de la douleur et les
malades sont en une espèce de distinction
qu'ils se rappellent de d'autres qu'ils ressentent
le mal de l'œil. Il faut se faire que dans
ces cas où l'œil s'ouvre spontanément et qu'il
que la nature seule se fait la tâche de le
soigner pour la guérison, la guérison le cause
craindre en un moment. Comme il peut se faire qu'il
n'arrive que longtemps après, on est conduit
alors à le faire l'ouverture, qui se peut faire
faite à la corne, mais que la pratique de
proposer à la partie inférieure de la sclérotique

Du Cancer de Sein.

39

Il peut se développer dans toute une des mamelles
 mais il est composé et par suite invulnérable
 outre. Il a une gosse à la suite de l'insanité. Cancer
 du thailome ou d'un d'autre tumeur arrivant
 au globe de l'œil. D'où la nature primitive
 incertaine. On ne le voit commencer par un point
 que par un point dans ces cas, puis tout de
 suite invulnérable tout de suite le globe de l'œil.
 On le reconnaît par les signes qui caractérisent
 le Cancer des autres parties, tels que par les lignes
 douloureuses qui restent les maladies, les tumeurs
 purulentes qui arrivent, qui arrivent, le quel
 présente un aspect différent de la suppuration
 ordinaire.

Il faut pour guérir les Malades de cette tumeur
 et l'opération, tantôt par un point primitif
 adhérent y a donné lieu, en suite d'opération,
 parcequ'il est le seul moyen par lequel on
 peut se débarrasser des Malades. Il y a bien
 des temps qu'on l'a fait par la première
 fois, c'est Ristour qui l'a inventé le premier,
 qui depuis lui fut modifié quand d'ala
 manière de la faire. En effet il consistait à
 faire une espèce de Courbe qui
 fut abandonnée, fabriquée de l'écume d'un bestiot
 courbe, ou son état. L'usage de Ristour
 pour détacher le globe de l'œil des parties
 environnantes (conjonctives), puis de suite
 de circons courbes pour diviser les muscles
 et le nerf optique, sans simplement d'un
 Ristour. D'où. Comme on ne peut l'opérer

40° qu'on a vu avoir fixé l'œil, Fabris avait inventé
un petit sac dans lequel il mettait le globe
de l'œil, qui étoit fait en manière de Bourre
mais l'on peut s'en passer, avec quel instrument
facile d'immobiliser le globe de l'œil, on le
tient tout bonnement des doigts, qu'on
serre simple, au double, au triple encore de
force exerce l'opération, la marche de
l'opération est différente suivant qu'il s'agit
d'opérations différentes affectées, c'est-à-dire
suspensives, au lieu qu'il ne le sont. Dans
le 1^{er} cas on commence par couvrir l'œil
qui n'est point sain au moyen de l'histoire
en commençant d'abord à la pupille du
grand angle au petit. D'une manière
circulaire, plus l'œil s'étend à l'inférieure,
cette sorte que l'œil se trouve isolé au
Dans le 2^e, au contraire on l'isole avec
l'histoire également qui se fait comme pour
cas précédents des pupilles, en même temps
que l'on tient l'œil avec des compresseurs d'un
Vase fait soit dans l'un ou l'autre, dans l'autre
ou même les deux qui l'entourent et le
tient optique avec un bistouri. D'où il
manière de l'isoler au lieu avec des
Courbes comme l'œil.

L'œil isolé dans l'opération opératoire,
soit isolé encore le tissu cellulaire
puut bien trouver atteint, de même que
la glande lacrimale, au détachement de
dernière lorsque même elle ne l'aurait pas
elle qu'elle détermine par la direction des

fluide lacrimale en épiphora. Si les us- 41
l'étaient en su au l'épiphora en su,
attendu qu'il y a une poutre appliquée à
Cancer. Cancer.

Maladies de l'œil résultant du
trouble de ses fonctions.

Elles sont infiniment multipliées, lesquelles
consistent dans trois espèces de dérangement,
1^o Dans le défaut du libre passage des
rayons lumineux 2^o Altération de réfraction
naturelle, 3^o à leur non impression
sur la rétine. Comme ils sont point
dans l'œil, on peut les rapporter à deux
1^o Au dérangement d'impression des rayons
lumineux sur la rétine 2^o Au trouble
réelle dans l'exercice de l'organe de la vue.

De la Myopie.

C'est comme ainsi une affection dans la
vue, que les personnes qui sont affectées,
ne voyant point les objets de loin et sont
au contraire obligées de les approcher très près.
De leur yeux pour pouvoir les distinguer,
on la compare dans le monde des yeux de l'œil.

Dans l'œil de l'œil y donnant l'œil Cancer
la réfraction trop grande des rayons lumineux
ou la faiblesse de la rétine. Le point
tenu à la convexité trop grande de la
corne ou bien à celle des cristallins, il
n'est point encore bien prouvé pour ce
qui concerne cela se voit dans l'œil au point
l'œil, fait que les rayons lumineux ne
parviennent point sur la rétine, dans une
état naturel, ce qui est tout remis avant

gens, pour embrasser dans un plus grand
espace. Or dictées ce qui ne peut être pas
arrivé bien sûr que qui sont cela les
obligeraient à tourner la tête. Ils rapprochent
le plus habitude les paupières ce qui diminue
l'avis à ce qu'elles contiennent une plus
grande quantité de rayons lumineux.

On remarque encore un autre
cas de certaines physiologies particulières
Paula ditation. Leurs pupilles, qui sont
très grandes, par la facilité qu'il a de
lire sans aucune approche très près de
son œil, tandis qu'une autre personne
qui ne les voit point ne le peut pas. Il
y a pas cependant de si grande facilité
qu'on ne puisse si en prendre qu'on ne peut
si habitude et ne s'impressionner.

Pour y remédier on ne peut le faire
que par des moyens, qui peuvent suppléer
à la courbure trop grande de l'œil, et
qui ont pour but de diriger un peu
les rayons lumineux aussi est ce par
cette façon qu'on fait faire usage de lunettes
concaues aux personnes qui en trouvent attente.
Il faut aussi qu'il y ait une telle attente
qu'il n'est point nécessaire qu'il y ait
usage, de même que chez celles qui ont
que par le défaut d'impression des rayons
lumineux. D'autres malgré qu'ils se soient
en fait pas usage, tels de la paraitre
point. Il en est d'autres qui en partent, les
mais que les des lunettes à peine concaves,

Après d'autres chgs qui elle les ont très po
et qui ne peuvent pas les passer.

De la fœbécie.

Par une cause à une maladie
laquelle les personnes qui en sont affectées
ne peuvent voir les objets qui sont
très éloignés, ce qui est l'essence de la fœbécie.

Causés

Les causes qui y donnent lieu sont la
diminution des humeurs d'œil, aussi que
du cristallin, ce qui fait que la corne
moins pénétrée, et les personnes qui
qui ont la fœbécie est donnée, mais ce qui
qui elle est réellement une maladie, qui
moins peut être considérée comme telle.

Signes

Ils arrivent à cet état les personnes
qui ont une humeur que qui pénétrée
image, ou en que les rayons lumineux
n'ont point aussi bien comme ils
font avant selon les lois de l'organisation
saura être car le sonnet du cœur
qu'ils forment dans l'intérieur de l'œil,
plutôt que de tomber sur cette dernière
membrane se trouve port au delà.

Contrevent. On y remédie par le moyen de l'usage
de l'œil. Il est des personnes qui en font
usage du lège de l'œil, ils le font
si que qu'il est des personnes qui ne
quelles ne l'ont pas, et c'est une maladie
dans le nom de consécration. Une fois qu'
à commencer à en faire usage, il faut
que toute la charge qui est sur
portée qu'il se fait davantage. Cette

De Strabiane.

Cette Maladie consiste dans une affection
de la cornée, qui n'est point dans la
même direction, ce qui fait que l'œil ne
peut pas dans la même direction
voir ce qui fait que quand les personnes
regardent un objet, un œil est dirigé vers
lui, tandis que l'autre est en dehors, jadis
en dehors parce que par un effet de la maladie
à l'œil malade, de même que quand
dans un œil à la fois, ce qui fait qu'il
voyant les objets d'une manière
différente que l'autre qui ne voit pas les mêmes
Choses, ce qui fait que l'œil malade
demande des parties de globe de l'œil
lui-même, d'autres dans les parties qui lui
sont accessoirs. Ces premières se rapportent
à la présence de la cornée, la cornée de
déplacement du cristallin, ce qui n'est point
bien prouvé, d'après les observations de l'œil
de la cornée, comme nous l'avons dit, de
l'œil, au point d'impression des rayons
luminieux, ce qui ne peut exister que par
un seul œil, ce qui fait que l'œil malade
n'est pas la même force d'action, ce qui
est fait pour cela que les objets qui se
sont affectés, l'œil de l'œil malade
à ne regarder les objets que d'un
œil, ce qui est celui qui est le plus fort, à
une manière confirmative de l'œil, au
point de se rapporter la force plus grande

416 De l'action musculaire d'un des deux yeux
car les muscles admettent au droit par
eux recouvrent, elle a lieu dans le droit
Il peut même tenir à l'égale à point
bien de supposer que les enfants
voyant les objets qu'ils voient et ne
cette; au cas d'affection constitutionnelle
muscles, causée par la rétention de
certaines fibres, ou par l'absence, et à l'affec-
tion musculaire, ou au la remarque qu'il y a

Legende, hystérique et arrive à une époque de
l'histoire de l'homme, même avancée
signes. Si l'on demande de la présence d'un des deux
cette; il est impossible de le comprendre
rien et point de même pour le droit
de l'existence de l'ingénierie de l'homme
Ritue; au contraire, quand il y a une
l'action plus forte de l'action d'un des deux
en interrogeant les personnes à qui on a
enfant, qui nous disent qu'il y a quelque chose
qu'il y a de son bureau, il y a quelque chose
lumière, d'acte, ou bien d'acte; une
une affection hystérique en informant
la personne atteinte d'hystérie; sur
la répétition d'un fibre, ou de l'acte; elle
elle en a été affectée.

Les Mages à même usage sont
raison de l'acte qui y a une bien
ne peut rien faire si l'on ne les tâche
y donne bien à un moment donné
l'acte en elle. Grand pour l'acte
de l'existence et l'ingénierie de l'homme

réfute, on ne peut rien dans le premier cas, puis le deuxième cas, on peut
convenir le plus fort, afin de s'enlever plus
de force l'autre. Sans ce qui causera
la force plus grande de l'action musculaire
on peut y remédier, en faisant suer
cette partie. De là, on recommande
des frottes avec ce qui surpasse aux maladies
qu'ils envoient de côté, acquiescent
détérmine un sentiment pénible, qui les
habitue à tourner l'œil petit à petit de
l'autre côté, en ayant soin de faire qu'ils
entourent par l'autre. On peut aussi
encore y remédier en mettant sur l'œil
d'un, un morceau de linge, afin qu'ils ne
voyent pas de ce côté pendant longtemps,
ce qui est un peu, mais moins incommode.
Pour ce qui ^{conduira} cette détermination par une
affection hystérique, il n'y a rien à faire
parce qu'elle dissipera quand elle finira.
Enfin pour celui déterminé par la
représentation du vice, c'est d'arrêter, en évitant
qu'ils ne voient des images par la combustion
ceder.

De la cécité opérée ou vue d'écarter.

On désigne ainsi un état dans lequel
les maladies ne peuvent pas guérir
pendant le jour, tandis qu'ils se font dans
les lieux obscurs pendant la nuit.

ce qui fait qu'ils s'approchent de
aux modestes, en du hat, de l'acte
chanceur.

Cause
et signe

Il est très rare de rencontrer
affection, qui quand elle a lieu, est de
que d'une excitation de la sensibilité
de la Rétine ce qui fait que la source
de la lumière sur l'œil produit
surtout extrêmement possible l'organe
à l'œil.

Traitement

Tous les moyens que l'on doit
employer, doivent avoir pour but
d'augmenter la sensibilité de la Rétine
ce qui fait que les bains, la saignée
les stimulans de toutes sortes
si elle dépendait de la répétition
d'une affection quelconque, ou d'un
employer les moyens qui causent

De l'ophtalmologie ou l'oeil de l'oeil

Il est caractérisé par un état d'opacité
au prisme, c'est à dire que l'opacité
au lieu de ne pouvoir voir que
pendant la nuit, ne peut voir que
le jour, même par la prisme d'un
lunette artificielle, ou une chandelle,
la clarté de la lumière.

De la faiblesse de l'oeil.

Il est caractérisé par une fréquence de la larmée
qui consiste dans la perte de la

Q. Sue, qui arrive généralement chez les grossesses
avancées en age, qu'il n'est point rare de
la voir exister chez celles qui ne le sont point.
Elle cause une grande gêne à celles qui sont
surtout lorsqu'elles veulent longtemps travailler
de nuit à une lumière artificielle, ou
des choses fines selon leur déterminé
une couleur de lait, est à dire de la
conjonction.

Il y a quantité de causes qui peuvent y Cause.
donner lieu. Il n'y en a point qui la
produise plus que l'usage des plaisirs
Vénériels, le travail de nuit surtout sur
des objets délicats, relevants, ou étés,
il peut être aussi la suite d'autres
Maladies de l'est, ou d'une inflammation
de l'est.

Il n'y a point pour l'augmentation de celle
faute de progrès, que d'être présentement traitement
le contraire de ce qui la détermine; ainsi
plus l'usage des femmes, l'usage du travail
de nuit qui s'élève fait sur des choses
délicates.

De l'Amorose ou Goutte Sérique

C'est une maladie qui se trouve dans le
quel les individus qui se sont affectés
perdent la faculté de faire la même Cause
qui a pour cause l'usage d'impression
des rayons lumineux sur la rétine, qui
ne peut point confondre avec un état

Se peut-elle aussi pouvoir être causée par
toutes les maladies d'humidité jusqu'à celle
qui interceptent le passage des rayons
luminieux pour aller se rendre dans la rétine
telle, telles que les taches sur la cornée,
l'opacité du cristallin, le glaucome.
Il peut encore avoir pour cause autre le
défaut d'impression de la rétine la paroi
du nerf optique, et le défaut de paroi
du cordon, ce qui constitue une trijume
défaut d'impression, de transmission et
de perception.

De toute manière c'est plus fréquente
celle de la rétine; il n'est point cependant
excessivement rare. Il en faudrait produire
les deux autres. Il paraît bien que le défaut
de voir résulte de la non impression de
rayons lumineux sur la rétine. Lorsque
le malade a été bien traité jusqu'à ce qu'il
ait été atteint d'opacité de la cornée ou
d'opacité du cristallin, on voit plus
mais rien au dehors, qui ne reçoit
alors les impressions que lui communique
le nerf optique. En veut-on produire
ce dernier c'est ainsi qu'on peut
le rendre par exemple, en obtenant
un cataracte, atrophie de la rétine
le site l'opacité, dans son état
descriptif; qu'on ne voit encore à l'œil
d'un œil de la face se qu'on explique
par la communication qu'il a avec le nerf.

translat, qui est qu'une branche de l'
l'ophtalmique, avec le ganglion qu'on appelle
nom, qui produit l'anneau l'anneau des
nerfs ciliaires. Il y en a qui l'ophtalmique ayant
des sympathiques, d'autres par la comu-
nication des nerfs optiques. Qu'on voit les causes
qui y donnent l'impulsion la manière dont elle
arrive il est en fait qu'on l'appelle. Second

l'ophtalmie peut être parfaite et imparfaite, et plusieurs
est à dire les altitudes ne plus voir, ou
bien avoir encore un peu de la vue.
Elle peut encore être continue ou périodique,
c'est à dire durer toujours, ou bien revenir
à des époques variées. Elle est complète et
incomplète, c'est à dire nécessitant qu'on
seul œil, ou bien à tout les deux.

Elle peut porter un caractère essentiel
périodique et sympathique. Essentielle elle
fais quelle dépend de la Rétine elle même
c'est ainsi qu'on peut la considérer lorsqu'elle
est produite par une cause externe; périodique
quand elle ne revient qu'à certains temps.
Détournée, c'est ainsi qu'on la voit arriver
à une personne, toutes les fois qu'elle
est exposée à une lumière vive. Sympathique
quand elle dépend de l'influence d'autres
organes, c'est ainsi que nous voyons l'ophtalmie
par un œil produite sur le front, qu'on
l'appelle arrivée par l'embarras des premières
voies. Il peut aussi se faire qu'elle dépende
d'autres organes cachés ou bien à
la reproduction d'autres vices ou l'ophtalmie.

Si on reconnaît cette Maladie à la difficulté
qu'ont les malades de respirer, à la tousser
Signes des humeurs de l'œil grande dilatation brève
qui ne diminue point à une exposition
très forte de la lumière artificielle. Il faut
faire avoir l'œil de ne pas laisser l'œil exposé
à de excessif tant le soir qu'il se soit
en même temps que l'on exerce une ^{légère} promenade
dans un exercice des frictions, après qu'on
fait au soir les plaignies pour avoir l'œil
se dilate. Il est ainsi connu. On peut
reconnaître l'existence de la Maladie, mais
il n'est point de même pour en avoir
l'existence. Il faut pour cela faire l'œil
à son examen. De toutes celles examinées, il
n'en est aucune qui la produise plus que
l'embarras gastrique.

Traitement Les efforts à employer pour cette
Maladie sont spécialement ceux qui sont
opposés à l'appareil à l'embarras gastrique
puisque cette dernière se est produite
la cause ainsi au développement l'émétique
le purgatif, quelques moyens antispasmodiques
après l'usage des bains des excitants
c'est le Nitrate, les Ventouses, les Vésicatoires,
la lecture de Cantaride de voir les oreilles
des enfants sur l'œil pendant également
compromis, car la présence de l'œil
l'esprit de l'œil.

Maladies de l'ouïe. 53

Il est susceptible d'être atteint par les maladies
originales, organiques et phlogiques.

1.° Orig. De l'oblitération du conduit auditif.

Il peut avoir lieu au être produit par ^{l'accumulation} d'une
membrane qui peut le boucher, laquelle
peut arriver au siège près de son orifice Cause
externe au crâne, ou au moins pénétrant
placée. Excitant elle cause l'obstruction par
l'interception du passage des rayons
sonores, ce qui fait que les personnes atteintes
peuvent, quoiqu'elles paraissent guères à entendre que
djà dans un âge avancé des enfants
pourrait se faire observant que la surdité
términe à la paralysie du nerf auditif,
puisque à l'encore jusqu'à présent j'en ai
rien vu dans les bouches et autres, chez
eux au l'obstruction cadavérique à une l'ouïe
on reconnait que cette affection existe. L'usage
en s'approchant que les enfants s'introduisent
par le conduit auditif dans lequel on voit très
chose existe la membrane qui boucher
qui se fait au moins plus à l'aise
à l'inspection, qui quand elle est proche
la membrane du tympan est assez difficile
à apercevoir. Si on arrivait qu'elle existait
que difficile, il pourrait se faire qu'une l'ouïe
la l'ouïe s'appris au des années.
Les moyens à employer en pareille
circonstance, consiste à la l'ouïe même

Si l'instrument travaillant tel que la poutre de
Pistori, après qu'on en peut introduire
un peu de linges pour que l'ouverture
se ferme plus. Si arrivait que la membrane
existât après, il serait très difficile d'en
faire l'ouverture. On pourrait dans ce cas se
servir de trois quarts, mais ce qui pourrait exposer
à quelque danger.

Il pourrait se faire que dans quelques cas
la poutre de Pistori soit obstruée de mucus
par l'obstruction, ce qui ne pourrait qu'en mettant de la
Pistori dans le conduit auditif du côté gauche l'on
supposerait en même temps que l'autre
serait placée de côté, qui si elle ne l'est
alors par les mouvements d'expiration et
d'inspiration de l'air chez les personnes
qui ont la bouche fermée alors l'air
de l'onde de l'inspiration existant la membrane
enferme encore le résultat, ce à quoi on
peut remédier, qui si au contraire elle ne
pas, la flûte monte parce que l'air pousse
dans la trompe d'Eustache dans la cavité
moyenne de l'oreille (cf. org.)

La poutre peut encore dépendre de la
pression de l'air qui est très sensible
18^e flûte ou plus ou moins grande quantité dans la
sac la cavité auditif qui a forme qqf une espèce
de bouchon d'autrefois de espèces de lague,
qui interrompt alors également les rayons de
cela n'arrive qu'une fois chez les personnes
ce qui dépend de l'induration qu'elle met
à l'oreille l'oreille après au recouvrement
que cela existe en l'appréhendant la cavité

adit, que fait voir qu'il n'est rempli, on s'
peut former qd de la dépense, acquies-
cance de la dévotion de la surséance et
qui arrive en pareille circonstance plutôt
que de continuer. Il n'y a point d'autre
moyen pour y remédier que d'en faire
l'abstraction et qui au contraire au
moyen d'une curette: Il se des circonstances
où elle est si constante qu'on ne l'aient
qu'après l'avoir ramollie, ce qui on
parvient au moyen de corps gras, que
l'introduit dans le conduit, comme on
conçoit mieux que de l'eau de savon.

9. Des organes.

Insufflation du conduit auditif.

On dit que
Une insufflation nique sans si d'insufflation
soudain, si fait voir qd, et que quand
un corps étranger se trouve dans le conduit
qu'il détermine d'abord la membrane unguinée
qui le recouvre, qui des cas est reporté, quel
moyen peut être le résultat, et que la
rapporte immédiatement à la lésion. Beaucoup
autres causes peuvent encore la déterminer
mais aucune ne la produit plus que la
condensation d'air froid sur la surface de la
membrane qui comme lui s'augmente
la faculté perceptive des rayons sonores, par
la tension plus grande de la membrane
du tympan, tandis que le contraire a lieu
dans les tring humides. Quelquefois elle
coincide avec une opacité, comme une

§6 Remarque chez les costards.

signe
Au commencement par la douleur que redoublent
les affections qui se sont très vives, ce qui se
sans doute de la sensibilité particulière de
cet organe est dans; qui en l'animant
au remarque que le conduit auditif, les
signes de l'écoulement de l'écoulement, l'écoulement
Mastoidé. Dans certains cas se trouvent les
costards. Il se fait ensuite une éruption
éruption qui parcourt les périodes où
les autres parties de l'écoulement animal
en sont recouvertes. Rarement des parties
faisant en fait le conduit auditif, quelle est
la forme du conduit, mais il n'en est point
même toutes les fois que cela n'a pas lieu,
parce qu'il peut se former des dépôts dans
les écoulements même dans le conduit.
Enfin, les écoulements auditifs se font par
remède à l'inflammation du conduit auditif.
D'autant que le conduit auditif est quelle agitation
écoulement, mais il est à remarquer que
il n'est point toujours disposé à agir comme
telle, puisqu'il peut être en repos, qu'il
écoulement, au lieu d'agir comme en écoulement
admission des parties les écoulements, ce qui
que maintenant, ce ne s'en fait plus. Ce
est tellement habitué à son écoulement
vulgaire. Il est machinalement qu'il se fait
ce qui fait même quelle est même en
en usage, si on veut s'en servir, il faut
ne perdre que de l'écoulement d'écoulement, encore
elle qu'on voudrait être fraîche et n'en

qu'on a depuis longtemps, qui encore n'a point
été exposée à la chaleur. Encore faut-il
repriser l'injection - parce qu'en effet le
liquide au contact à l'ap de chaleur, elle
perd bientôt la vertu adoucissante. Il faut
mieux se servir de toute autre liqueur
inaltérable, telle que la vapeur d'eau,
ou l'air au quel on peut ajouter un peu
de safran comme légèrement anodin. On
beatoptamens de même sorte, d'autre
cause l'oreille, les douleurs derrière l'oreille
parque causées par un rhinisme aiguë
qui ne sont point suivies d'inflammation.

Mais il arrive qu'il y a une inflammation
de l'oreille, ce qui tient à ce que l'inflammation
est point terminée par résolution. On a dit
les points qu'on fait ouvrir le siège dans
les points inflammatoires l'oreille commence
à se décoller de l'os de l'oreille, et
l'os de l'oreille se décoller de l'os de l'oreille,
ce qui n'est pas non plus rare d'un os de l'oreille,
ce qui n'est point impossible, même le tissu
cartilagineux n'est point tout à fait décollé,
qu'il se trouble des intestins entre les os de l'oreille
de tissu cellulaire, qui alors se décollent
que le membrane n'est point décollée,
qui est point suivie de fistule.
Adhèsion récurrente par la qui a précédé, est
à dire l'introduction de corps étrangers dans
le conduit auditif, l'inflammation, etc. et à quoi
on doit remédier par le moyen de l'eau
ou d'un autre, ce qui donne issue au pus, ce qui
d'après bien a été à l'eau qu'on peut point à
l'introduction de corps dans le conduit, ou

§ 8. De la charpie. c. qui y étroit une empu
et empêcha le passage. Du pus, et puis il y eut
§ 9. qui il se fit un escullement par lequel on
plut les empu, catactes, et puis à toutes les
membranes empu, et puis à toutes les
exhalations et à l'inflammation qui est habituelle
chez certaine personne, ou à une période
spécialement dans les enfants. Par où l'on
quid on a pendant longtemps une grande
oppression. En effet l'on croyait qu'il y avait
une charpie, qui fait que l'on a l'habitude
de le guérir, et le faire, et qui est
fait. Et l'on a vu par de petites incisions
sans le guérir il faut détruire la
cause, ainsi si c'est la cause par la
scrophuleuse, il faut voir le caractère et la
ce qu'on emploie pour tacher d'engraver
consiste dans des injections d'eau blanche
de liqueur de gallie, légèrement assainies
on peut aussi y joindre l'unguentum de terebinthe
parties claires, et ainsi que les prescriptions
sont les mêmes, mais avec des modifications.

Excroissances fongueuses du conduit
auditoire.
C'est-à-dire elles sont très sur la surface du
conduit, tandis que d'autrefois elle sont
dans le conduit sur la membrane du tympan
et la membrane allongée qui le recouvre et de
toutes celles qui existent avec celle qui tapisse
le larynx qui y est le plus exposée, sans

gêner en sorte la cause qui tantôt suit
à la surface tandis qu'à d'autres fois elle
présente en profondeur

Au commencement par la lésion de
l'atmosphère, puis par l'écoulement du crâne
au début, puis par la recrudescence.

On remarque y remède de la même que par
tous les autres endroits où ils sont le
siège, que par la lésion l'écoulement et
l'écoulement, c'est le lieu où ils existent qui
en détermine l'écoulement. Au fait fig. l'écoulement
si elles sont près l'écoulement du crâne
l'écoulement plus long la lésion si
elles existent sur la membrane du tympan,
parce qu'elles sont plus éloignées, et les
arrachées, ce à quoi on parvient en glissant sur
fit une fine pince qui les tient fixes.

L'écoulement
19

Maladie de la Caisse du

Tympan

La membrane tympanique qui recouvre
la caisse du tympan peut être exposée de l'écoulement
de même que toutes les autres membranes, et l'écoulement
de la matière, à une accumulation de l'écoulement
uniquement, ce qui a pu se produire longtemps
sans danger, l'écoulement qui se voit se produire.

Elle peut ensuite être le siège d'une
inflammation aiguë qui se voit se produire
à la suite d'une maladie, ce qui est assez
rarement, ou bien à la suite d'une
pneumonie, ou bien à la suite d'une
pneumonie, ou bien à la suite d'une
pneumonie, ou bien à la suite d'une

80 résultat et l'un est d'autant plus resté
cervire qu'elle y a son siège, qu'il n'est
rien dans le conduit auditif, qui est resté
accompagné de fibres canaliculaires.
L'isthme de cette membrane peut se
terminer par résolution, sans produire
une accumulation de sécrétion, ou
il en prendra si elle peut pour de plus
qui par son siège peut tuer les fibres
qui sont point de la cavité moyenne
l'oreille pour la trompe d'ostéite par suite
dans la bouche occasionner le diphtérie,
qui remplira les cellules de l'apophyse -
maxillaire, qu'il par la présence d'un
lien à la cavité par une lésion d'ailleurs
qui nécessite l'impulsion du conduit auditif
quelque. Au lieu d'il peut causer la rupture
de la membrane du tympan et tuer
par le conduit auditif, lequel est toujours
un isthme fort, chaque la cavité
ne est presque toujours le résultat, ou
quelque cas de sécrétion, qui sont
par la suppuration, il peut y en avoir
par un isthme atrophique que cela se
peut.

Au sujet de l'isthme qui par les
adéquies en parlant de l'isthme de la
cavité, qui sont les canalicules, mais il
a remarqué qu'il y a tant pas tant
d'isthme, ou qu'il y a tant d'isthme
de la membrane du tympan, et par
ou est l'isthme par le moyen de la
trompe d'ostéite, mais cela est infirmé

On dirait seulement qu'il y a des personnes qui ne
peuvent entendre que par un espèce de
bruit donné à la membrane du tympan
une sorte d'irritation, ce qui le porte à
qu'une autre qui se prolonge indéfiniment.
Lorsqu'on a vu fait du bruit vers elle,
d'autre si la ~~chaleur~~ ^{chaleur} ~~bravement~~ ^{bravement} ~~si~~
soudain Willis en cite deux exemples. Dans
exemple, une de chaque.

Il est au contraire des cas où la tension
de l'oreille est augmentée, ce qui tient lieu
d'acte à l'état trop exalté du nerf auditif
ou bien au mode de tension de la membrane
du tympan.

Causés

La surdité est simple et incomplète
Celle-ci peut avoir lieu dans les parties
y a un dérangement dans les articulations
des osselets. Celle-ci au contraire toutes les fois
qu'il y a une inflammation du nerf auditif à
la partie tubulaire de la langue ou du larynx
des osselets. Il est à remarquer cependant que la
perte totale de l'oreille par la disparition
la trompe n'est point susceptible de
guérir, quelle soit revenue par le fait
ou défaut de tension de la membrane
tympanique par la paralysie de muscle qui
est destinée à la tendre, ou bien par la
distension, car la seule structure ne
la prévenir point. On a aussi dit que
la lésion de la trompe pouvait
aussi la déterminer, mais que dans ce cas
il n'y a pas renouvellement d'air dans

caisse du tympan qui peut être pavée
entre d'autres fibres du voile du palais
au lieu par l'accumulation de fluides muqueux
dans la caisse du tympan.

La surdité naît dans le cas de rupture de la membrane du tympan, que parait
à un passage libre des rayons sonores dans
la caisse du tympan, qui se reproduisent plus
alors que l'inspiration de l'air. Elle est alors
due à l'absence d'impression du nerf, ou par un état
contre-nature de la pulpe nerveuse, de la
paralysie du nerf qui peut être encore
compressé, ou bien à un état partiel
du Cerveau, qui ne reçoit plus d'impressions
que lui communique le nerf, comme cela
arrive après les fièvres adynamiques ataxiques,
pendant un apoplexie. La paralysie estuelle
est pas tout à fait caractéristique que chez
les paralytiques qui sont à la portée de recevoir
une impression très forte de la part de
causés, peut être par une paralysie complète
comme celle qui a lieu chez les lues
et muets, quoique cela paraît tenir
moins à une affection de la veille, que les
paralysés qui la composent, ce qui fait qu'elle
seroit facile de la confondre avec une
appartient à une affection organique et
une affection essentielle. On doit regretter
l'opinion d'un qui disoit que cela parait
tenir à l'absence de la longueur de l'opercule.
Dans le cas où elle naît bien d'une
manière sympathique, cela se remarque
au l'absence d'une maladie. Il y a
guise de moyens pour parvenir à la guérison.

[illegible]

peut remonter à l'oreille dans l'intérieur
de l'oreille, on est obligé, si l'air sort par
quel orifice, de faire un pavillon à la
membrane du tympan, avec instrument
en forme de trépan, pour y faire une
ouverture. La poutre ne doit pas être trop
grande, afin de ne pas aller à l'encre la paroi
apposée à la cavité. On parvient à l'effacer
en plaçant de l'air le coller, comme on met
dans les poutres l'instrument. Dans le conduit
de l'oreille à la partie inférieure & antérieure
afin de ne pas aller à l'encre la cavité, une fois
l'ouverture faite, il faut un peu de temps et
l'air s'introduit dans la cavité, pendant
longtemps avec une petite baguette en cire
ou avec une de l'oreille la partie inférieure de
l'oreille, mais elle a été faite avec deux
pans de poutres anglaises. Au point de
disparition de mettre le cylindre d'oreille
l'ouverture parce qu'il y a de l'air qui se reforme
point.

Si la surdité dépendait de la paroi
du nerf auditif, il n'y aurait point de
moyen à mettre en usage, que des remèdes
sympptomatiques tels que les pommades, le balaï,
le ketchup, le galvaïnisme.

Il y a que les cornes acoustiques qui
peuvent remédier à la surdité causée par
l'obstruction de la langue au pharynx, à
moins qu'on ne s'adresse artificiellement à
l'oreille, puis que les fonctions ne sont
autres que de transmettre les sons dans le
cerveau. Quand aux cornes d'oreille
à l'usage de l'oreille, on les obtient qu'ils sont
à l'usage de l'oreille par les autres, les uns sont

66. fins à l'écaille, d'autres fibres d'un autre
genre les perçues les portent dans leur
main, par ayant leur fin porter l'écaille
au conduit toutes les fois qu'on l'impulse,
ce qui remplace le sang; il y a même
qui l'un servant pour d'autres plus d'autre
sans.

Maladies de l'organe du P... des os.

Il y a appartenant toutes à l'organe, à la même
enquêter qui voit les formes et les os à l'inter-
intérieure, qu'il y a bien la carie qui depuis
des os.

originales Les fibres de conformation du nez sont
très rares, il existe toujours, au centre
quatre, rarement si on le manque,
au moins qu'une soit qu'elle soit, car
lorsqu'il y a de l'écaille par un accident
tranchant.

obstruction que les orifices des fosses nasales soient
au rétro- point. la grande qu'elle doit avoir
des orifices point. la grande qu'elle doit avoir
des orifices point. la grande qu'elle doit avoir
dans le premier cas au nez, au nez, au
accidentellement à la suite de plaie de
prolures. Sans le danger de dégouttement
de la clavicule plus du côté que de l'autre
qui doit pour réparer le rétro- point
des orifices les orifices avec une instrument
tranchant, si elle était oblique, point
faire usage de corps dilatants eff. sibles
ou l'éclaircir point. Sans cela on se sert de
bandes de gaze élastique, que l'on laisse
à demeure, dont on a bien d'expérience

de l'histoire jusqu'à l'existence qu'elle a eue
suffisamment aguerrie. Pour en-
courager le développement de la classe, il
n'y a pas grand chose à faire.

Après les vices originels. Dans l'ancien temps
de parthie, nous pouvons encore rapporter quelques
certaines altérations qui l'ont induit à l'altération.
Vénériens, qui se développent au moyen de la
Carie qui s'empare des os par le nez,
par le nez, il n'y a rien à faire, tandis
qu'on ne peut pas empêcher point d'indien
si ce n'est que par des nez d'argent ou
d'or, qui ne remplacent jamais les
naturels, en ce que la voie la traversée attelle
ce qui fait voir qu'il y a trois altérations. On
peut également lui servir lorsqu'ils sont
ils ditrent par des causes accidentelles
par les instruments transmutés.

Quand on a des Maladies, on ne nous
en occupons point avec grand intérêt
parlé, soit en traitant des plaies, soit en
parlant des ulcères, ou les maladies de la
peau, pour ce qui regarde l'altération de la
à son intérieur elle est dans les affections
des membranes muqueuses.

A l'usage
de l'usage

De l'usage.
Il se trouve dans l'histoire de la
membrane muqueuse de la cavité de la
sous un certain point de vue apparaît
il y a la membrane qui a la structure qui
quand elle a bien été formée elle se porte
qu'on peut les autres points de la même
membrane.

Causes

Les causes qui y donnent lieu sont

68 les passages d'air chauds au froid, la suppression de la transpiration, jusqu'à ce que l'organe cutané agit d'une manière sympathique avec la membrane muqueuse des voies nasales, le passage d'air froid par ces dernières, qui peut servir des qualités humides, qui agit également sur d'autres parties de.

parties de.
 Au le reconnaît par des sentimens agréables
 qui éprouvent les affections de la ferveur
 et de la pureté, que le Talisman désigne sous le
 nom d'Amour véritable, par la bonté
 et la pureté du fluides (ou l'âme), qui a de
 qualités particulières, lequel est plus fluide
 de toute l'âme humaine, qui est la source
 abondante, qui est épais, gluant, et fluide
 lequel éprouve de toute la mesure que la
 volonté de l'âme désigne les qualités naturelles.

Traitement
 beaucoup de personnes employées ici
 pour le service, il se dissipe beaucoup
 car il est fort, on y en a même tant on
 pourrait facilement dans le gascon les gens
 servir un peu fustes, faire usages
 d'après leur grande, afin de déterminer
 une distance de.

une violence, le.
 hémorragies Pasales.
 Elles sont ord. Redigées sous le nom
 de putres, qui amènent dans un écoulement
 de sang plus ou moins abondant.
 Les écoulements qui y donnent lieu sont les
 inflammations des vaisseaux leur division et les
 exhalations. La rupture arrive est lorsque

meurent toujours sur la neige, qu'une coque y est
portée. La division lorsqu'on porte dans
les fosses nasales certains corps, fait franchir
ceint piquante. Le kalabian a une paille
d'une effete de la nature, et toutes les
fois qu'une cause matérielle à effet sur
l'organe. Ces dernières peuvent arriver même
dans les autres parties des membranes muqueuses
d'une manière passive, puis d'une manière
active. Elles se parviennent à une leur plus
indépendance de propriété vitale dans les vaisseaux
qui sont gorgés de sang, de telle sorte qu'ils
paraissent être dans une espèce d'atonie.
Jamais lorsqu'ils arrivent le sang a les
qualités de celui qui appartient au système
artériel, qu'il paraît cependant qu'il ne
soit que des dernières divisions artérielles.
On les remarque. Dans les fièvres atoniques
adynamiques. Elles se rencontrent aussi
celles qui paraissent provenir d'une
tumeur de propriétés vitales dans la
membrane muqueuse des fosses nasales;
Elle est bien plus commune chez les jeunes
gens, chez les personnes qui paraissent
avoir une atrophie sanguine, qui paraît
aussi avoir lieu d'une manière sympathique,
car cela arrive chez les personnes qui ont
des dispositions à la phthisie pulmonaire
ou bien qui en sont affectées. Elles
ont lieu comme crises d'une maladie
et que cela se remarque qu'il paraît
fièvre, car dans l'angiotonique, au contraire

Signes

Il commence supplant à une éruption
naturelle d'apparence épi. par les règles
qui le reconnaît par son débilement de
coloration du nez, signe d'aucune
même que par la couleur de la face
un état pathétique qui se manifeste par
puis par l'apparition du sang. de
qualité rougeâtre et est assez grand
littérature il y a une jeune personne à
des personnes de la région de Paris, qui
affaiblir se voyait de perdre au moins
vingt dans l'espace d'une année, qui
est surprenant au premier abord. Ce
redoublement est il y a trois ans une personne
chez lui qui lui rendit presque autant en
dans un mois (mais qui n'était pas
en rétablissement par la manière dont
il se repare, soit par l'action qu'il fait
dans l'appareil digestif, soit pulmonaire
stomatique.

Cratisme

On y remède par le moyen de
réfrigérants, est ainsi que tout employé
chauffé, qu'il dans laquelle on a fait
fondre de l'alun, celles acidulées, les
derrière le menton puis l'usage de l'empêcher
dans le cas de fièvre insuffisante, l'usage
avant ce remède ailleurs.

Classification de la maladie
Mugreux

Une autre affection de cette maladie
est son gonflement qui, quand il arrive
est plusieurs fois considérable et qui
s'élève au libre trajet de l'œsophage

la respiration. Cela survient
généralement chez les personnes qui ont
les reins bas et humides. On le reconnaît par le
pau le sentiment de gêne qu'éprouvent
les malades, l'inspiration des forces, et
ce qui se reconnaît très bien lorsqu'il
est vers leur orifice, qu'il ne faut pas
confondre avec les polypes qui y
arrivent, ce qui va jusqu'à l'inspiration
du bout du doigt.

C'est principalement à l'usage que l'on
a vu de son traitement et après
le voir pour cela de tout élargir
compresse, car des bandes de gaze
élastique, ou de linge, qui se font
la paroi de l'air les mœurs, et les
poussent aussi et en amplie, qui
disparaît par la position que l'on
donne aux personnes.

Des Ulcères de la Membrane

Chaque une des parties de la membrane
On ne doit point la confondre avec
une que nous avons examinée qui se peut
arriver à la suite de petites plaies, qui se font
à l'attachement des polypes etc. qui l'on a
distingué en deux et l'autre, d'après
le caractère qu'ils présentent, qui en ont
pu être ainsi envisagé, parce que
l'un est si l'on présente une membrane
caractère, et l'autre ne dépend que de la membrane
habituelle, ou nous sommes d'ailleurs l'opinion
croire qu'il se reconstruit par lui-même dans

82 l'impossibilité au virus. Sa venue de parties
 de ces des moyens topiques, qui font q^q
 tant de progrès et l'ont vu s'élever un flux
 qui s'élève si mauvaise admet qu'il n'y a
 à désigner sans le nom de l'écrou, par
 la ressemblance qu'elle a avec celle qui régnait
 une pousse lorsqu'on l'écrou. C'est au point
 que les personnes qui expérimentent celle qui
 s'en trouve affectée, qu'elle s'en trouve affectée
 q^q ils en sont que la suite de la écou
 pution de certains virus est de la galle
 de la tige de. au lieu par l'effet d'un
 virus, est de la maladie l'écrou
 constitutionnelle

Signes

On les reconnaît par ce qui s'est arrivé
 aux malades, ils sont affectés de
 certains virus, ils ont une fièvre par
 la mauvaise admet qu'ils caractérisent le
 mauvais caractère du flux qui s'écroule,
 par le sentiment qu'ils éprouvent, par
 l'inspection des fesses malades.

Traitement Il n'y a pas d'autres choses à faire pour
 les guérir, que de combattre les virus d'un
 côté, et de les combattre, avec les moyens
 convenables, pour les autres
 s'ils est possible des topiques appropriés
 Il faut aussi s'en servir avec les
 profonds, par bien d'autres raisons, et d'un
 proche les origines de fesses malades, avec
 moyen en s'en servant plus convenablement que les
 des antiquités, selon qu'on voit sur les

summaires de mêmes propriétés. Ils ont
trop réfléchis on pourrait que faire
usage que des liquides, que l'on réguirait
autour en l'air de Vapeur, ce qui pourrait
servir à faire dissiper la vapeur
adamo qui se exhale puis à donner un
meilleur caractère au pus; les Vapeurs
de Cuivre pourraient être mis en
usage, quand on verra que l'appareil
le fait du Palais, qui sont presque toujours
Vésicaire, il n'y aurait que le même -
anti-Vésicaire à faire employer.

Le 24 Mars 1780

De la Scieria De la fosse Chacale

Cette dénomination a servi à indiquer
plusieurs Maladies d'une nature différente,
c'est ainsi l'g. qu'on a rapporté la
même nom des éruptions de la surface
interne de la membrane muqueuse de la
trachée, de l'intérieur du cœur, de la vessie,
sur la quelle nous nous arrêterons pas à
en faire connaître les Vies.

Il y a une des plus fréquentes de celles
qui arrivent à la membrane oblique
de la fosse Chacale (les Maladies), les quelle
présentent différentes formes. Lesunes
y sont plus ou moins dures, dures, jaunes, rouges,
perforées de vices, d'âge, de couleur.
qui y donnent lieu, sont les vices, les
chutes de la peau, puis le Corrosif,
aussi les personnes qui en sont affectées
sont, y sont les plus exposées que

Chacale

Les autres... Il est des cas où ils arrivent
dans quinze jours à quoi cela tient, d'une manière
incompréhensible.

Ces ne se ressemblent pas également, il y
en a qui sont denses, ont une structure solide
tandis que d'autres ne forment point, sont de
nature spongieuse, élastique, quelquefois saignants,
tandis que cela ne point qu'il y a dans des
circonstances se fait au même attachement,
au même développement, étant à peu près
égales cas et d'autres fois à large base, diffère
de l'autre d'autre manière pour leur structure
et ce qu'ils ont en commun, qu'une croissance de la
membrane muqueuse des fosses nasales.
Ils arrivent le plus souvent sur la paroi
externe des fosses nasales, qu'ils se développent
également. Ils se font sur les bords, d'autres fois
sur plutôt sur la base, en ce qu'ils se développent
dans les replis de la membrane muqueuse,
qu'ils se forment en passant sur les cornues
étant proche la partie postérieure de cette
corne, ils tombent le plus souvent dans la
gorge.

Quelque fois ils sont uniques, tandis que
d'autres fois ils sont en nombre plus ou moins
grands, les uns acquiescent au volume considérable
des autres point. Dans le cas où ils se forment
sur les bords, ils se développent la partie antérieure
orbitaire et dégissent enfin en se développant à l'arrière
la partie palatine, au point qu'ils se développent
au point qu'ils se développent la partie postérieure
de la nez en se développant, de manière à produire

une grande difformité, en même temps, qu'il s'agit
d'être la source d'un bon air à la respiration.

En les reconnaissant les uns d'après les autres
qu'ils ont acquis un grand volume, que l'air
la respiration se trouve gêné; mais la chose
est plus difficile lorsqu'ils ne sont point off
sans alors examiner les fosses nasales, puis
si l'air y approuvera qu'il choue, soit en la
écartant avec les deux extrémités d'une pince
par l'introduction d'un stilet, on y portant
l'extrémité du bout de doigt jusqu'à la
seu reconnaître joint à la gêne que la
malade éprouvera pour la respiration. Indiquant
que l'on parvient à reconnaître la présence d'un
polype par l'introduction d'un stilet dans la
fosse nasale, on reconnaît encore la nature
en effet on sent très facilement filer
d'un épongeux, qui dans ces derniers
cas augmente dans les temps humides, tandis
qu'il diminue au contraire dans les
temps secs.

Il ne faut pas sans susceptible de guérison par le
vapeur qui sont parvenus à un grand volume
qui ont été développés les parties correspondantes
à la face, carment on parvient à la guérison
tandis qu'elle est parvenue à un grand volume
autres y parvenant à un grand volume
moyen de pincer le polype avec les
doigts, afin d'en pincer le polype qui est
pénètre mais cela n'est point facile à faire
et est communément l'usage de la pince
même que la compression que l'on

86^e également taché de faire, qui en doit
pluôt être faite, toutes que les maladies ne
présentent point de répugnance pour le moy
suivant, qui s'il en présentait alors l'acide
ferait tout avec de la charpie, des linges fins
des cordes aboyans, que l'un aurait fait de
trompette avant dans du bœuf.

Les autres moyens pour les guérir sont
1^o la Contusion qui se fait avec des tablettes
chimiques ou de la pastille contigue de, mais
communément pour les appliquer puis les
cointures de toile, qui ne peuvent être mis en
usage à cause du voisinage trop proche de
l'excision. 2^o l'usage qui se fait avec des
guirlandes de perles qui ont été faites avec
ligatures, qui ne sont pas employées à cause de leur
difficulté. 3^o la Pédicure qui se fait avec
petite scisselle, à la suite de plusieurs autres
que l'on fait passer dans les forces nasales
en s'en ramenant une extrémité par l'autre
au bout de laquelle de même qu'à l'autre
on fixe un manche afin de pouvoir
les tirer en dedans intérieurement, qui ne sont pas
plus mis en usage. 4^o l'acrobatement qui se
fait au moyen de pince faite caprice, 5^o
la ligature, qui consiste à embrasser le
périphe dans une avec de fil et à en faire
la construction.
Si l'on examine ces différents moyens les
avec l'autre, l'on verra que c'est l'acrobatement

qui courent le long de la ligature, qui
sont les deux qui sont les plus employées
en usage la ligature présente par la difficulté
à faire et que l'on peut point sur de temps
l'un l'un le foliole, plus qu'elle cause de la
douleur aux Malades. On dira à la vérité que
l'arrachement en cause aussi, mais jamais
elle n'est aussi forte que l'on a décrit au
premier abord, mais que le polypie fait
toujours souffrir plus au moins le Malade.
Les avantages qu'il y a en autre d'une, est
que le plus Malade il ne laisse point de
travaux de polypie, tandis que la ligature est
par de même, ce qui fait que l'un est il
revient. Mais une infirmité en est la bonte,
mais elle est d'une nature différente.
en lieu que le polypie qui est fait lorsque
est la ligature qui a été faite il est d'une
nature différente en l'un.

L'arrachement se pratique avec des pinces
qui sont construites de deux manières, la première
ont leurs crocs légèrement saillies et
perçues, ce sont des pinces anciennes. Les autres
sont plus dures et dures, elles sont
cristallines ou dures. De nouvelles en l'un
ont à dire de l'un et de l'autre, il y en a
qui s'enlève avec les forceps. D'autres d'autres
branches sont destinées à l'arrachement. Les autres
sont encore tout à fait dures et dures
elles se l'employent lorsque le polypie est d'une
nature différente, parce qu'elles s'arrachent

Secundo
25^e d'inspiration

plus facilement dans les cavités nasales, fin
imperfecte celles dont on se sert, voici comment
l'opération se pratique, le Malade est assis
le Chirurgien debout à côté, introduit les
pinces à forceps si la tumeur est grosse ou
les autres si elle est de moyenne grosseur,
en saisissant la tumeur et cherche à la décoller
en tirant et faisant des mouvements de rotation
c'est-à-dire se fait point quand une tumeur
pinces à forceps se casse, car on pourrait
briser les os, alors on se contente de faire
des petits mouvements de circumscriptions
entrefais, on dirait les ailes du nez pour
avoir plus de prise et de facilité, mais
on n'a point aucun avantage et plutôt de
la difficulté. On y supplée par la division
de la tumeur, quelquefois on voit qu'elle
est grosse. Cette division se fait avec la pointe
d'un bistouri, dont la tête de la lame est
entourée de linge. Pendant l'opération il y a
toujours hémorrhagie, qui empêche de voir
l'intérieur des cavités nasales, et que le Malade
encaillant dans le bazar. On la divise
en faisant venir de l'eau fraîche au nez
s'il doit quand respirant il faut qu'il s'en
gisse l'opercule au libre passage de l'air, est
une chose qu'il y a encore des lambeaux
qu'il faut arracher. Enfin avec l'assent
de l'opérateur, on peut de toute tumeur,
par la liberté du passage et l'assent
de l'opérateur du Malade.
L'opération bien protégée il faut toujours

l'attacher au gantement de la piteuse. 89
L'hemorragie par la tige qui pousse à l'angle
par le siphon des Hystères, ce qui est
dans des cas de respiration, qui se
pratique de la manière suivante. Il faut
prendre une Dabbe au sein d'une grande
charpie ou de linge fin, d'une grosseur
convenable, attaché au bout d'un fil, ou d'un
bande de gomme élastique au sein d'un
morceau, que l'on introduit dans la pite
l'on a ceppé, et la cage n'est pas ouverte au
Gros arénaire, ou l'air se rend dans la
cavité du sein au sein des pite, au sein
de la tige. L'air se rend par la
bouche au quel on fixe le siphon. On
la bande est en outre attachée par la cage
nasale laquelle entraîne le siphon et le
fil l'angle se trouve attaché le siphon.
L'air se rend au sein de la cage appliquée de
cette manière. Le siphon se rend à l'origine
postérieure des fosses nasales, qui se rend au
dehors des deux brins de la tige que l'on
tient et qu'on place au sein de la tige, et
qui fait une fois qu'il se trouve fixé, on
arrête les deux brins de la tige, que les
fosses nasales se trouvent bouchées en avant
et en arrière de cette manière.

La digestion peut se faire par différents
moyens. 1^o on peut se servir d'un siphon
ou d'un filtre, ou d'un verre qui se
propose. Beaucoup de personnes qui se servent

80 à exécution. Je trouve il intraduisait une
bende de gommeastique dans les castes
nasales, pour l'extrémité. Il est retiré par
la bouche après en avoir élevé l'extrémité
opposée au moyeu de son index dont elle
est munie que l'on retire dedans. A. On
peut dire aussi que l'appareil est une bande,
1.° une bende avec une aide de gommeastique
d'un petit calibre armée de son stéthoscope ligé
à l'apex d'un pied et demi, formée par des
fils ^{ouverts} et liés ensemble. 2.° une aide de fil large
d'un pied, 3.° les deux extrémités de la bende
portant l'un par la bouche l'autre les os armés
d'une configuration aide et l'un fixe à la première
l'autre chef de la ligature et les deux bouts
de la bende. B. Le Chirurgien prend la bende et la
retire par les charnières et avec elle les fils
qui y sont attachés. 4.° Il détache les fils
fait tenir le pied sur un aide, qui fixe
en même ^{temps} la commissure du pied à l'aide par
la bende avec un des chefs de la ligature
qu'il laisse libre. 5.° Il passe le chef de la
bende qu'il fait glisser d'un bout le pied
du Palais jusqu'à la base du Palais, portant
ensuite tout autour de la base l'extrémité de
la bende, il décrit avec la ligature une
arête dans laquelle elle se trouve enfermée
6.° Il prend la bende retenue à la commissure, la
fait passer dans le pied même, la fait passer
par les bords qui portent par les os armés
il la retire à lui. La bende est en haut et
les os de la bende même, encastrée à la base

du talon le chef de la ligature qui a-
 sert à la circonscription et l'entremise
 en dehors par les arrières antérieures. Au
 retour la cavité devient inutile; le sang sort
 de la ligature sans passer dans l'anneau
 serré, qui ne fait qu'être multiplié
 des fois doubles, jusqu'à l'écoulement de l'urine
 qui est étranglé avec plus d'annulations
 8. Le serrage se fait dans les formes
 sort comme dans les polyèdres de la cavité
 et du sang, à rompre chaque annulation
 de la ligature, qui ne tarde pas à procurer
 la chute de la tumeur.

Locum 27
 2. 6. Sturion

Maladies des sinus

Ils sont comme l'air de l'ombre de l'air
 1. Les fronts les entendaient et les
 cavités nasales nous ne parlons seulement qu'en
 premiers et des descriptions en degré beaucoup
 demander par une description particulière, via
 qu'en l'usage malades entre d'autres celles des
 cavités nasales en général.

1. Les sinus frontaux ont une ouverture
 à l'oreille affectée de Maladies, si ce n'est tout
 est de rhinorrhagies qui y ont lieu, de
 catarrhes, des tumeurs, fongues, encre de
 decouvertes de l'usage à l'usage ne peut pas
 être reconnues.
 Des vers peuvent encore se développer
 de même que dans les cavités nasales mais
 cela est très rare, cependant on a vu des
 exemples, dont on ne connaît pas le nombre
 cause. On ne sait pas trop si ce développement
 spontané, ou si on l'a tout à fait

cause

augmente de la membrane qui peuvent être
les suites d'un cataracte soit aiguë, ou chronique,
qui arrivent encore d'une manière spontanée. Cause
au lieu qui succèdent à des vents à des
chutes faites sur la nuque, cellulaire, de
même qu'à la suite d'adentatie. Quelque
soient les causes qui y donnent lieu, mais
qu'ils existent, le fluide est toujours
d'ordinaire en grand point de viscosité
prend une autre consistance, et devient un
irritant pour la membrane qui se fait
qu'il s'ajoute encore une lésation plus
forte. Accumulé en certaine quantité il
distend petit à petit les sinus, ce qui, d'un
côté, mène que le fluide y devient
et ne peut pas sortir à cause de la position
des os, de la structure, parvenue enfin à un point
d'être les parois l'unissent et se rompent,
ce qui procure au pus d'écouler dans
le tissu cellulaire et de causer des abscesses, soit
sur les joues, soit à la plante du pied,
au bras ou jumeaux ou autre endroit au
plus sensible, ce qui se fait d'autant mieux
au jumeaux qu'il y a d'autre de manger.
est extrêmement difficile de reconnaître la
consistance de pus tant qu'ils n'ont pas acquis
un certain degré d'arrangement dans la configuration
ordinaire des sinus, par conséquent devant
pas fleurir de pus. Il n'est point de
même toutes les fois que la nature n'a
pris tout ce qui existe des dépôts
ou des fistules, parce que dans cette dernière
circonstance est dans celle-ci, une fois existant,

Il faut y faire entrer un stilet et l'on
s'efforcerait plutôt une comminication
avec le sinus, qu'il pût être utile-ment
donné qu'on pût en avoir.

Consistent Au sujet y remède qui n'agrandit pas
l'ouverture. Elle existe, on l'imagine y sur
une, que l'on fait, soit au palmar, soit au
côté, au lieu dans la fosse nasale, l'on
regarde dans en regardant des polypes, qui mesurent
faite. L'on y fait des injections - pour l'autre
sont la nature. L'opération est une tumeur
qui peut changer les propriétés de la muqueuse
de l'ouverture, et la première qui est proposée
moyen, en avertissant au tact de faire
des injections par son ouverture, ce qui
pourrait être. L'on a vu de ces tumeurs
dans l'état naturel par les os qui l'ont
et la membrane muqueuse qui l'entoure, qu'
étant un peu effarouchée, l'ouverture encore
en supposant qu'on y pousse encore par
le moyen d'un doigt - faite à la suture,
elle ne craint que la tumeur de l'ouverture,
ce qui restait, toujours une certaine
flatulité dans le sinus.

De la Les fongues du sinus & Maxillaire
du sinus. On donne ce nom à des excroissances qui naissent
27 *Stupide* dans leur intérieur, produites par la membrane
muqueuse, que des pathologistes ont nommé
la tumeur. On a vu l'existence de ces fongues
Existe aussi également de l'os, d'abord à la
que l'on forme, ils acquièrent un volume
considérable, au point de dilater considérablement

qui une fois parvenue à ce point, ils réduisent
les forces arbitraires, et même temps
qu'ils dégouttent en bas la corde dentaire, ce qui
fait que la articulation devient gauchée, à
raison que la machine inférieure ne porte
pas d'appui sur la supérieure. Il survient
aussi un tel dérèglement qu'il seroit impossible
de s'en guérir à l'ordinaire, si l'on attendoit
jusqu'à ce que la maladie soit parvenue jusqu'à
point au point où elle pourroit aller.

C'est tout ce que l'on peut dire de ce
règlement de l'articulation, comme
l'articulation des parois des sinus qu'il y a
lien de les reconnaître, car dans ces cas
le pourrait guérir.

Revenons aux moyens pour lesquels on
les mêmes que pour ceux des sinus, mais
unus non dicit que les inspirations de liquides
asthéniques et l'asphyxie peuvent être
propre, mais qu'il falloit même avoir
recours à l'asphyxie, il en est de même
pour ceux-ci, auquel on peut joindre
même l'usage du capotier naturel après
avoir été fait, pour détacher tout ce qui
pourrait rester, mais avant il faut
mettre en usage qu'après avoir reconnu
incalculablement qu'il pourroit en résulter quelquefois
que le rapport des sinus avec les parties
environnantes, lorsqu'ils se remplissent.

On ne peut se faire l'articulation que
dans le cas qu'il existe une ankylose, pour
elle sur une même pratique une question
peut faire dans trois endroits différents.

[illegible]

le tour d'une injection horizontale, et
est de bas en haut. On pourrait encore
l'imitation de Diderot dans le cas de l'urine
entière les au moyen d'une pince de
Maillet.

Si s'agit pour une opération faite,
on y fera des injections pures
ou avec du lait, ou avec du vin, ou avec
une camelle, ou bien avec du sang.
Si l'on veut dans l'imitation d'urine
l'urètre, on y perce la paroi de
de fluide qui s'écoulerait aussitôt que l'on
perforerait la membrane. Si l'on veut
que d'y pratiquer une ouverture il en
résulterait une, et que l'urètre y avait
au moment de l'opération.

Maladies de l'urètre.

Elles sont peu multipliées pour quand on
qui regardes les chirurgicales, d'où nous
avons à nous occuper.

1. De celles causées par vice Originel.

Rarement il en est de graves, si ce n'est
qu'il manque en plus au point de vue de l'urètre.
Quant à la quantité de fluide qui s'écoule
dans la partie supérieure de
l'urètre, qu'il n'y ait que la plus petite portion
de celle qui se trouve dans l'urètre, ou bien même
qu'il n'y ait pas du tout.
De même que la muqueuse de l'urètre
est lésée; ou enfin qu'il soit d'urine
dans tout son intérieur, par la présence

88. *Idem fluida, non aut. tunc sunt ydrapitica, que tunc
in summa acceptatis*

Il est à observer que les enfants qui naissent sans cerveau, ou en grande partie débile ne vivent pas longtemps, ou même ne vivent que très peu de temps, mais cependant l'usage des sens et des muscles, puis même ce qui tient à ce que les fonctions par apparence de la vie animale, ne paraissent en recevoir l'influence, la respiration en premier lieu, l'action musculaire ensuite &c, ne paraissent pas être affectées librement.

Il a été convenu que le Cerveau feroit
recevoir à travers le palais du Crane, par les
proluniques. // Les sinuaires.

prolifiques.
29. Des Maladies organiques.
Leçons sur les affections organiques du cerveau, leur
entièrement du rapport de la phlogose,
les faits qu'elles entraînent, les fonctions, et
pourquoi elles ne sont point du ressort de la phlogose.
Il est en de même pour celles dépendant de
la phlogose de son organe.

Effection de la Dureté
 Il y a une éruption ad. en apparence ou
 éruption de fongues de la même manière
 que les éruptions éruptives, mais qui
 diffèrent long le rapport d'avec les autres,
 et on doit faire attention qu'on ne doit
 prendre pour cela, celles qui surprennent
 lorsqu'elle est mise à découvert, comme qu'
 une portion de crâne a été enlevée, pour
 l'action de corps extérieurs, comme dans l'éruption

cas, elles qui différencient des précédentes
en ce qu'elles ressemblent à des espèces de
granulations. Jusqu'à présent les vaisseaux
qui de celles qui s'inscrivent à la surface
du Crâne, tandis que la dure-mère tapissant
sa base en est également susceptible, ce qui
est même infiniment rare.

En nous bornant à celles de la tête, nous
dirons qu'elles peuvent être minces, moyennes,
qui ne font développer peuvent acquiescer
Volonté considérable, ou bien ne pas grandir
beaucoup, ce qui est également grand elles
sont très multipliées, de la même manière
que cela a lieu pour les loupes, les tumeurs
lymphatiques, et d'autres qu'elles contiennent
dans leur intérieur un fluide, de manière
qu'en touchant elles présentent une espèce de
fluctuation, ce qui se a souvent pour
des vaisseaux à quelques praticiens, d'imaginer
qu'il y a des anévrysmes à cause de leur
salement produit par le Cerveau, qui
les rendent si une des artères principales
et capillaires internes. On suppose qu'elles font
des progrès elles peuvent sur le Cerveau
et même temps qu'elles irritent la surface
interne du Crâne, qui petit à petit parvient
à les braver et se insinuer à l'intérieur.
Il est à remarquer qu'elles ne saignent
pas le Cerveau, autant qu'on le croit
premier à dire, parce qu'elles ne se développent
que d'une manière lente, ce qui n'aiderait

90 point hémiparétiques le faisant d'une manière
prompte, par lequel si habituellement et paulatim
trouble par ses fonctions. Elles n'ont point
plus de force de Crâne à l'extérieur qu'à l'intérieur
ce qui est facile à juger en faisant attention
que le crâne est beaucoup plus petit que le cerveau.

Causa

On ne saurait pas quelles causes
causent, au lieu d'affaiblir le lien sans qu'il
ne soit comme d'autrefois à la suite d'un
d'attaque, ou bien par effet de la chaleur
véhémentes.

Signes

Parfois les forces qu'elles ne causent d'abord
à l'extérieur, qu'elles ne se sentent pas fait en
au moment même les symptômes, mais
les douleurs de tête très fortes qu'elles causent
ainsi que les céphalalgies opiniâtres en ce
quantité de causes peuvent y donner lieu
malgré cela il est cependant des praticiens
qui dans les grandes épilepsies qu'elles causent
un profond effet du Crâne en même de
la persécution de l'encéphale d'être en état
de l'attention de les insérer par l'application
d'instruments tranchants ce qui a été
avec succès. Cependant on ne peut pas dire
lorsqu'on les a du Crâne tant pressés par
elles sont si près de la persécution de l'encéphale
qu'il ne changeant pas le volume de la tête
qui diminue les mouvements convulsifs
celui des artères, qui sont comprimés
troublent les fonctions du Cerveau, les
appétits, des sens et qui occasionnent par là
Après cela on ne peut pas se méprendre
sur leur action, à moins qu'il en soit disposé

des artères carotides, ce qui
est infiniment rare, si l'on ne considère
à cause de leur petitesse au lieu d'une
hernie du Cerveau, mais c'est de l'écoulement
qu'on voit chez les enfants nouveau-nés,
par l'écoulement des vaisseaux du Cerveau,
de la carotide.

Il y a d'autres moyens d'apaiser la douleur
en appliquant les cataplasmes que l'on fait de l'opium,
ce qui se fait en les mettant à l'écart et en
divisant les ligaments et en appliquant plusieurs
cathartiques de l'opium; Il ne faut point le faire
dans tous les cas que l'on ne s'aperçoive
présence car sans cela on s'expose à
causer des accidents aux cataplasmes. Un autre
moyen d'écarter ou de faire l'opération
avec des instruments tranchants, on l'a
fait avec des cantharides. à l'usage de l'opium
La douleur est encore exposée à des à l'usage de l'opium
convulsions souvent, ce qui est un grand
recommander pendant la vie.

Effluvia de la racine
Elle est susceptible d'être affectée d'asthme
laquelle peut être affectée d'asthme
Elle peut d'abord se terminer par résolution, à l'usage
de suite par une lésion par suite de
toute son surface intérieure de manière
forme une fausse membrane par suite de l'usage
C'est ce que je crois, puis par l'usage de l'opium,
qui donne lieu à une accumulation
de sang dans son intérieur de manière
produire ce qu'on appelle hydropneumonie
qui se termine en si grande quantité, qu'il

Il y en a deux dans d'autres parties, qui sont
aussi très grandes, elle se trouve dans la
épineuse produit l'hydro-rachis.

Quant à l'hydro-céphale, elle a été distinguée
par rapport au lieu qu'elle occupe en
et en interne en ce qu'il peut se faire aussi
infiltration de sérosité dans le tissu cellulaire
intérieur du crâne.

Externe 1^o pour ce qui regarde cette dernière elle est
plus rare que l'infiltration du tissu cellulaire
des bourses, mais qui a eu assez bien pour
venir en d'autres. On y remédie lorsqu'il a
par le moyen d'une compression que l'on
a la tige de la tête, on bien par l'usage
de compresses trempées dans des liqueurs
résolutives, qui si elles ne rendraient pas, il
aurait recours à des incisions, qui dans
peu de jours guérissent le tissu cellulaire externe.

interne 2^o Quant à celle de l'intérieur du crâne,
peu existe entre la dure-mère, et se trouve
dans l'intérieur de l'arachnoïde, puis dans la
Ventricule du Cerveau. 1^o pour le 1^{er}

Cause il est infiniment rare de voir un accu-
sation de fluide, il est même des pathologistes
qui nient la possibilité d'une telle accumulation
n'est pas susceptible d'évacuation à cause
de sa texture fibreuse, cependant qu'on en
rapporte des exemples tels que l'allo-rachis
de Morgagni. 2^o Quant à celle de l'intérieur
de l'arachnoïde, elle peut être produite par
le défaut d'équilibre entre les vaisseaux
exhalants et les absorbants, ou être la
suite d'un flux ou d'un reflux sanguin dans la
tête, ou bien dépendre de l'affaiblissement

Voici, de la même manière que cela à
lieu pour l'Hydrothorax et l'Hydrocéphale. Mais
le plus volontiers l'Hydrocéphale dépend de
l'affection essentielle de l'encéphale, de la
même manière que cela arrive pour l'Hydrothorax.
Cependant il en a point d'essentielle qui est
le dépendit q^q du Cerveau, de même que
pour l'Hydrothorax est produit par l'affection
des membranes du Cerveau, qui le plus
volontiers dépend de l'affection du Cerveau,
ce qui est assez souvent réversible. On assure
qu'il arrive aussi bien après la naissance,
plus ou au moins proche de l'accouchement,
ou avant chez les fœtus et longtemps après.
34. Enfin on a vu des circonstances où les
ventricles du Cerveau continuent de se
vider.

Le fluide séreux s'accumule dans
la cavité de l'encéphale, ou bien dans les
ventricles du Cerveau alors la distance de
même que les fœtus de Crâne, ce qui fait
que la tête ou cela arrive pour un volume
considérable acquiert une forme suture. ce qui
permet q^q de se développer dans
l'encéphale, lorsque c'est pour un fœtus. On
peut remarquer que quand cela arrive chez
ce dernier et même chez les enfants, la
tête se développe considérablement et
prend un aspect particulier, qui q^q
naissent sans fœtus de Crâne.
Lorsque cela a lieu avant la naissance
ici ce qui arrive, la tête du fœtus prend
acquiert un volume considérable, ce qui

On voit que le Crâne est très Volumineux par
l'écartement des os, ce qui est au point que l'on
ne peut franchir le passage, et qui cause
le point de l'accouchement qu'il y fait une entaille
pour donner issue au fœtus, lequel étant
exacé parvient au os de la rapprocher et
permettre l'accouchement. Quelquefois ce point
la tête s'opposant très Volumineuse au passage
par le défilé de la fosse, ce qui arrive tant
les seuls efforts de la nature, ou d'un
l'application des secours, ce qui regarde
spécialement l'art de l'accouchement.
Enfin il se fait que cette offre
s'arrête, une déviation après la naissance
ce qui se reconnaît tant de suite par des
signes apparents, au lieu plus au moins est
qui met fin qu'ils se font voir acquis
en peu de temps après de progrès, la tête
prenant un Volume considérable, par la
pression du fœtus, les parois de l'écarte
ce qui fait qu'en appliquant l'air et l'air
l'endrait qui résulte de l'union avec
un intervalle peu grand, avec les incisions
du Crâne, le fœtus se dégage et sort
ce qui fait que l'angle frontal se déforme,
d'où l'on remarque que l'os front est en
abrégi, qu'il est idos et que sa fonction
intellectuelle ne se développe plus, laquelle
plait d'un sentiment partiel dans
l'intérieur du Crâne, la tête devant
tomber en avant, ce qui admettant plus
que les os osseux recouvrent leur activité et
que toutes les fonctions de la vie diminuent.

languissent, à cause du défaut d'action.
De la part du Cerveau l'un est par
l'intermédiaire des nerfs.

On convient assez généralement que cette maladie
est incurable, cependant il est
des praticiens qui se sont tentés la
guérison par l'application de topiques
résolutifs appliqués sur le Crâne, la compression
puis par l'ouverture du Crâne au moyen
d'un froidroit. Il n'y a point d'inconvénient
à faire usage des résolutifs, mais il n'est
point de même des autres moyens. D'abord
la compression au crâne n'est pas bien
guérissant, par elle l'on se lève du Crâne,
on donne lieu au fraicissement du Cerveau,
qui au lieu de produire un bon effet est
au contraire très mauvais. Quand à l'ouverture
du Crâne on ne peut pas dire qu'elle
est avantageuse, puis de tous les effets
qu'on a fait à ce sujet n'ont point réussi,
donc on a que deux exemples l'un
rapporté par Mergatry, l'autre par
Lect, qui la firent chacun sur un enfant,
les quels moururent tout les deux peu
de temps après; on en veut d'autres, mais
qu'il ne faut pas y tenter.

De l'Hydro-Céphale, ou Spina
Bifida.

Cette maladie consiste dans une accumulation
de fluide dans l'intérieur de l'épaulement
vis-à-vis le canal Vertébral laquelle
est causée par une promérence de l'épaulement.

Estle dos, à une forme une tumeur dans
et endrait, qui résulte de l'écartement
ancien des tumeurs dans cet endrait, ainsi qu'
par la rupture des membranes qui sont
les collections de pus ont beaucoup d'appar
en venant au monde, qui est plus ou
considérable sans changement de couleur
peau au l'air restent une espèce de fluctu
goffe, n'attant avec une hydrocyste, tant
que d'autrefois elle est dure. Elle arrive
plus souvent aux femmes, mais qu'elle fait
moins aussi au dos et même aux, que qu'
elle y existe présente un volume plus consid
Pensez que partant ailleurs à cause sans doute
signes de la proximité avec le cerveau. Les
symptômes indiquent les causes. Au la cause
d'une par la présence d'une tumeur dans
le dos, sans changement de couleur et
à une espèce de fluctuation etc.

Au ne réussit pas à guérir aucune
puer la guérison est qui fait qu'elle est avec
mortelle; Sotina et Caspary ont été
essayant de se faire guérir, mais ils se
trouvent, sur la nature de la maladie
Il faut bien se garder d'en faire l'usage
car on a remarqué qu'au lieu qu'elle a
forte, que les infirmités sont étouffées. Il n'y
aucun moyen à prendre qu'il faut
méthode de Caspary est à dire d'enlever
une compression sur la tumeur, pour
supprimer à la marche.

198 *aryugotamies*

signe . . . Me l'ame avec par une douleur dans
l'aryugotamies, un changement de la voix qui est
difficile, comme au début, par une gêne dans
la respiration, puis qui est par une gêne dans

traitement . . . On y remédie par tous moyens, mais
les inhalations hypertoniques, car les variations
cardiaques qui s'ensuivent ne s'arrêtent pas il faut
se tenir à l'équilibre qu'il s'agit d'obtenir
un peu plus tard, parce qu'il
est remarquable que souvent il ne va pas rétro
parce qu'on l'a fait trop tard, attendu
que les bronches se remplissent de mucus
et que malgré qu'on ait donné accès à la
la respiration ne peut pas se rétablir.

Descript 1^{re} à l'origine des Enfants au le Groupe, qui
est chez eux la même chose que chez les
Du Groupe adulte se fait remarquer plus dans certains
autres (que dans d'autres, N. G. et la R. G. et la R. G.)
et autres autres elle est plus fréquente que
chez nous, qui se fait encore remarquer
chez qui ont la petite vérole constante.

signe . . . Effectivement par une diminution
de la gorge, une difficulté de la respiration
le changement de la voix par une gêne
un peu, qui est causée par la membrane
un peu, le quel peut souvent empêcher
plus de constance et s'oppose tout d'un coup
De l'aryugotamies, qui s'élève par suite dans
la trachée artère et les bronches.
traitement . . . On doit la combattre comme dans le

cas précédant pas tant les moxas dénommées 99
infirmité dans cette espèce d'indurité
empêchant d'appliquer tant l'intérieur du larynx
et qu'il a à l'âge adulte traversa les enfants
d'être en l'état d'indurité probable qu'après
même les l'uv' pénétreraient la laryngite
quelle ne réussiraient point, il faut en effet
venir à la trachéotomie, opération qu'on
peut encore s'en faire à cause de la
position de l'artère aorte qui ne pourrait
être guérie de difficulté.

[illegible]

Des cadavres.
On ne peut trop les reconnaître que signe
par un sentiment particulier dans la
larynx, la difficulté d'expiration.
Et pas trop qu'il y en ait.

Au ne peut pas trop qu'il le vient de Continuer
 moyen à mettre en usage pour guérir
 en guérir les malades. Il faut donc qu'il lui
 apprenne le langage de l'âme, puis insensiblement
 en fit la légature de l'âme parait, après
 qu'on en a fait l'âme intérieure en fait les fils
 écarlate qu'il ne tombe dans la
 traque. Voilà qu'il se sent de son pouvoir
 mettre en usage le sergent fléchissant

100 en supposant toute fois qu'en pu l'apurer,
à moins qu'on n'arrête le sang; au risque
de laisser une plaie ouverte en utero d'où
viendrait une infection, qui pourrait pro-
duire d'ailleurs à la Colère d'infestation
non, parce que il pourrait se faire qu'une
primifragie en l'air, requireroit le
mort, parce que le sang s'écoulerait dans les
Panneaux.

Second
à l'entente

De la Sténie d'aryugé

Elle consiste dans la carie des Costalages
du d'aryugé, qui à le plus souvent son siège
aux Costalages, près au Cricoidé succédant
presque toujours à une inflammation de la muque
Membrane laquelle existe qq. fois consécutivement
à la Pulmonaire, qui cause une altération de
la voix, qui va toujours en augmentant ce
qui tient au soulèvement à la Sténie de l'aryugé
mais encore à la foiblesse de l'organe Pulmonaire.

Causes.

Elle peut être produite par quantité de
causes, la plus ordinaire étant la présence
d'un corps étranger dans le larynx, la repulsion
certaines fibres, &c. qui qq. fois n'est que consécutive.

Signes

Elle est caractérisée par une douleur dans le larynx, une altération de
la voix, une toux p. m. forte et de longue
durée, qui toutes les fois qu'elle se présente
est suivie d'un accès de la toux convulsive,
ou expectoration de mucus, qui finit par
paralyse. Avant d'être p. m. habituelle, elle
reconnaît, en ce qui n'est pas p. m. de l'aryugé.

102. d'une bande de gomme l'éthère introduite
d'abord par les fosses nasales au larynx
qui de suite se ferait pénétrer dans le
id. avancée par le doigt qui est très ingé-
nieux pour être faite chez les personnes qui
sont de répugnance pour l'opération la gorge
n'est jamais percée il y a interruption du
délais par la bouchée ou les cavités nasales
la pratique l'opération, parce qu'il suppose
qu'il y ait interruption de l'air de ces cavités
telle que pour la bouchée par le gonflement
de la langue, alors les cavités nasales sont
closes, tout-elles bouchées et par là même
de charpie de la bouchée est libre et ne s'ouvre
que cela en lieu qu'il y a une inflammation
des tumeurs qui s'élèvent même de la gorge
pour le moyen de leur volume, en sorte que
que la partie postérieure des orifices des
nasales, qui interrompent le passage de l'air
pour cela on se la pratique qu'on s'ouvre
à la dernière toutes les fois qu'elle s'ouvre
enquise de la gorge de la bouchée
pour s'ouvrir, en sorte d'une grande quantité
de mucus. On la pratique infère au larynx
pour les yeux, en sorte qu'il ne
pouvait s'ouvrir, en sorte qu'il ne
traverse fortement abaisse pour l'ouverture
la partie supérieure de la gorge, de sorte
qu'il ne pouvait plus respirer, fait qu'on
s'élève avec grand effort, mais en sorte
plusieurs fois, mais qui n'est combattue

Louis d'une manière pictoriense, et d'autant 103
que cela n'est point vraie, ou l'a plaignant
luis avec autre idée, le quel est tombé dans
une autre erreur. Suffit il dit que cela ne
fuit qu'un peu l'entité d'une plus ou moins gr.
quantité d'air dans les pannes, & de telle
sorte qu'ils se trouvent remplis. A l'entité
il y en a une bien autre, mais pas assez pour
produire la mort. C'est par un état
d'asphyxie qu'elle arrive, par un moyen de passage
du sang noir dans le système à sang rouge,
lequel passant dans les pannes n'est point
admixte au rouge et par là propre à aller
exciter une action; ce qui le prouve, c'est
qu'un vent puer de personnes qu'on a tirées
de l'eau d'aveu qu'on a vu de la vie, chez qui
la respiration ne peut pas se rétablir parce que
la petite quantité d'air dans les pannes
et d'une l'air a une grande extention de
matière engendrée, de sorte qu'il n'a ni
plus de force jusqu'à ce que les signes se rétablissent.
On venant d'après cela que l'oppression est
inutile, qu'il faut même engendrer la matière
à l'air libre, l'action de lui ramener la
respiration au moyen de frictions faites
sur la gorge. Entendre de la tenue d'air dans
les pannes de l'air dans les pannes de l'air
dans la gorge faite par une frappe dans
la gorge qui y produit le quel l'air se doit
la respiration. Cela semble indiquer qu'il faut

10^e point ~~accidentellement~~ rare d'yeux traversés. Par
des corps étrangers qui passent & traversent
accidentellement. On ne la pratique pas tard dans le
second cas de polypes à cause de l'infirmité au l'ou
3^e point sur lequel on insiste.

On pratique q^uest l'opération de la traché-
e en place de la laryngotomie. toutes les fois qu'
des circonstances la nécessité d'y recourir, tel
dans le cas où des corps étrangers passent tel
dans la trachée qui peuvent occuper trois lieux
différents, ils peuvent être placés en haut, dans le
bas, au bifurc, être libres, & peut se faire
qu'un des corps étrangers bouchent l'ouverture
au lieu de la trachée et compriment celle-ci par
le moyen d'une portion membraneuse. Des
tranches également. Des corps étrangers se
trouvent précisément dans les bronches, on ne
pourrait rien faire, il n'y a que la main
seule qui puisse leur faire passage.

Il faut que le docteur qui fait l'opération
de la trachée, la possibilité de l'introduction d'un
tumeur de gomme élastique dans le larynx
au moment où se pratiquent l'opération d'inspiration
pénètre immédiatement l'apophyse d'inspiration
dans l'intérieur de la cavité introduisant
en y faisant passer qqe liquide blanc ou noir
de sorte qu'elle pénètre dans la trachée qui
aussitôt qu'elle y fut entrée le malade entre
dans des tressaillements très forts, ce qui le surprend
au premier abord, lesquelles le ramènent à
par la même introduction de qqe
liquide dans elle, ce qui diffère de la traché-

lui fit comprendre qu'elle étoit permise 10.
D'après la thèse, Chouzei si on s'en tient aux
données de son expérience. Dans cette cavité
il se tient, ainsi en outre de la toue et
du sentiment de malaise que les malades
y éprouvent, par la disposition d'un bouchon
vis à vis l'air, que lui serait substituée
être agitée et même soufflée par l'air
qui en sort, lequel se profita par suite
pour donner lieu à la respiration des
malades, soit dans le cas d'insuffisance de
la membrane muqueuse du larynx, que
pour des corps étrangers dans l'œsophage,
de même que plusieurs autres pratiques
depuis lui. On voit par là qu'on peut se
dispenser de pratiquer l'opération de la
laryngotomie, surtout chez les personnes
timides, de sexe, pour éviter toutes
espèces de cicatrices au col, et plus
particulièrement à certains qu'à d'autres.
Cependant elle ne présente pas autant
d'avantage tant de suite qu'il semblerait
au premier abord, parce qu'alors il
est des personnes qui ne pouvant pas supporter
à l'opération les introduira elles-mêmes, et ce
très difficile à guérir peut être au contraire
que c'est notant qu'il se mal adressed à l'abandon
l'opération est qu'on la pratique d'habitude dans
les parties qu'elle touche avec l'opération
ce qui donne lieu à la toue, puis enfin
est que la grande quantité de mucus

108. qui se trouve signifié au-dessus les y mon de
la lunde, la respiration peut manquer et faire
petir les malades, ce qui se présente pas
la laryngotomie, qui est facile en qu'il est à
faire, et qui est suivie de succès, aussi sont
incertaines qui font que on ne s'en soit pas
être pas autant qu'on le croit. Disant qui sont
bien de la lunde tant cela avertit il doit projeter
faire en sorte que l'extrémité de la lunde ne
soit collée. Disant de la lunde, soit elle ne
résiste qu'une lunde au-dessus.

Il est cependant à remarquer que dans
l'opération à l'extrémité dans le plus grand
nombre des cas, de même que l'opération
qui s'élève peut en bien, soit par ce que
la lunde trop longtemps à l'extrémité, l'extrémité
de la lunde sont remplis de l'extrémité.

On peut faire l'opération de la lunde par
les foyes de la lunde, de même que par la lunde,
mais il faut s'en faire par la lunde, en
ce qu'il est plus facile, et plus sûr pour
les malades.

L'opération de la lunde se fait de
deux manières différentes, au-dessus de la
trachee artérielle, qui se désigne sans la lunde
de la laryngotomie, qui est la première de
l'opération par la lunde. On ne s'en
pas s'en faire dans le commencement de
la lunde dernière, il faut qu'on s'en fasse
qu'on s'en fasse que s'en fait l'opération, et
la lunde se fait la lunde, on s'en fait

généralment l'usage, on ne commençait que 10%
publiée, qui n'est pas aussi avertie à faire
à cause d'une plus grande quantité de
parties molles qui reviennent la trachée au
lieu que pour la larynx - on a pu dire
les ligaments et la tige cellulaire, la partie
supérieure dans certains cas, au lieu qu'il y a
seulement en pour la trachée et la tige, mais
qu'il y a une petite partie de la tige, de
l'ostéochondrium, ce qui fait remarquer
cela que la trachée est plus présente
placée que la larynx est que par plus au
point de vue une petite artère qui est la
trachéodermis inférieure, de laquelle il peut
résulter une hémorragie, au lieu qu'il y a pas
est immédiatement pour la larynx, qui peut
suffoquer le malade si la larynx est
dans la trachée. Il peut se faire encore
que l'instrument qu'il y a de côté et d'autre blessa
l'artère carotide, accident qui peut résulter
la maladresse du chirurgien, qui cependant
en lieu de malade qu'il y a de ses canalicules
fait son lieu, que ce dernier fait dans
l'attention de la larynx, par lequel il y a
il le voya, qui avertit fait entrer et qu'on
pratique son lieu, ce qui fait qu'il y a
peut être d'aspersion et d'hémorragie en
un même temps, tandis que pour la
larynx et la tige on a peut-être fait tout
sans cela - mais qu'il y a que la larynx
la larynx et une grande variété de

108 *Division.* En examinant maintenant les suites
on voit que la laryngotomie survient ainsi
que la trachéotomie, puis qu'elle peut dans ces
cas y suppléer.

manière
de pratiquer
la laryngotomie La laryngotomie peut être faite d'une
manière différente. 1^o On peut la faire
en un seul temps, en divisant toutes les parties
qui ont à diviser au moyen d'un trispart
l'on plonge dans l'espace cricothyroïdien. 2^o On
fait trois temps en commençant à diviser d'abord
les ligaments du haut en bas, en les distinguant
de suite des parties qu'ils recouvrent un peu
puis on passe en plongeant le bistouri dans
l'espace cricothyroïdien horizontalement, on fait
glisser pour l'angle du doigt indicateur qui
a placé sur l'extrémité inférieure du cartilage
thyroïde dans l'intérieur. 3^o Quant à l'artère
thyroïdienne supérieure, on préfère cette dernière
à l'inférieure parce qu'elle est plus facile à
blesser. Cette dernière, puis on fait qu'un chirurgien
ne point toujours un trispart, au lieu qu'il
a pour le bistouri et qu'un doit toujours aller
à la simplicité des choses. Il faut savoir
qu'il y a deux parties importantes à faire
dans le larynx pour rendre le passage à l'air
qui se trouve maintenant au moyen d'un pilon
Ruban que l'on attache autour du cou, que
l'on a soin de couvrir avec un petit morceau
de gaze, afin qu'il n'y entre point de corps
étrangers, qui pourraient se reproduire
dans l'atmosphère.

Lorsqu'on veut la pratiquer avec un 1098
Bistouri, il faut avoir soin de fixer le
ligament de la main avec le pouce de la
main gauche et le doigt du milieu qui
tient le tige qui lui tient le doigt indigne
après qu'on a divisé les parties dans
l'ordre indigne interne et qui on applique
le doigt indigne et on conduit le tige
également.

On peut faire l'opération de la largue de la main de
sans douleur pour donner passage à l'air,
mais encore pour des corps étrangers qui
pourraient aller dans le large,
qui peuvent être à son embouchure, faibles
et faibles on lui donne tout son tige
ainsi qu'on rapporte l'exemple de l'acte
Gilbert qui ayant perdu la tête, on alla
la clore de son tige pour empêcher
qu'on ne la trouve qu'on ne lui retire
pas malgré qu'il dit qu'il avait la
clore dans le sang, parce qu'on le voyait
sortir et qu'il se voyait en tige. Si l'on
était sûr qu'il y avait des corps de tige
dans le large, il y aurait point d'opération
à faire les tige sans pratiquer l'opération
et on ne le pourrait pas sans cela, on y
viendrait en faisant comme il est indigne
puis en divisant le tige de la tige
on enleverait une tige de la tige qu'on
y introduirait, que l'on dirait dans la
telle qui continuait, on en les tige

plus bas. En supposant qu'on ne parvienne
 au qu'on croit ne parvienne pas. Disons
 qu'il est dans l'état d'infirmité
 qu'il est la dissection des parties molles en
 fait, on suppose qu'il est dans la
 cavité de la grande cavité ou l'air
 de la région en question. Etant donné on en
 l'écarterait les deux morceaux au moyen des
 branches d'une petite pince qui agit qu'il est
 dans la cavité de la grande de suite et l'un
 extraîrait de suite le corps étranger.

Si le corps étranger se trouve dans la
 partie inférieure du larynx, il faudrait
 faire la dissection du Cartilage aryéno-épiglottique
 en ayant dirigé les ligaments et les muscles
 puis il n'y a pas d'autre route à suivre que celle
 indiquée.

Lorsque les corps étrangers se trouvent dans
 la trachée, il faut en venir à la trachéotomie.
 On la fait en commençant par dissection les
 ligaments, de suite les muscles, puis ensuite
 seulement les os qui sont entre les
 cartilages. Si ce n'est que pour dissection
 passage à l'air. Tandis qu'on dissection les
 cartilages s'il s'agit d'enlever une tumeur
 à un corps étranger, si on veut
 la partie du larynx dans une cavité
 de suite introduite entre des cartilages.

Des Altérations de l'organe 11

De la Voix.

Il faut pour cela distinguer celle appartenant à la parole proprement dite et à la Sorelle.

Celles de la Voix proprement dites peuvent dépendre du Larynx, ou de la Voix elle-même, par les diverses altérations qu'elle peut éprouver en passant par la trachée et les cavités nasales. Celles du Larynx sont les plus ordinaires et les plus communes, qui sont liées à une affection de la membrane muqueuse de cet organe qui la tapisse, car dans la venue d'un enfant de l'origine d'infirmité et des adultes, par lui il peut se faire qu'une telle affection donne naissance à une augmentation de sensibilité, ce qui fait qu'il lui paraît trop de leur insensibilité au point de leur Larynx. M^{re} Fortat dit avoir donné des soins à une jeune Demoiselle qui perdait plus d'un octave dans le moment où elle chuchotait, pour la quelle au premier abord il crut qu'elle dépendait de la perte de l'usage, mais qui par des saignées répétées il apprenait que cela ne dépendait que d'un état particulier du Larynx, lequel paraissait être dans l'état d'excitation dans le moment où la personne parlait. Elle était également un autre fois dans l'état d'excitation à une affection des muscles du Larynx, la personne au premier lieu avait l'habitude de parler dans le murmure et au moment où elle le voulait mais une fois qu'elle était entrée elle parlait plus qu'elle ne voulait et s'efforçait par l'action involontaire des muscles.

On doit encore distinguer d'autant cela la
 partie de la parole dépendant du défaut de
 l'organe de l'oreille comme nous
 en avons un exemple dans les sourds et muets
 de naissance qui ne parlent pas par la parole
 mais par signes, ce qui fait qu'ils disent que
 la parole brute, c'est à dire celle que l'homme
 apporte en venant au monde et non celle
 qui s'acquiert par l'usage de la langue
 qui prouve bien ce qui vient d'être avancé
 c'est que nous avons des sourds et muets
 apprenant à parler par le moyen d'instituteurs
 qui leur font donner d'une manière quelconque
 les premiers concepts par l'organe de la
 vue, comme on nous voit le prouver dans
 ces quelques-uns M^{rs} Sicaud, Darnaud
 Lais; mais on en a un exemple pour l'écriture, c'est
 que souvent nous voyons des personnes qui
 n'ont point parlé qui cependant parlent
 ce qui ne tient qu'à ce qu'elles ont perçu la parole
 d'intérieur qui depuis qu'elles savent parler. On
 doit encore distinguer parmi les premiers cas
 ne donnant aucunement des signes de l'usage
 ce qui ne tient qu'à un état particulier de
 l'organe qui n'est point encore connu, ou
 qui n'a jamais encore rien distingué, et
 ce qui constitue alors ce qu'on appelle la parole
 la parole totale de la parole, ce qui est rare de
 cette nature, ce qui est infiniment rare de
 rencontrer, qui peut être corrigé.
 Il est cependant des affections qui peuvent
 arriver et dépendre de la parole de l'oreille

des muscles de la langue par la paralyse 113
seguir peut tenir à différentes causes & la cause
l'un d'une manière accidentelle, nous parler
de celle qui peut arriver l'un par la paralyse
de ses mêmes muscles comme suite de l'apoplexie,
ou la même manière que cela arrive pour
la paralyse du muscle de la lèvre.
Sapozitum &c.

Les dérangements des sons sont extrêmement rares & l'on pourroit dire que cela ~~peut être~~ ^{est} l'histoire
pour les porteurs qui ont appris à chanter tandis
que pour les autres au contraire, il ne peut arriver
rien par cela même qu'ils ne les aient perdus.

Les vices de la parole sont extrêmement communs
qui peut tenir à différentes causes. D'abord il
peut se faire que cela tienne à la langue du
pays, au lieu au si que nos parents nous
ont appris à parler mal, par le défaut
d'éducation, qui se dissipe en étudiant la
langue ou par le changement de pays. Il
y a encore qui parlent très difficilement
au qui ne le peuvent point par cela même
qu'ils n'en comprennent pas les causes que au lieu
chez certains enfants, qui ne parlent qu'à
tard, qui dans des circonstances au ne peut
rien, tandis que dans d'autres cela parait tenir
à la langue du fœtus de la langue, au lieu
un peu au qu'il n'en peut point par cela même
qu'ils n'en comprennent point. D'autres certaines voyelles
au lieu que au lieu de prononcer certaines
lettres au prononcent d'autres, c'est-à-dire. M pour

244^e Le pauvre le 9, qui est tout au fait
d'Education et de dissipation par suite. Il y a
le Vandalisme, qui est dans le transport
du C. pour d'autres lettres. Enfin les fous de
la parole, sont tellement multipliés qu'on ne
peut les compter, en ce qu'il y en a presque
partout que de pays et qui secourent par les
qu'on fait pour les démentes, d'une ou
d'autre d'autres pays.

Il est à remarquer que nous avons qd.
des personnes qui ne peuvent parler que
par les lèvres, n'entendent point, qui se imagi-
nent les sons et musiques de naissance, chez
lesquels on n'a vu qui ont été établis au
plutôt qui ont commencé à parler aussitôt
que par des circonstances ils sont parvenus
à entendre, et au même temps
un jeune homme de Chartre qui fut frappe
jusqu'à l'âge de dix ans, chez qui l'ouïe
se rétablit, lequel commença un peu à enten-
dre des cloches, ce qui le surprit, qu'il alla
demander aux autres, parvint par une grande
habitude et en acquiesçant de autres de la
manière dont ils faisaient à parler lequel
raconta, que ce fut qu'il se fit la sortie d'un
homme du conduit dedit qu'il parvint à
entendre. Cette façon de parler est
l'exemple d'un jeune homme, à qui il donna
des sons qui ne pouvaient pas également parler,
ce qui ne tenait chez elle nullement à la
sage dedit ou à la paralysie des attaches de
l'organe, mais à son développement, de manière

que la personne ne parvient bien la jeunesse, 72
qui ne étant bien apprenue par des exercices
attentifs, il parvient à lui donner la parole
au moyen d'un autre poste nouvelle, qui en
détourne les mouvements.

Cela peut tenir encore à un état
particulier du Cerveau, des nerfs ou des
muscles, soit dans l'apoplexie, la paralysie
du grand hypoglossique des nerfs du larynx,
qui est habituel d'une manière accidentelle
et disparait toute suite d'autres dures.
On le remarque également chez ceux qui ont
eu de la toux, qu'il y en ait néanmoins
qui n'en ayant pas sont parvenus par l'habitude
à parler, soit au lieu de qu'il y en ait un exemple
chez ceux qui naissent sans ce nerf, ou
bien à un état particulier qu'ils ont
eufin à la parole.

Affections Des Organes

Locomotrice.

Ils sont divisés en deux espèces, il y a les
qui sont d'abord dans les parties qui sont en contact
avec les organes parisi, puis d'autre les affectent au
cœur qui sont en contact avec les autres parties
Muscles, et ces autres d'abord commencent par
les derniers.

10. Affections Des Muscles.

On les trouve ordinairement dans les affections
descriptives les parties nécessaires à la parole
qui sont les aponeuroses et les tendons, mais
qui ne le doivent point être par eux seuls
cause de leur affection ou maladie, c'est

116 puis qui nous en traiterons séparément.
Savoir l'état des Muscles ou l'un ou l'autre
chacun n'est point exposé à être affecté
de Maladie originelle, ou égale appelée
Vice de conformation; mais ils en sont plutôt
de même des organes, en très grand nombre
les affectant, qui sont égales appelées le
Rhumatisme, les Syphilis, les Dépôts, les Paraly-
ties, les Convulsions. Les uns nous occupent surtout

Maladies
organiques qui paraissent avoir lieu les uns et les autres,
par une affection du Cerveau, des nerfs
et des Muscles, d'une manière qui peut être
paralytique ou convulsive, cérébrale, nerveuse
et musculaire. Nous avons parlé d'une
dépense traitant de ces de tumeur cellulaire,
en cela comme l'ai fait si prolonger.

1.° De la Paralytie des Muscles.

Mais allons d'abord l'examiner d'une manière
générale, puis ensuite nous le ferons pour
chacun des muscles ou au au occasion de
la remarquer.

La paralytie quel qu'elle soit la cause qui y
donne lieu peut affecter un ou plusieurs
muscles à la fois, qui tantôt dépendent l'un
de l'autre, peut être du ressort de la
"Médecine" ou de la chirurgie, mais qu'on ne
studie nous en confondons, en ce qui suffit.
les uns nous occupent d'une manière générale.

Paralytie
Cérébrale On voit de la Paralytie dépendre du Cerveau
dans trois circonstances différentes: 1.° Elle peut
avoir lieu comme prélude d'une Affection;

20. D'après de son Maladie Devenue 197
à l'affection d'un organe d'origine agissant
indirectement.

La première remarque chez ceux qui sont
disposés à être affectés d'apoplexie, est
ainsi qu'en remarque M. la paralysie de
la langue chez certains personnes. Cette
aussi, chez plusieurs elle se remarque, surtout
la présence par l'emploi de différents
stimulants, est ainsi que je vois une femme
dans ces moments chez qui j'ai observé
plusieurs attaques de cette Maladie par suite
d'usage, est ainsi qu'en peut apprécier les
Nécessités, les États, les Mœurs.

La deuxième lorsqu'elle est l'effet
d'apoplexie, qui quand elle a lieu un flux
général ou local que la paralysie de la moitié
du Corps, se qui est l'effet d'un flux, dans
quelque partie trop étendue, tandis
que d'autres ont les muscles tant des membres
supérieurs, qu'inférieurs se trouvent paralysés.
En faisant observer toutes fois que dans
certains qui ont rapport à la respiration
de même que ceux, de la Dommée ne l'ont
point. Cette espèce de Paralysie tant
fois qu'elle est l'effet d'un flux de sang
de toutes parties, sur la tête et d'ailleurs
de la Médullaire, tandis que l'autre a
lieu la cause est, arrivés qui n'ont que par
la trachée, la cause qui cause le Céphalique
de la même manière que la paralysie arrive
par une continuation de la Maladie l'épine,
ce qui donne lieu à la paralysie des membres.

La troisième fig. dans les affections de la
durée lorsque elle est redoublée, même après
de l'écoulement par une affection particulière,
au moyen de l'écoulement, se fait par
la compression du tronc comprimé, de la
même manière que cela. Il n'y a pas de
développement de tumeurs sanguineuses de la
durée; au lieu même par les os, dans
le cas de fractures.

Paralyse
nerveuse

On confond la paralysie dépendante de
l'action nerveuse avec celle de la moelle, avec
que celle-ci vient d'une origine différente
pouvant être comprimée telle qu'il arrive
dans celles du col seulement et non dans
les autres, malgré que l'on fait remarquer
qu'il n'y a pas d'écoulement de la moelle
de même qu'à l'écoulement de la moelle
de la moelle la moelle est comprimée
des écoulements par le col de la moelle
et dans les autres écoulements, dans les autres
ce que nous venons de dire pour la moelle
peut s'appliquer à eux, à qui nous pourrions
ajouter une section par des instruments
tranchants portés par eux, qui peuvent
écouler leur fonction au moyen de leur
réunion par une position convenable, qu'on
ne peut guère dire que nous l'écoulerions
ailleurs. Enfin il peut se faire que cela
tienne d'une affection organique, qui se
trouve dans, dans les autres qu'elle dépend
de cette de cette affection, dans le tronc
de l'écoulement, un engorgement, une section
particulière d'une partie de la partie au il dépend.

Les muscles qui constituent naturellement 119
 sont le contraire que par l'influence du Paralyse
 Cerveau, qui leur ôte par le moyen des Musculaire
 nerfs, à moins que des corps irritants portés
 sur eux ne les irritent, à l'action desquels
 comme l'on sait ils se contractent, peuvent
 être affectés de Paralyse, par un état d'acromie
 organique, ce qui constitue la Paralyse & l'atrophie
 Musculaire. D'après l'idée que nous nous avons
 attachée, elle peut être seulement dans un
 muscle, ce qui est facile à reconnaître,
 par conséquent à guérir, de muscles qui ne
 reçoivent qu'un nerf et qui par conséquent
 peut être paralysé, si ce ne sont ceux du
Cordeau l'oblique externe, le grand-
 oblique, l'arrrière encore quelle peut
 être causée par la compression de certains
 affections affectives, cutanées, cancéreuses
 par une impression très forte. On trouve
 peu l'organe cutané, l.

Les organes cutanés, etc.
 Augmentoit encore dans certains cas, d'où pro-
 cédait à l'action plus grande des aboules
 antagonistes dans un sens que dans un autre,
 c'est ainsi fig. que nous voyons certaines
 personnes avoir les membres fortement fléchis
 au point de ne pouvoir plus les étendre un
 seullement cela dans ce cas à la force plus
 grande des fléchisseurs sur les extenseurs,
 mais encore parce que ceux-ci ont perdu leur
 force par la raison même qu'ils agissent
 plus, de telle manière qu'ils ne peuvent plus
 entrer en action à cause de leur défaut
 d'énergie. Exemple de la femme que j'ai vue à la
 La Pétrière, la chose est telle que si l'on agit

2 De longtemps quelle existe qu'on ne peut enlever
la force très grande qu'on emploie pour la
délivrer les flambes aux maladies fig. si souvent
qui sont flétries. La chose est dépendant
comme d'habitude la prétendue de la contenance
de l'âme mais des forces vitales, qui
restent telles jusqu'à des fautes particulières
à redonner aux ossements leur état d'existence
On a encore pour exemple de paralysie
celle de la langue supérieure de la cavité
de la bouche, et des muscles laryngiens.

La paralysie peut être simplement moment
ou bien durable. Elle ne porte pas seulement
sur les appareils de fonctions de la vie animale
mais encore sur celle de la vie organique
d'où en résulte le trouble des fonctions au lieu
à lieu, c'est ainsi fig. que nous voyons
pour la digestion, dans la paralysie du pharynx
l'incapacité des matières solides pour aller
à l'estomac; la rétention des urines pour celle
de la vessie.

Enfin 10. Quant au traitement dépendant de la paralysie
de l'affection du cerveau, elle est entièrement
du ressort de la médecine, toutes les fois
qu'elle sera produite par l'apoplexie &c. Pour
celle fig. qui tient au développement d'un
système de la dure-mère, d'un fragment elle
est de celle de la Chirurgie. 20. Quant à elle
des nerfs, on dit si elle tient à une division
lacteale que les deux bouts se réunissent et se
à une contraction en un l. ou l'acte de la
réunion par des excitation, par les thérapeutiques.

489y remède qui ne par l'usage distants
avec l'air suffoquant les articulations de la
a lui dit qu'il fallait résigner le travail
de la pauvreté qui a été fait, mais n'ont
pu être évités de fois, parce qu'il faut la
résolution de grandes circonstances pour la
résolution de la pauvreté en d'hor, ce qui
fait que la conjonction qui la reconstruit
traverse sa partie au contact de l'air. Au lieu
la pratique que nous avons d'introduire pour
éviter le contact des fils entre la
conjonction.

7.° Tandis qu'on comprime le corps charnu
de la langue, il arrive qu'il y a quelque chose
obscure et bruyant par la langue, ou en résulte
la difficulté de parler. Il y a peut-être d'autres
moyens pour la guérir que les autres.

8.° Quelquefois des muscles de la face
se trouvent qu'il y a atteints, ce qui laisse que
que comme une prière d'inspiration.

9.° Quand elle arrive à l'extrémité de la langue
il en résulte une apoplexie de la parole. Il y a
peu la guérir. D'autres moyens à employer
que nous pourrions traiter en général.

10.° Les muscles sternomastéens peuvent
être aussi affectés. De telle manière que
quand ils s'élèvent, il en résulte la tortue,
l'obésité, en même temps que la face est
tourmée du côté opposé à l'affection.

11.° Dans la paralysie des muscles de la
ou des parties du corps, il y a peut-être d'autres
qui puisse être occupés dans ce moment,

en ce que nous en avons parlé ailleurs, voir 173
fig. et le Dictionnaire est restant de la lecture
de l'ouvrage.

2. Des Convulsions ou mouvements
convulsifs.

Le mot convulsion est employé pour ^{Le mot du} l'entorse
d'un ou plusieurs mouvements involontaires de la
part des muscles de la vie animale, et de
tous ceux qui sont sous l'influence du Cerveau,
la quel peut être soit volontaire ou involontaire.

Il y a deux sortes de convulsions qui dépendent du
Cerveau. L'une est à ses mouvements sans ^{Les convulsions} convulsions
le trouble de ses fonctions et l'autre est à ses ^{Les convulsions} convulsions
presque toutes sont le résultat d'un ^{Les convulsions} convulsions
ou d'une autre, d'une ou d'une autre. Les convulsions
qui ont lieu et le résultat d'une ou d'une autre
qui le piquent. Ces sortes de convulsions
peuvent être continues ou bien dures ou
certain temps, ou passagères. Elles peuvent être
dépendant du Cerveau ou bien être
symptomatique ou sympathique.

Elle peut être continue, mais ce n'est
qu'une ou deux remarques chez les enfants
de suite et de symptôme et d'une ou d'une
Vie dans la figure d'un ou d'une à la suite
d'une plaie, et d'une ou d'une 177. Dans
elle par une ou d'une par la compresse de
petit doigt, et d'une ou d'une par
de symptôme. Tant du côté d'une ou d'une
bien à acquies appelle tétanos.
Au point encore jusqu'à un certain
point regardant les mouvements convulsifs.

124 Ventum en qui ont lieu chez le hydrophobe
qui tiennent au trouble des fonctions cérébrales
p. 2 admet par là l'existence d'un animal suraj
ce qui est facile de reconnaître au les personnes
qui en sont affectées, font toujours des
mouvements involontaires.

Il est bien de faire remarquer qu'il y a
des mouvements convulsifs qui peuvent se
développer d'une manière spontanée chez l'homme
et d'un hydrophobe. Sans que l'on verra
un animal les ait mordus. Mais je ne puis
pas que cela puisse servir à l'expliquer
sans même cause, soit la cause malade
qui se trouve et finit en étant à chaque
un exemple. On a remarqué que chez les
qui arrivent, etc. en ordre, généralement d'abord
au bout de bien des années qui quand
cela arrive la plaie se resserme et les personnes
éprouvent des mouvements convulsifs qui
partent et divergent et vont se rendre
dans toutes les autres parties de proches
proches.

Les mouvements hystériques peuvent
encore en être toute autre. On considère
au tout de qui peut dépendre de l'absence
sympathique ou sympathique.
Causation. Les convulsions dépendantes des
119 120 causes peuvent être de trois espèces, tantôt
liées à une affection organique, tantôt
attribuée à une fonction. La première
à la suite de la plaie, ou bien lorsqu'il
n'est été irrité, est ainsi qu'on peut
voir elles qui arrivent par la lésion
d'une saignée du bras par la lésion de

neuf un seul et tant, du saphen pro- 123
cipu peut arriver dans les saigns de
fied. La 2^e peut comprimer les artères
dans leurs orifices par les bords de la 3^e peut
tenir à un trouble de leur fonction d'où
résulte quelb'effets qui se distribuent dans
un muscle agit point avec régularité
dans ses mouvements, ce qui se voit lg. dans
la Duse de St. Gist, où le p'sonne s'est
cru instant.

On peut considérer comme convulsions Causation
chirurgicale celles qui partent d'un seul membre
et muscle, ou bien d'un très petit nombre
auquel peut paraitre encore une arme de
dureté d'où en résulte une affection
essentielle, qui peut être continue ou bien
instantanée.

Il faut pour traiter les convulsions l'étiologie
diminuer à leurs causes, ainsi il y a celle
du cerveau, des nerfs et des muscles,
ou bien elles peuvent encore dépendre d'une
plaie de la matrice d'un animal.

Il y a comme pour les Paralysies des convulsions
spasmodiques qui peuvent être double affectées des muscles
convulsives qui sont.

1^{re} le tonus. Sur lequel on agit
dans toutes les autres.

2^{de} C'est la tigue, dans lequel on agit
indiqué en exemple de cela. Par la
legue saignat une femme qui avait des
difficultés à parer qui une fois qu'elle
était entrée parait op. Cette convulsion
peut avoir lieu en plusieurs temps que

186 que la paralyse des autres muscles qui
quand elle a lieu particulièrement il s'agit
de la reconnaître pour les diriger avec de la
force qui devient rare.

3.° Il en est de même pour les pharynx qui ne
peut pas se contracter qu'il s'agit
que les personnes atteintes des aliments, ce
qui fait qu'on est obligé de les nourrir
avec une tige de gomme élastique.

4.° Les sterno-mastoidiens peuvent être
aussi affectés de convulsions, qui ont pour
causes les mêmes que celles que nous venons
indiquer en traitant de celle en général.
Lorsqu'il en est ainsi, on a qu'on sent de l'affection de la tête
et de la gorge, et dans l'oppression de la tête
de la tête, que dans la paralyse, la contraction
du muscle se fait. Si on veut la distinguer, elle
commence par la tête, et dans la paralyse
de la tête, elle se distingue de la paralyse
dans la paralyse, jamais on n'observe
la difficulté de la tête, et dans la paralyse
naturelle, tandis que le contraire se voit
dans les convulsions, ce qui tient dans la
paralyse le muscle est en un état de
convulsion, tandis que dans l'autre, au contraire
il est fortement contracté.

Les moyens pour y remédier sont les
mêmes que pour les autres parties.
On a proposé en outre d'appliquer la section
de la tête, comme à la paralyse
naturelle, mais qui ne peut être faite
d'après les réflexions qu'on en a faites.

En effet. le fait est dans le cas du Paralyse
mieux ce qui est la Section du muscle.
Lain étant faite. le tete reprendra bien à
sa position naturelle mais cela restera
telle toujours ainsi? non puisque les
muscles sont susceptibles de ramener et que
de suite en supposant qu'elle ne se fût
pas, elle ne serait pas une cause pour
qu'elle l'acquiesce, car le muscle paralyse
venant à reprendre son activité alors la
tete sera portée dans inverse de laquelle
était, qu'on ne pourrait pas dans ce cas
cas qu'on ne pourrait pas dans ce cas
le fait est de suite. Depuis longtemps on a
de se servir. La fait est de suite. On a
conservé la tête. On a fait de suite. On a
guéri si l'on fait la division du muscle.
affecté, parce qu'alors il ne portera plus
la tête de suite, mais elle sera portée
de suite de suite. On a fait de suite. On a
l'action du fait, parce qu'alors il ne
contraher la tête. On a fait de suite. On a
sur la tête. On a fait de suite. On a
ne peut pas faire que l'on ne peut pas
que le muscle. On a fait de suite. On a
restant de suite. On a fait de suite. On a
on ne peut pas faire que l'on ne peut pas

En effet. le fait est dans le cas du Paralyse
mieux ce qui est la Section du muscle.
Lain étant faite. le tete reprendra bien à
sa position naturelle mais cela restera
telle toujours ainsi? non puisque les
muscles sont susceptibles de ramener et que
de suite en supposant qu'elle ne se fût
pas, elle ne serait pas une cause pour
qu'elle l'acquiesce, car le muscle paralyse
venant à reprendre son activité alors la
tete sera portée dans inverse de laquelle
était, qu'on ne pourrait pas dans ce cas
cas qu'on ne pourrait pas dans ce cas
le fait est de suite. Depuis longtemps on a
de se servir. La fait est de suite. On a
conservé la tête. On a fait de suite. On a
guéri si l'on fait la division du muscle.
affecté, parce qu'alors il ne portera plus
la tête de suite, mais elle sera portée
de suite de suite. On a fait de suite. On a
l'action du fait, parce qu'alors il ne
contraher la tête. On a fait de suite. On a
sur la tête. On a fait de suite. On a
ne peut pas faire que l'on ne peut pas
que le muscle. On a fait de suite. On a
restant de suite. On a fait de suite. On a
on ne peut pas faire que l'on ne peut pas

1. Contraction des muscles flexisseurs qui se
en contraction, les quels agissent d'une
manière plus forte que les extenseurs; ils
peuvent être étirés plus qu'on ne peut
plus pourvoir le raccourcir. Dans l'état
à l'origine de puissance très forte, c'est pour-
cela qu'on emploie des Machines extenseurs
à cette fin.

Affection des parties accessoires
aux muscles.

Ils se composent comme la Sui des
tendons, des Aponeuroses et des Gai-
nes synoviales.

Affection 1. Les tendons et les aponeuroses sont très
des tendons peu exposés à être affectés de maladie
et des aponeuroses, ils peuvent être étirés et
provoquer un instrument tranchant, ou par les

dit en passant des plaies suaves, mais
ne s'effondrent pas. Lesquels sont divisés
et s'effondrent et sont susceptibles d'inflammation
les autres tissus. Etant exposés au contact
de l'air, ils sont susceptibles de se nécroser

De leur et sont les seules maladies aux quels
exposition ils sont exposés, de manière qu'ils s'effondrent
prolongés dans une profondeur plusieurs fois
grande.

Affection 2. Les Gai-
nes synoviales qui recouvrent les
enveloppent les extrémités des tendons
synoviales sont considérées d'abord d'une manière diffé-
rentielle celles qui accompagnent
les tendons de réflexion et de la Sui
gaine de l'abdomen de l'œil, dans
l'orbite, et plus du bras pour le tendon

du bras à la cuisse pour celui du 129
grand fémur en passant sur le grand
trochantère, pour les tendons qui se
réfléchissent sur l'os de la jambe pour aller
se rendre au pied etc. Et si par conséquent elles
qui accompagnent les os de la jambe
qui vont se rendre à la cheville, ou au
doigt du pied: pour celles là au surplus
non seulement pour l'os de l'avant bras,
mais encore ils en ont encore au devant
de chaque doigt.

Dans quelques endroits où se trouvent les
membranes elles sont plus exposées à être
affectées de maladies différentes les uns
des autres, nous nous sommes permis par les
études de celle de la dernière espèce par
les autres il est trop profondément placé
on ne peut reconnaître l'os affecté
parce qu'il regarde les derniers nous
nous bornons seulement à celle des
tendons flexisseurs des doigts, qu'il
traverse au devant de l'avant bras qu'il sera
applicable à toutes les autres.

D'abord elle peut être susceptible d'inflammation
comme cela peut arriver dans la disposition
des tendons par des instruments tranchants
ce qui fait qu'elle contracte des adhérences
elle ne s'enlève alors ne permet plus
lorsque cela arrive que les flexions des
doigts aient lieu aussi bien en ce que
les tendons des muscles flexisseurs se
trouvent fixés avec les parties musculaires
ou enorgane d'elle.

130
Hydropisie
du Ganglion

Il se peut ensuite élever le siège d'une hydropisie
qui est connue à cause de son volume
qui est peut considérable Ganglion, qui
consiste dans de petites tumeurs, qui sont
à l'entrée de petit squelette, des hydatides
qui se développent là, qui peuvent être comme
dans les autres parties réunies en grappe
ou bien unies, ou bien encore être une
distension d'une cellule du tissu cellulaire
on la reconnaît par la petite prouesse
qu'elle forme dans est exprimé, qui ne
peut être accompagnée de douleurs, qui se
distingue par elle-même.

Lorsqu'on veut en débarrasser les malades, il
ne s'agit que d'y faire une petite ponction
pour en évacuer le fluide qu'elle contient.
S'il Ganglion avait été une portion
de celle qui servent les instruments ou
pourrait seulement exercer sur lui une
compression pour en déterminer la rupture
ce qui de cette manière donnerait lieu à
une suppuration dans le tissu cellulaire
il ne ferait sans abstraction.

L'affection de ces membranes synoviales est
extrêmement rare, après est-ce pour cela que
les maladies ne sont pas encore bien connues
par les pathologistes; Cependant j'ai eu
occasion une fois de voir celle qui
entour, les os de la main et de la main
des doigts sur une jeune damoiselle qui
avait son siège sur un anneau d'acier
annulaire de fer, qui en appliquant

le doigt au-dessus et au-dessous d'un certain
sentiment de fluctuation, mais la qu'il faut
pratiquer une petite ouverture qui conduit
du fluide sans le laisser continuellement s'échapper.
Les premiers 99e temps, qui au moment
où l'on croit que la petite ouverture
aboutit le fermer, la maladie aiguë
dans la petite ouverture sans l'écoulement de son
chirurgien un petit corps dilatable, qui en
laissant la grande et de donner par la même
au fluide il en résulte une très-faible
dans toute la partie, qui cependant aient
de 99e temps de dissiper.

Il y a encore une autre affection des
glandes synoviales qui arrive souvent des
doigts à la quelle on a donné le nom de
sarcaris, qui se fait tout à coup plus par
effets qu'on ne la dirait au premier
abord, qui tient sans doute à la distribution
des filets nerveux, comme on le dit dans
cette partie, à la pression des tendons, à la
pression de la gaine synoviale et à la densité
de la synoviale.

De tous les temps on n'en a fait de trois
espèces et on a fait aussi une que l'on a
division qu'on a faite. Les cas qui sont 10
de la force qu'on peut en faire 10
20 de la force cellulaire ou phlegmonneuse.
Des gaires synoviales.

1.° De la
2.° L'écoulement de la force
3.° peut simplement qu'affection qu'une partie, qu'une.

manière que cela se fait même pour les
dépôts des ossements qui ont leur siège dans
la tige cellulaire sans entasse, qui se trouve
immédiatement sans les apophyses qui les
enveloppent. Ce qui prouve que cette action
qui a cette cause, est que nous voyons des
personnes qui souffrent le plus que
d'autres, comme nous le voyons N. chez les
supérieurs qui ont la peau très dure.
C. H. admet que spontanément, il se forme
l'effluve la suite de piqure qui a cette cause
au bout du doigt, se font des aiguilles
chez les cutanées, par des apophyses.
C. Au le reconnaît par un sentiment de
doulueur au bout du doigt, à une espèce
de sentiment, que les cutanées y ressentent. **Signes**
qui par cette douleur lient à un sentiment
d'irritation que lui ressent au q appliqué
les extrémités des doigts aux douleurs qui
s'étendent tout le long du bras et
du bras qui se trouvent qq. q. q. q.
traverse puis qq. q. q. à un sentiment
faible qui n'est que l'effet.

C. Parvenant il se termine par résolution
la suppuration est presque toujours la résolution
qui commence d'abord à se faire sentir. **Contenir**
dans la lèvre piquée puis de l'écoulement
parties intérieures, qui quand elle est
considérable la chute de l'écoulement
puisque toujours les tristes, souvent qu'elle
est l'un de petite quantité et qu'elle n'est
pas presque d'abord des douleurs sont
qq. si fortes que les personnes qui
ont replaqué qq. le socle de l'os,

13^e Méthode l'emploi des corps gras et des
 instruments, sans qu'on s'occupe d'ouvrir
 qu'on ne doit se servir de faire qu'un
 an y soit de la structure, du point de
 la jauge à propos de donner une portion
 légèrement saluante au moment. Au cas
 de faire de deux manières, au avec les
 instruments tranchants et avec les
 caustiques, ces derniers ne sont guère employés
 attendu que par les premiers on parvient
 à l'ulcère plus promptement les scabieuses, &
 d'ailleurs on est obligé d'aller à faire plus
 incisions: au pressant acheuvement les
 caustiques ne guérissent point qu'ils produisent
 une sorte de substance et que par là
 deviennent mieux à l'évacuation, de plus
 avec plus de facilité et que l'opération
 ne se fasse point comme cela peut arri-
 ver par cette par instrument. Il faut au
 temps au cas d'incision qu'il faut produire
 une sorte de substance, mais ce mouvement
 est et est abondant, attendu qu'une
 simple incision suffit.

30. Des signes 30. Des signes avant d'être les signes sont
 synonimes avec les signes dans la queue des signes
 au des synonimes synonimes, cette distinction
 est d'une affaire, mais incompatible à cause
 que l'un est au cas de venir à l'autre que
 l'autre est à l'autre une incision, attendu
 qu'il y a point de signes qui sont les
 caractéristiques des causes qui y donne lieu
 sont sans doute les mêmes qu'on a vu
 précédents. Il est accompagné également
 de gonflement de l'avant bras et de bras

Causes

et q^{est} de aggraverment dans les artères. 185.
On a remarqué des cas où il faisait de ^{signes}
tels progrès qu'il en vaillait toute la peine
et même à y produire des dépôts qui
sont des fois très considérables, en même
temps qu'ils causent des douleurs très vives.

On y remédie également par des corps ^{Traitement}
gras par l'application démolleuse, puis
il se manifeste de la fluctuation au y.
D'après cela on y pratiquant une incision.
Il faut avoir soin lorsque la pratique
d'aller avec prudence jusqu'à l'induration
l'on met des caustiques pour vaincre l'induration
dans la gaine, qui si on y recourait on
l'œuvre d'ailleurs qu'elle se dessine et l'on donne
issue au fluide, une fois sorti on y applique
de la charpie, des compresses de, donne
dans les autres dépôts. Il arrive qu'après
qu'il est guéri qu'il y a l'induration de la
première et de la deuxième échelle
ensemble, un bien il y a une petite que
de guérir.

Il fut un temps où on admettait encore
un panaris entre l'hyperostose et l'os, qu'on
disait être de la quatrième espèce, mais
qui n'existe point, c'est à dire qu'à la
démise s'il est arrivé sans aux échelles,
ce n'est que comme suite au effet de
la troisième espèce.

es, qui forme d'abord un ganglione
plus ou moins considérable, et qui se résout
se dissipe au bout d'un temps certain,
ou la fait encore arriver à un point
où une suppuration constitutionnelle, sur-
laquelle nous nous étendrons pas davantage,
en ce qu'elle regarde spécialement le traitement
de la maladie. Plus tard, on dit tout
fois que ce n'est pas tout au tout, qu'on
en accablait le malade.

Maladie de l'organe Malade

Il se trouve comme l'ai dit dans deux
endroits différents, dans les cellules de
tissu spongieux des os, puis dans le milieu
des os longs, au lieu d'un canal médullaire la
vase capillaire parait être formée par une
capitulation de petits vaisseaux sanguins
entretiens au travers d'un canal. L'au-
tre est pas trop de qu'il est trop
formé, on sait seulement qu'il y a une
grande sensibilité, et on le voit chez les
os aux environs lorsqu'on les touche, on
en connaît pas mieux les usages, il y a
tant de présumes qu'on se représente
un os, de la même manière que les
parties du système, ne les maladies
de l'os et non de l'autre.

Quoique nous disions que l'os avait les mêmes
maladies de la Maladie du canal médullaire, de la Maladie
elles ne la sont cependant pas encore bien
ou sait seulement qu'il peut se former des

199. Dépôts - Des accumulations de fluide purulent
l'intérieur des canaux osseux des os long
par la suite de l'infection - De la muqueuse
est-ce du sciatique par un épanchement de sang
la suppuration de cette dernière en un fluide
huileux? On ne sait pas affirmativement
c'est car il pourrait se faire également que
fut la suppuration. C'est à l'opérateur et à l'observateur
l'on doit également se garder de se laisser
Ces sortes de dépôts ont encore été jusqu'à
présent remarqués dans l'intérieur du canal
osseux du tibia - aussi tant ce qu'on
peut dire pour lui peut s'appliquer à
d'autres.

Le Malin survient à la suite de contusions
causes extérieures faites sur la jambe de même
chez ceux qui ont la maladie vénérienne
constitutionnelle.

On les reconnaît aux sortes de symptômes
signes la douleur qui se fait sentir dans tout
du tibia, qui est tendue et très dure
quel se gonfle par la présence du pus
dans l'intérieur osseux que cela a lieu par
l'écoulement des canaux osseux la présence d'un
pus parvenu à un certain degré de
pour par lui s'écouler et laisse
écouler la quantité de fluide qui se
si l'écoulement de sang, qui se gonfle
le tissu cellulaire et donne lieu à une
transformation qui cause la présence d'un
pus purulent qui s'écoulera si l'opérateur
fait point l'ouverture, le quel rend une
plus grande quantité de fluide que

l'aurait prénommé au premier abord, qui
si on intraduit son esprit dans la statue
au pignone dans l'intérieur d'op.

La même chose se présente ici à
complir que dans l'opéra, est de faire une
impression sur l'âme au moyen d'une œuvre
de triomphe pour l'âme et l'esprit au fond,
de la même manière qu'un esprit pour
extraire une portion nièce s'il était
nécessaire.

Il est probable que toutes les autres affections ^{Le cas de}
de la même appartiennent toutes les fois qu'il y a ^{& l'œuvre}
est une chose, plus intérieure, à la fois
Il pourrait se faire également que la chose
qui affecte les esprits se trouve sequestre en eux
d'abord par elle. On ne lui peut trop
H. si la chose pourrait être semblable à une
de l'âme humaine.

Maladie de l'âme ou de l'esprit

Il y a qui portent sur un plus ou moins
grand nombre de fois, tandis qu'il y a
et d'autres avec une seule qui se portent
sur une seule. Les premières sont
proprement de l'âme de la chose même
tandis que les autres ne sont que
plus à la chirurgie, ou à la fois
en ce qui concerne l'âme et l'esprit
ramollissant l'esprit par l'usage de la
1^{re} de l'âme ramollissement.

Cette affection est prise en ce qui concerne
une maladie prise de l'âme, mais bien connue
de l'âme et l'esprit, est ainsi H. qu'on
la voit dans cette désignée dans le nom

1780 De la rachitisme, d'ostéomalacie, et Malastoreum
Causes laquelle n'est mal usagée par la rage
des ossements mais qu'elle n'est pas
plus. et malgré qu'elle porte sur tout le système
osseux, il n'est cependant point rare de trouver
Même que par une seule partie, comme dans
ce genre caractérisé par la maladie de Lat, de
Gibson, de colique épinier.

Signes Elle rend les os flexibles, ce qui fait qu'ils
se courbent et changent de forme. Ce qui prouve
qu'elle n'est qu'une affection de calcium, et
qu'on a vu qu'elle n'est point et ne peut pas
par la même raison plutôt par l'absence
tuberculeuse, le état qui n'est point
qu'une même cause. Elle appartient plutôt
à l'infancie, laquelle se développe tout
les premiers temps de la vie, et les cinq
ou six premiers mois, rarement elle se
manifeste plus tard, qu'elle n'est
peut être point à la rigueur, puis qu'elle
arrive qu'elle se fait infime l'apparition
en venant au monde de sorte qu'on voit
qu'il est sorti du sein de la mère qu'il
pour la reconnaître; Il peut se faire aussi
petite malade par les personnes qui
sont petites et parvenues à un grand
âge, et rarement la flexibilité de l'os
peut se reconnaître et qui cependant
se voit, qu'on a vu de l'infancie qu'elle
est une affection difficile à guérir
les ossements.

On voit que par le point du corps
que les ossements épinier d'abord se courbent

De suite le Bassin, puis après les membres
inférieurs et une grande ceinture usignée
de formes théoriques faites et imaginées pour
enlever le mal de la tumeur interne. Traitement

En outre du traitement général intérieur & traitement
qu'on doit administrer pour combattre
ce ramollissement qui appartient à la
colérase on doit avoir soin de mettre
les Malades dans une position horizontale
(les cofruts) en leur faisant garder le repos
afin qu'ils ne prennent point de mauvaise
inclinaison.

2. De l'uno fratello.

20. De l'usage
Ille consiste dans la grande tendance
qu'on lui a à se fractionner, à rompre en
un moindre chiffre, outre, au innombrable
que font les personnes qui entrent attaquées,
qui arrivent également chez les vieillards,
qui ne tiennent qu'à la grande quantité de
phosphate calcique qu'ils ont, qui s'en
les semaines des autres qu'ils ont, qui s'en
soient qu'ils s'en sont bien souffrants,
à pousser d'autre que les substances
nitratées lorsqu'ils sont dans l'état
général d'usage sans l'expression de ma
marche. —

Je remarque également la fiabilité causée
chez les personnes qui sont affectées et dignes
de l'Esprit de la absorption constitutionnelle,
ainsi que chez les decarbentiques ou les
affectations sont portées à un haut degré.

262 L'implantation en l'administration des maladies
Précisément qu'on doit implanter pour qu'on sache cette
maladie consiste à établir la même
manière de dire seulement qu'il est de cas
ou l'on peut donner toute la solidité
naturelle aux os, toutes les fois que la
maladie ne se trouve pas par elle-même
sans danger, qui par conséquent on ne
peut plus. Il faut aussi toujours faire
de reconnaître la cause qui est d'une
telle que le rapporte Pellet pour un malade
de la salpêtrière qui se fracturait bien
des os sans même le soupçonner qu'il
faisait, le quel ne parvenait à reconnaître
la cause, ce qui existait chez elle
que l'ayant touché après, à raison de ce
avait toujours caché jusqu'à ce qu'il
qu'elle portait une lèvre depuis l'un
de l'autre. On voit d'après cela que
c'est que par les rapports que font les
malades en ce point qu'on parvient
à reconnaître la cause.

3^e De la charbonnée
Il est aussi ce que la gangrène est une
partie morte, laquelle consiste à ce qu'on
dans la partie, la destruction de tout ce
celui qui en est affecté, qui peut être
la destruction dans laquelle se trouve cependant que
c'est au de l'autre, le point de l'implantation
sont plutôt affectés que le spongieux, et
l'un que la partie spongieuse, et l'autre dans
qui quand elle est atteinte est partant la
vaine, laquelle était désignée anciennement

Sans le mani de Paris super, et la Carie
pétente dit Paris humide. Comme elle
passe par particulièrement de l'âme comprante, est
peu de la fait étudier particulièrement chez eux au
que la Carie se étie dans les éponges.

Il se peut attaquer que les lames externes
des os, tant dans les plats que dans les bords,
au lieu toute l'épaisseur de l'os et d'un
côté seulement celles qui sont les plus
intérieures qui s'ouvrent avec une indolence,
au lieu toute leur épaisseur. Dans un
point seulement de l'os l'épave au lieu
dans toute l'os étendue. Elle est ravie d'après
cela la différence qui doit y avoir pour
le traitement.

La carie se passe par laquelle on s'efforce
que les lames externes attaquent toute la
périphérie des os longs, de même que l'os des os
plats dans toutes leurs épaisseurs, au lieu de l'attacher
seulement à un seul point.

La carie arrive par des causes bien
différentes que la gangrene dans les parties
solides, qui comme l'on sait, les os sont
rapportés à quatre genres et dont aucun
de celle qui se trouve renfermée en l'os, et
se ne se accepte l'attitude. Les os
externes comme les os de la tête, les os
de la face, au lieu encore avant l'os dans la
cavité plates lorsque l'os est été mis
à découvert que le périoste a été enlevé
à raison de l'os qui ont été mis en
contact avec l'air, et qu'il a été en contact
avec les corps appliqués sur eux, ce qui
arrive surtout chez les personnes qui
touchent entre les os de l'épave
ne peut point ou faire la réunion de

144 L'amblyopie. Il est des cas cependant où cela ne
fait rien et où elle croît malgré tout.
Il est fort rare qu'on voit arriver au bout
d'un temps assez maigre, il aigrit, et si l'on
meurt, si l'on meurt, qui est une chose rare
la première d'une diète qui est formée
entre les et les parties molles, par l'infirmité
quelque qui est établie sans autre cause
qui si on ne fait l'opération au d'écoulement
la Maladie. C'est encore la même
qu'il faut rapporter la sortie de petits
osquelles qui se portent à la suite de
fractures comminutives, qui est établie
les fragments. Enfin elle est encore due
à la suite de l'apposition de ligaments
à quelques, irritants, qui l'on applique
les os, ce qui provoque celles la détermine
est quelle se voit dans le cas de l'écoulement
puisse faire tomber les portions des os
certaines nous l'avons dit, en bien traitant
Lignes. On remarque d'ailleurs lorsqu'elle
existe par les mêmes signes paraissent ce
qui se voit lorsque les os sont à
d'écoulements, les quels ont changé d'écoulements
autres, qui si les tumeurs au bout qui
d'écoulement au bout différent de l'écoulement
naturel, qui au bout d'un bout est
d'écoulement, ce qui est d'écoulement à la portion des
qui peut se trouver de l'écoulement d'écoulement
Verges, on voit l'un a été pu à
l'écoulement de puis laquelle la plaie est
L'écoulement. Je pense qu'il y a une grande partie
de l'écoulement dans le cas de l'écoulement de l'écoulement
pour les parties d'écoulement dans le cas de l'écoulement.

et est à dire qu'il s'est fait au ^{sein} des parties mortes un raisseau d'assèchement 145
qui s'est formé que par le développement
de petits vaisseaux ~~ou~~ quel on a donné
le nom de vaisseau charnu, granuleux
lequel pousse au dehors de qui sort le sang
de refort, qu'on nomme exfoliation, qui
s'en va par parcelles, par lambeaux. Apparemment
se faire encore malgré cela qu'elle
est sans qu'on s'y appercevra et de ce
les anciens nomment exfoliation indolente
qui peut consister dans le mélange de
plus de petites parcelles infiniment petites,
au lieu même que la nature en fait
l'absorption. Il seroit cependant que cela
a été un peu trop près de la rigueur,
puisque les médecins n'ont jamais connu ces
lambeaux dit qu'on ne peut en tirer
rien d'avançé, sans que qu'ils s'effolient,
ce qui est peut-être prouvé plutôt
qu'autrement.

Extrait

Cela apperoit d'après cela que tout
ce qui s'écoule n'est qu'un travail de la
nature, quoiqu'il en soit, il est des cas
où l'on peut le favoriser, mais en appliquant
point des liqueurs spiritueuses, comme
la liqueur de melle de paille, qu'elle ne
fait que s'écouler plus vite. De nature
Vulnérinaire à Decubitus, qui les inuolvent
couvreroient mieux, qu'on n'en treuve pas
suffisamment trop, ils passent à la seque
au point en faire usage, au lieu d'attendre

146 La cicatrice de la nature misq'il est prout
qu'elle peut elle seule faire ce qui courrait
Au point encore lorsqu'on voit que des os
des autres lames ontient toujours tant l'unité
tache de les secouer, les branches pour
en faire une plus parfaite, la nature s'est
encore maltrouvée au long pratiquant de
au vertueux avec une espèce de fièvre, et
prétendait que les lames qu'on appelle
dessus pénétrant par elles jusqu'à la partie
laquelle elle s'arrêterait, mais en pratique s'est
abandonnée depuis qu'on a vu par les modes
les quels de voir au lieu de la faire s'y
approcher en ce que les bourgeois charmes
passant par les trous représentant des os
de l'os, peut être que cela est aussi
un trop fragiler, et qu'il faudrait mieux
tenir le milieu la dessus, aussi qu'on
pratiquerait avec de déjà senti ce défaut. On
a encore ingéré les os, mais dans ces
moyens sont abandonnés et l'un d'eux de ceux
d'appeler, des innombrables seulement de l'un
d'appeler, l'opération faite, mais ce qui
arrête, les bourgeois charmes s'élèvent et se
mettent avec les parties molles inspirant
Noir rose. 2. La Cicatrice peut seulement n'être
de lames que les formes intérieures des os longs, ou les
intérieures de leur épaisseur, dans un point seulement
des os longs de leur étendue au bout d'un autre
langue, qui dans ce cas est désigné par
le nom de Cicatrice des parties dures
au lieu de s'igniter

Ils a singulièrement été balancé par 1847.
les expériences qui ont été faites à ce
sujet par Cranga, qui faisait les mêmes
et depuis lui quantité d'autres expériences
spécialement les physiologistes, qui tant
ont approchant de la vérité qu'ils en indiquent
l'après les rapports faits aux Vénérables
en qui eux-mêmes lorsqu'ils ont la détermination
microscopique de ce qu'ils parviennent au
usage de l'écoulement d'un objet enragé
qui l'un introduit dans le canal
ectodermique, ce qui la Vénérables doit être
Vénérables ce qui arrive la période de gestation
se termine et s'appréhende de gestation
ce qui fait qu'il devient ectodermique
plus ou moins instantanément que les parties
Vénérables devenues en un véritable liquide.
Et bien la même chose qui arrive chez
les animaux Vénérables, il paraît que
l'homme peut en être atteint par une
affection de l'organe ectodermique.
On a eu occasion de la remarquer Cranga
ata suite de la constitution melle, de
cette sorte que les os, qui produisent une
sorte de cavitation dans l'organe ectodermique,
telle que cela peut arriver par dans
les plaies devenues affreuses par dans
- On paraît malgré ce que rapporte
effigie dans son mémoire sur la vérole
que cette dernière peut également naître
comme seule ou plusieurs parties intérieures
de même que toute l'épaisseur de la

188
Jamais qu'une seule dernière en est le
ce qui est en apparence avec toutes les
connaissances acquises à ce sujet, qu'on peut
la voir la reconnaître, ce qui est qu'on peut
l'ouverture cadavérique qu'on peut reconnaître
à la reconnaître ainsi dans les légères ou
elle est. Elle est plus commune dans certains
cancers que dans d'autres, sans qu'on sache
à quoi cela tient. M. alyon il paraît
qu'il n'y a point de hernie qu'on puisse
Carie à l'hôpital, tandis qu'à Paris il
est très rare de la voir dans les hôpitaux
qui y sont.

Signes

Elle est annoncée par des douleurs plus
ou moins vives dans l'intérieur de l'os
qui s'élèvent d'abord dans une point d'os
où dans toute l'étendue après avoir ébranlé
cela succède un gonflement, une tuméfaction
de la partie, de même qu'on dans les parties
malles environnantes l'os dans quelques cas
trop communément cela s'élève, qui arrive
seulement d'une manière symptomatique, de
ce forme d'os d'os qui s'élèvent d'os
un fait point l'ouverture, les quels laissent
des fistules après eux, qui communiquent
dans l'intérieur de l'os par de petites
ouvertures, ce qu'on reconnaît par l'écoulement
d'un petit osseux. Enfin il arrive un
moment où la portion des os s'écroule
libre dans l'intérieur, ce même temps qu'
la mort le perd, de manière qu'on
trouve plus, il peut se faire qu'on

portion des névroses. forte par les
petites ouvertures qui se trouvent à l'os,
toutes les fois que la section est par
considérable, mais la même chose ne
peut être lorsqu'elle est, attendu que
dans le premier cas, les parties de l'os
pourraient se ligurer et ainsi toutes
mais cela est infiniment rare, par conséquent
faudrait que les ouvertures fussent plus
grandes et qu'il n'y ait qu'une seule
petite portion d'os malade. Vingt
moyens d'opérer cela est d'extraire la
partie affectée.

C'est tout ce que lorsque la maladie
est parvenue à un haut degré que de l'extraire. Le second
peut être reconnu, - car dans cela on ne
le peut guère, en effet elle peut être confondue
avec un ulcère qui se forme dans l'os.
De l'os auquel quand il existe des signes
caractéristiques ne peuvent point la reconnaître.
Ces signes sont d'abord comme plus certains
sont les ouvertures qu'il peut exister à l'os
au travers desquelles l'air peut introduire
un fétide et irriter la partie affectée.
Si l'on voit, ce qui est facile d'observer toutes
les fois qu'elle est très-élevée, de telle
sorte qu'on peut la faire vaciller dans
l'intérieur. Par conséquent, puis en suite
sortir de quelques parcelles.

On ne connaît pas d'autres moyens
pour en guérir la maladie que d'extraire
une ouverture artificiellement à l'os, dans
les cas que celles qui existent ne suffisent

C'est tout

N^o pas assez grande pour permettre de tirer
un traitre entraine les parties mortes
ce qui fait soit avec une trépan à mail
ou bien percute, au bout des os
fortes des os longs qu'on introduit au
travers les ouvertures pour importer de ce
dont on se sert pour guérir parvenue
au but on se propose, toutefois après
avoir découvert les dans une étendue
suffisante en faisant une incision
cruciale au fin, en retranchant les parties
portées inallés d'une manière circulaire, ou
apolaire. Une fois l'ouverture faite on doit
extraire la partie tendue et l'état de séparation
ou on la laisse en place quand on présume qu'il
ne tient plus aux parties de l'os qui l'entoure
qui pourrait y tenir encore par quelques esquilles
et quelle ne soit point dans cet état que les
pathologistes désignent sous le nom de
séquestre parfait.

Il est une remarque à faire pour cette
opération est qu'on ne doit la faire que
quand le séquestre est peu considérable tant
l'os qu'il s'agit des membres osseux
tandis que la même chose ne doit pas être
autant considérée pour les membres mous,
en effet les premiers étant le soutien le
soutien de tout le poids du corps, il est
clair qu'ils les os qui sont dans leur
composition étant faibles pour être plus
et se fracturer de sorte que dans des os
qui ont tant de force de suite faire l'impact
du membre au lieu qu'il faut les os au
point la même chose à apprécier

parties d'artificielles.
 Celles d'origine organique des ess-
 proprement dits.

Elles sont extrêmement multipliées et on
en trouve tant. Descente au premier étage
lorsqu'on en veut traiter les difficultés -
qu'il y a pour cela, en ce qu'on les a confondues
en un ensemble. L'analyse on peut dire
générale est pour caractères significatifs
des os, aussi est ce qui les avertisse et rappelle
en partie tant les os costaux, mais que
maintenant l'on s'en est plus limité, on
vient en fin de compte par à qui gâtée en
c'est d'après sur le traité des Maladies
des os de Petit au Verra que cela est elle
principale à empêcher sans cette dénomination
une affection de l'intérieur d'un os large
qui n'est qu'uniquement par un qu'on se montre
d'après ce que nous exerce dit: il en
est de même pour l'usage.

De la Prostate.
 1^{re} Dans une espèce de gaine formée de la surface

De la Coarctose.
Elle consiste dans une espèce de gonflement de la surface
de l'os qui se présente sous des aspects
différents. D'abord elle peut se présenter
sous une espèce de tumeur circonscrite
qui à l'ap. de ressemblance avec les apophyses,
qui tantôt à une grosseur considérable,
tantôt que d'autrefois elle ne la pas, —
resemblant alors à l'apophyse Hildebrande par
sa forme allongée. Laquelle présente
l'ap. de dureté et que par l'ap. de ressemblance

159
L'annee de l'epidemie a été designee sans le nom
d'epidemie; mais connue sous une forme de
Cariee, laquelle a été encore designee
le nom a cause des petites esquilles qui
présente est. Et il existe une example
dans une lettre laquelle est un bandage
de la partie supérieure du tibia, dans la
quelle elle était contenue comme dans
une espèce de poche formée de l'étoffe
laquelle était considérable. Il existe
d'autres exemples et il est difficile de dire
parait qu'il doit être dans une position
une quand il dit qu'il est en face de la
face du bras os il est difficile, qui d'après ce
qu'il rapporte n'était qu'une véritable épi-
démie. 14 Les épidémies épidémies sont les plus
communes, lesquelles à ce point parait
se former par la privation du phlegme
calcaire dans le péricoste. Il n'est pas
difficile de le prouver d'une cause quelconque
lesquelles se font remarquer par les os
de même que les os du milieu du bras
Caudex. Au la tête arrive à la suite de suite
de chutes par les os, de même par
une qui est la maladie épidémique de la
constitutionnelle, qui quand la chose est
il n'est pas rare d'en voir sur le dos, qu'
l'on pourrait confondre avec une épidémie
signes. Une fois qu'elle a bien il est très facile
de la reconnaître par l'épave de l'épave
qu'elle forme, soit qu'elle ait son siège sur
les os plats ou sur les os du crâne, le
sternum ou les os du bassin, ou l'os
au bras ou les os longs sont des os.

Supérieurs, au inférieurs. Elle s'en est 153
lorsqu'elle a son siège à la surface interne
la compression de l'osseau. L'un est senti
des fois le haut mal, souvent autres choses. C'est à dire
Hg. au bassin la rétention d'urine par la
compression du canal de l'urètre.

Il n'y a pas d'autres moyens pour la
traiter que de faire usage des antispasmodiques
toutes les fois qu'elle dépend d'une sépulture
devenue constitutionnelle et ne le devient
en suite que secondairement. Au point où
l'on se porte des symptômes fondamental
que l'on implorait nécessairement, à cause
de leur point d'effet sur les os et par
de grande vitalité dont on se peut passer
pour poursuivre en faire usage. Mais
il faut se faire que malgré qu'elle
dépende de la première l'os de la maladie
Vénérienne que celle-ci soit guérie dans
que pour cela elle se dissipe; il faut alors
dans ce cas la traiter comme une maladie
locale de la même manière que si elle
était produite par une cause extérieure;
laquelle peut dans certains cas être guérie
de mauvais effets, car nous l'avons dit
telle que Hg. la tumeur de l'œil que l'on
a vu par son siège par le l'arbitre,
la compression des effluents de.

Parmi les exostoses il en est qui ont
un tel siège qu'on ne peut les reconnaître
d'autres qui se peuvent être facilement
lesquelles ont un siège malin, tandis

15^{me} Il ne faut pas se laisser entraîner à s'enflammer
enfin qu'on ne peut reconnaître que par
l'exostose osseuse, toutes les fois qu'il
y a un siège sur les os du crâne, sans
pas les tumeurs si elle ne gêne point, ou
les abondamment à la nature, de cause de la
difficulté de les enlever, qu'on ne passe
à l'opération qu'en les mettant à découvert en
levant la partie molle dans une tumeur
compressible, qui tient au os sa base avec
un petit instrument de même nom, au
dessus avec une pince et un scalpel, qui
comme est très difficile, on peut la
faire avec un fer à cheval de petits traits avec
un perforateur, qui enfoncera sans
inconvénient.

Second 16^{me} Les exostoses molles ou spongieuses sont
infinitement plus rare que les éburnées. On les
reconnaît la remarque chez les scorbutiques, ainsi dits
Molle ou que chez ceux qui sont affectés de scorbut
spongieux, note à un haut degré. Il n'est point facile
de les reconnaître toujours tant de suite par
le premier état d'ail de l'éburnée, sur laquelle
on ne se méprendra pas cependant, en fait
attention aux signes qui la caractérisent, qui
sont la présence d'une tumeur plus ou moins
considérable, la quelle qu'elle n'est point
aussi dure que dans la précédente, présente
une certaine mollesse que l'on ressent en la
palpant, qui cause de vives douleurs
surtout en se couchant, étant fréquemment
exposée à être accompagnée de douleurs.

Les moyens qu'on emploie pour guérir les 153
maladies, diffèrent suivant que la tumeur
est encore dure, qu'elle n'est point accompagnée
de Carie, au lieu que cette dernière diff. D'ailleurs
existe pas. Dans le premier cas il ne s'agit
que de la mettre à découvert, & d'y faire
quelques incisions qui l'entraînent, puis d'en faire
l'arrachement. Dans le deuxième au contraire
l'ayant découvert il faut y appliquer le
cautère actuel pour poursuivre la destruction.

Maladies de la continuité Des os.

Il en est deux qui sont bien distinctes l'une
des autres par rapport aux signes qui les
caractérisent & à ce qu'elles consistent à rapprocher
tantôt dans le changement de matière même
du tissu osseux, & d'il devient une éponge
à son intérieur, tandis qu'à la superficie
l'os se trouve encore une fois d'aspect
solide & compacte qui néanmoins d'après
la manière dont elles se présentent ont été
distingues les une des autres, & sont ainsi
qu'il y a le spina ventosa, l'ostéosarcome,
le piodartracoe, puis une autre affection
comme d'un autre.

Le spina ventosa. C'est

Il commence par l'augmentation de Volume
de l'os, de cette manière que son pourtour
se trouve de plus en plus considérablement élargi
une cavité à son intérieur qui contient
une substance spongieuse en manière de
liquide tandis que son intérieur présente
encore une couche de substance compacte & l'os
ne emment pas jusqu'à présent d'exemple

156 plus frappant que celui dont rapport
Quernay, lequel fit une personne infirme
qui n'avait ni dans toute la longueur
l'os, le quel présentait deux l'intérieur des
des espines de cellules et qui existait dans son
continuer approchant deux pieds de periph
Versant par Daguier qui rapporte aussi
in asinifera aussi un, mais qui avait
un volume moins considérable était un
jeune homme qui le portait qui en fait
attaque des son enfance lequel lalla en
anguissant jusqu'à de vingt ans au il
le porta d'une manière très lente en un
temps qu'il dépécissait tant les jours, mais
qui parvint à l'âge de la puberté (en il
était) produisit par un vice (prophylaxie)
tant la maladie générale était en que
soit concentrée sur le lieu affecté
parmi qu'il fit l'amputation de l'os
au malade, qui n'avait pas fait jusqu'à
se guérir à cause de la faiblesse, ce qui
le guérit. Cette lame osseuse qui se compose
de l'os présente un très grand nombre
de trous, de sorte qu'elle est comme aride
ostéocome. L'ostéocome est également manifeste par
un gonflement de l'os lequel est déguisé
en une substance molle, l'os des humérus
semblable aux d'une grande cancéreuse
pédiculaire. Une autre affection qui affecte également
l'os, qui ressemble à l'os de l'os de l'os de l'os
précédentes, à la quelle on a donné le nom
pédiculaire, elle est convertie en une

moins les vains, naturels & qu'il avoit été 189
chez tante et général. Tant et ont des vains
que jamais cela n'est, parce que si c'est
grâce au le remarquer - chez tante et
~~Sur tout~~ chez celles qui ont le Malin mal
conformé. Enfin maintenant il en est qui
croient que cela à lui, ce qui atteste
avoir vu plusieurs.

Il y a tant de présumé si la chose
est telle qu'elle se fait avant l'accouchement
pendant les temps de la grossesse sans que
l'un sache rien de cela tant, un ou quelque,
ce qui doit arriver à divers Degrés et
non après comme qu'on l'a dit jusqu'à
si cela tenait à la satisfaction des parties
ou ne pourrait point traverser tout de suite
chez celles qui sont mortes peu de temps
après leur accouchement et puis que d'autres
en le trouveront dans leur cadavre
d'autres comme ceux de femmes. Si la
chose était confirmée on se voit les plus
ardent de faire l'opération de la Symphyse
car ce n'est que par la difficulté qu'il y a
à la pratiquer qu'on ne la fait point, en
ceux les os se déarticulent plus facilement et
qu'il n'y aurait point de rupture des ligaments
laerobiotiques ou le prétendu. Cela n'est
point une plus de à l'état de Maladie
qui empêchent les femmes après leur accouchement
puisque si la chose était telle on ne le
remarque point chez qu'on ne voit
quelles sont accouchées et puis on envoie
de l'opération cadavérique. Il faut toujours
en un certain temps aux nouvelles accouchées
puisque les cartilages reprennent leur

1^o Etat ordinaire, au quel on ne peut cette fois
qu'il en est qui ne peuvent point marcher
les premiers jours et qu'il y a souvent des
inflammations.

Affections des membranes
synoviales d'articulations.

Il y a que quelques qui sont exposées à être
atteintes de maladies particulières, que les
autres parties y sont bien également sujettes
mais plus exposées à une autre maladie
c'est à savoir que l'on voit les organes pleins
de pus, se transformer qui en suite en
une tumeur blanche, ce qui se fait
les tumeurs blanches, et de même pour
les autres.

Les membranes synoviales sont exposées
à être le siège d'une accumulation de synovie
qui constitue les hydropisies articulaires,
mais à d'autres en corps articulaires
appelés communément tumeurs blanches
alors on commence d'abord à parler. Les
canotisations d'ailleurs peut être parler tout de suite de
articulaires sans inflammation, mais dans un état d'indolence
pas, d'ailleurs qui nous l'expose en parlant
des plaies des articulations, mais, absorbant
seulement en passant, comme l'exposé dit qu'il
n'est pas aussi favorable qu'il l'est il y a que
ampli.

2^o parait qu'il y a déjà longtemps
que l'on a parlé pour la première fois
des canotisations d'articulations, par conséquent
les indiquer, mais allongant, l'écriture, indiquer
dans une espèce de distraction, c'est à dire
qu'on ne parlait point, au point d'encafer

rappart des obligations aux anglais, qui
dans le milieu du siècle d'innocence
ont rappelés à la mémoire, ainsi qu'à
desant en France, le grand nombre de temps
de la pratique en également l'indiv
rencontrer. Elle paraît en France dans toutes
les articulations, soit ainsi que l'habitude
occasion dans rencontres dans la tempora-
et l'axillaire, Bell dans la Ribitocaine
Mais tout est il en forme presque
dans la symétrie libérale. Au point de
donner de règle précise sur plusieurs
comme sur une figure et le lien qu'il
est, d'effet il y en a depuis une, deux, trois
jusqu'à un volume assez considérable, puisque
à l'organe à occasion de rencontrer
jusqu'à 25 dans l'articulation du genou, en
général plus il y en a plus elle est petite
Cependant, elle est grande, d'autres fois petites
qu'elle est. Elle est fixe, comme elle est
autour qu'elle est, elle est fixe, elle est
particulaire, est ainsi qu'elle est, elle est
d'une portion de cartilage attaché
à un point, mais ainsi qu'il est
par la manière dont elle se distend
Elle paraît être que l'effet d'une
prolongement de la membrane synoviale,
laquelle parvenue à un certain point
s'aproprie de l'articulation par une union de
propriété particulière, d'une manière
d'une cartilagineuse puis elle se par
l'absorption de phosphate calcaire de toute
de toute cette substance, ce qui fait
que dans le commencement elle est.

182 d'ailleurs de la dactyle il en a une autre, tandis
que leur circonférence est, en moyenne, la même. Au
point sans ce rapport avec les autres
différent des calculs urinaires et biliaires,
secondairement augmentent plus augmentent de volume
18' Stictose comme fait que le péricule auquel il tenait la
tresse rampante, détruit.

Ce les a remarqué spécialement dans les articulations
causes ou la queue à la fois suivant son siège,
de manière que dans ce rapport les queues
sont plus exposées que les autres.
Il paraît qu'il y a peut-être quelques-unes plus
signes pour et même des puces, etc. Dans un
certain cas sans pour cela association des autres
qui ne fait qu'il y a. Viendrait à la surface
ou saute à l'air de très vives et qui ne paraît
tenir alors qu'à leur présence entre les doigts
articulaires. Dans ce cas ils sautent alors de
la queue dans les mouvements de dactyle.
cela peut arriver d'une manière particulière.
On les voit sauter pendant tout le temps
que par conséquent se trouvent les dactyles.
De petite intervalle que laissant les autres
sympômes, dans leur présence occasionne
l'augmentation de l'hyperémie
articulation au lieu de traverser d. même
que cela arrive pour la tresse vaginale
toutes les fois qu'elle se manifeste.
Malgré que ces signes amènent bien
leur présence dans les articulations, il n'y
a aucun qui est plus caractéristique
que l'hyperémie, ce qui est facile à faire
dans certains cas, comme dans l'hyperémie

le malade. Quant au malade, qui est si
si facile, que le malade qui se sent le
corps pénétré à l'extrémité le remède

Il y a deux méthodes différentes pour traiter
les scissures. La première consiste à dilater une
qui consiste à tenir fixe le corps dans
un lieu déterminé pendant plusieurs
mois afin d'être fixé contracté. La seconde
avec l'intérieur de la membrane synoviale
et que par là il vaille plus d'une autre
endroit, mais elle est très mauvaise parce
qu'elle a été indiquée par les Anglais,
ce qui le confirme est que comme les uns
disent qu'il faut se garder longtemps et sans pain
cela est une contraction. D'ailleurs, il faut dire
à un malade de garder le repos pendant
un temps pour pouvoir le guérir,
sans se fatiguer. Quant au malade, qui est
qui d'ailleurs demandent si, il faut
dans un lieu qui ne gêne pas. L'autre
qui est la meilleure consiste à se faire
l'extension qui doit même être faite
que tant et les fait que l'on suit le corps
autour des parties sans le quel on pratique
une petite opération, par laquelle si on se
l'empêche point on se voit en danger de le
échouer avec un instrument. Dans l'opération
ce qui ne peut être fait sans occasionner
de l'inflammation de la membrane synoviale
ce qui demanderait plus. Il faut toutes
les fois qu'on pratique une incision
suffisamment grande pour pouvoir l'entraîner

154
L'annee non peut en effet grande qui
conviendrait à cause de la rapidité de la pénétration
de l'air dans l'intérieur de l'articulation. Au
dout ensuite avoir l'air pour le même but
de ne pas donner la même direction à
l'incision des téguments parce que sans cela
la pénétration de l'air serait trop prompte
C'est pourquoi on est obligé de visiter plusieurs
fois l'air à plusieurs corps extraits par
les latraces des moments pas trop éloignés

Hydropisie articulaire 2.^e Dans le nombre d'articulations
où l'on a vu l'hydropisie des articulations, elle
n'est été jusqu'à présent que dans celle
du genou, & quelle puisse cependant se
former dans toutes. Il y a quelques temps
qu'elle s'est formée dans le genou d'un homme
qui avait dans le genou une tumeur dans
la scapulo-humérale, qui dans l'articulation
portait, qui l'entraînait en même temps
l'air dans le joint du genou très
fort pendant quelques temps. Elle se sent
pas très fréquente.

Cause Elles consistent comme celles traitées
membranes, ligaments dans un défaut trop
grand. L'opération au lieu d'être faite
peut être des deux remèdes. Il faut
bien se faire que l'air ne s'écoule pas
causes causées à ses dernières artères
essentielle symptomatique et sympathique
essentielle consistant à ranger l'air dans
qui vient par elle en l'indiquant que pour
l'air couché sur l'articulation, à l'articulation

65
au contraire la membrane synoviale
est affectée d'une manière
chronique, il en est de même pour les
parties des articulations, chez ceux qui
sont atteints d'une rhumatisme par la présence
d'un corps étranger dans l'articulation
Dans la syphilis, par l'affection
d'un organe voisin de la membrane synoviale
des ligaments etc. Quand la syphilis
est elle-même affectée générale ou d'un
organe, elle agit au même point d'exemple
l'accumulation du liquide synovial seigneur
ne produisant point de destruction comme
on pourroit le croire des parties supérieures
l'articulation, ainsi de la membrane synoviale
reçoit tout de la résistance qu'elle présente
les organes fibreux qui l'entourent. Il est
possible qu'elle produise une luxation
spontanée de la tête d'une femme comme
la croix fait, parce qu'elle a trop part
à l'action pour produire de tels effets les
parties supérieures, au lieu d'être d'un
il est très remarquable
l'articulation plus forte de l'articulation
du genou, n'est point toujours une ligne
d'hydrocèle articulaire, mais c'est d'un
goutte, lorsque cela existe, dans d'autres
affections des os. Dans ce qui n'est
humaine blanche. Il y a point de changement
des os à la peau la douleur est plus
au premier site, se valant de genre
est point uniforme, il y a une disposition
à son milieu cause par la présence

1862, la Nature des deux ligaments, tandis
que les autres sont élastiques qui tiennent au
de résistance que présente le cartilage.
On la recommande encore à l'usage Bandage
au de fluctuation qu'on donne l'effet
de l'écoulement y imperméable de l'écoulement
sans imperméable avec l'écoulement de l'écoulement, de
manière que d'après cela il est impossible
de si imperméable, si se met qu'on en
écoulement, mais que l'écoulement de l'écoulement
écoulement en l'écoulement qu'on le l'écoulement
écoulement plus promptement, puis ensuite par
qu'on a prévu.

traitement. On fait usage pour la guérison
 d'onguent irritante que l'on applique
 sur le genou, ainsi que de Résolutif
 les quels approchant de la même manière
 ont ainsi qu'on fait usage d'acides
 d'eau minérales, de Sturmes d'alcool
 de tincture de Cantharides, de moelle
 Vesicatoriales, qui s'il ne réussissent point
 on fait usage alors de la Scarification pour
 donner issue au flux, de même que
 cela se fait avec un bistouri après quoi
 on fait usage de résolutif est de tout
 ce qui a été parer dans le premier
 alors, attendu qu'ils agissent avec plus
 de force, on y joint aussi fait l'usage
 de faire d'insister l'infusion de la
 si l'on juge à propos, ce qui doit toujours
 être pour passer à celui au point de
 guérison de ces manières, 14 en disant
 de l'usage de la tincture de tarte, de

manière à pénétrer le 167.
trois quarts d'une semaine
qui expand l'écoulement, qui est faite
en en rapprochant les lèvres, et qui s'oppose
à ce que l'air ne pénètre de l'extérieur
tandis qu'il s'écoule. De telle manière
que la pénétration faite au plus tôt
s'écoulera qui s'écoulera et la membrane
synoviale en les lachant. Quelqu'un
dit que c'est un moyen palliatif et il faut
y avoir recours plusieurs fois.

Il est remarquable que l'on ne peut
écarter toutes les chairs de la face
des injections, de manière à lacerer
commune cela se fait par la tunique
vaginale, qui peut être si l'on y a égard
toute au contraire, mais qui ne fait
pas à cause de sa sensibilité plus grande
qui pénétrant occasionne une telle lésion
suffisante et par là donne lieu à
une éruption de l'articulation par la
moindre de l'écoulement des parties de la
membrane, ce qui deviendrait de lachant
tout-à-fait fatigant et gênant.

Des tumeurs blanches

Leçon du
21 Ventose

C'est une tumeur blanche, ou
sympatisme des articulations, ou gonflement
de ces parties, qu'on appelle tumeur blanche
ou épanchement. Quelqu'un la met à la suite
par les os en même temps, tandis que d'autres
se sont les os appartenant aux parties
molles qui l'ont, c'est ainsi que l'on voit

188 Le tissu cellulaire, les organes filtres ou être
affectés les premiers, d'une manière gff. à l'articulation
toutes les parties composant la circulation.
Causes Elles peuvent arriver d'une manière spontanée,
mais le plus ord. elles ne se développent que
par des causes déterminées, c'est ainsi qu'on
les voit survenir à la suite de coups, de chute
portés dans les articulations qui dans qq. cas
suffisent seul pour les déterminer, tandis que
dans d'autres elles ne font que développer la
cause cachée existante. Dans la cancrine, c'est
ainsi qu'il arrive gff. pour ceux qui
ont des éruptions herpétiques, Vénériennes.
comme cela se remarque même à la suite
d'interle, on il faut être que les personnes
gardent pendant bien longtemps, au ^{long} temps
et très près gff. le général dont pendant
le temps que l'affection a été priée, Digressus,
c'est ce qui arrive même dans les autres
endroits que les articulations, par ex. au
les remarque le plus, qui sont le gff. au
le pied, le coude et le poignet, et le rhumatisme
ou une autre cause la reproduire et l'on voit
sans le rapport d'obligation à l'elle.
la même fait connaître, qui en affecte une
dans l'articulation. La ponde gff. lequel il y a
l'analogie avec la gante, c'est ainsi qu'on
la voit. N. chez les personnes qui ont une
Rhumatisme dans le milieu d'un membre
et qui pousse à pousse gff. de pousse en
pousse l'articulation et produit cette lésion
on les reconnaît au gff. à la

Signes

rigidité de la partie affectée, qui y fait 189
une sensation de froid. Les os les plus durs dans
cet état, ils n'ont point changé de
nature. Tandis que les organes fibreux, le
tissu cellulaire se détachent d'avec, ramollis,
formant une espèce de substance lardée,
blanchâtre. Lorsqu'une entorse est parvenue
que la maladie s'ennuie, on voit qu'il
des dépôts se manifestent tout à coup, dans
quelque point d'abord, tel qu'il a été pour
celle de l'articulation il se forme dans qu'on
cas, au lieu que si c'est par les parties
molles il est facile de les apercevoir,
dans qu'on espère des signes caractéristiques,
en regardant les parties présentent une certaine
sauplisse, qui est le contraire de l'autre.
Il arrive qu'il y ait malgré qu'il y ait
une grande suppur, que les os se
sont enflammés au moment de la lésion
qui a existé, que les articulations s'engorgent,
en ce qui semble dans ce cas, que l'on trouve
à l'examen tant le ppe morbide que
et qu'il se trouve d'effusion. Il est au
moyen de la suppur qui se fait, de
l'effusion qui se fait, de l'effusion
affectée ne pouvant point résister à l'état
d'elle étant apparemment alors toutes
les surfaces articulaires s'engorgent et la
maladie est guérie - parce que l'engorgement
de l'articulation - ce qui est un cas rare
et très satisfaisant pour les malades

196. toutes les fois qu'elle arrive.
Je suppose que la maladie faite
de progrès. Voici ce qui arrive, la maladie
tombe dans une dépression générale, dans le
flaccidisme, qui n'est pas bien comme d'habitude
l'on dit par l'attention du pus, mais
bien par le trouble, le dérangement des forces
de sorte qu'elle ne se fait plus comme elle
desirerait se faire, qui se fait d'une manière
sympétrique toutes les fonctions organes se trouvant
dérangés, n'importe de quel, qui quand elle
est atteinte par un degré la mort en est
le résultat.
C'est tout d'après ce que nous venons de
dire pourquoi cette maladie est fâcheuse,
qu'elle est en général d'un mauvais caractère,
que le traitement que l'on doit employer
pour le traitement doit être d'après cela
de l'affaiblir et d'épargner au lieu de l'appuyer
pour la traiter. Elle ressemble en général
à deux choses, à la pleurésie, les uns disent être
employés sur elle même affaiblir l'autre
que les autres au contraire, disent être
adjuvants à l'intérieur pour combattre
la cause existante, qui a pu donner
lieu à la maladie.
Quand par ce qui regarde cette
maladie, rien d'être maintenant,
parce que tout ce qui saurait nous l'appeler
indiquer en parlant des affections de capsa
et d'indolence, considérée d'une manière
générale, l'autre fois au ne doit employer

les magens causeables qu'à ces amies.
interrogé les malades pour savoir
plus au juste quelle est la cause qui
leur auroit procuré la maladie. Sans
enfin les lésions, auroit fait d'abord
garder le repos aux malades, appliquera
sur le lieu malade des impositions pour
appraiser des douleurs s'il en existe une.
cela n'est point rare de le voir à la
suite d'écoulements et même faire des saignées
locales si le cas le requiert. Une fois qu'elle
est réduite à l'état où elle doit être,
ce n'est plus que les irritants locaux
qu'on doit porter des yeux, mais
variant de quantité de manière à en
faire toujours usage que par degrés
c'est à dire en commençant d'abord
par ceux qui sont les plus froids et
à suite au plus forts, soit ainsi qu'on
peut faire usage des angustiques, comme
celui de thier, d'après l'ancien caustique
de fleurs de soufre, d'emplâtre cancrin
de Vigo, comme caustique, de liqueur de
leucodermis. De même à ce que la
notabilité. De même faite avec les sels
minéraux, au simplement l'eau ordinaire,
dans laquelle on aura fait dissoudre
de la potasse, ou bien on peut encore faire
des saignées, qui comme on sait font
de haut à un port irritant; les
inflammations. les pectolaires, les angustiques
sont les faire suppurer et les réunissent
à l'écoulement, le caustique actuel, au

198
en ager du Moxa, en l'air d'un feu rouge
qui peut être enroulé en une queue de poisson
ou fait en forme de l'air d'un poisson qui se tord
de feu qu'on peut renouveler tant qu'il y a
jour, le quel nous a très bien réussi
pour une femme jeune malade du
pied quelle a eue.

22 Second Remède pendant longtemps continué
l'emploi de tout ces moyens, puisqu'on
a vu comme nous, l'usage d'un
pour la maladie se terminée par une
anquilose de l'articulation, et en suite
l'amputation du membre. La dernière
extrémité est à dire l'articulation
se dépresser de la point la faire, puisqu'il
est de remarque qu'elle s'est levée
lorsque le malade est tombé dans un
état de marasme pour ainsi dire, que
lorsqu'on est obligé de la pratiquer à des
individus de la manière indiquée, et
qu'il arrive pour ceux qui reculent ou
plais d'arriver à une qui ont une forte
commotion. Mais d'après cela, on peut
pendant plusieurs mois faire faire usage
de remèdes qui paraissent capables et
même une autre, mais si l'on remarque
que l'anquilose s'augmente, et s'il y a
au place de membre du malade dans
une position qui paraît lui être la plus
convenable, dans ce cas on s'occuperait
à voir bien ainsi au la place d'arriver
l'articulation, la flexion, au lieu d'être les

qu'il faut supposer que la maladie fasse
de progrès, qu'il y ait plus de
de progrès

à épier, il faut alors enlever
l'impetation qui lui fait soit dans
la cavité du sinus, ou dans
simplement dans la cavité.
pourrait se faire même, qu'on se la
faire que la résection de l'os, comme cela
a été pratiqué depuis le seizième
siècle dernier.
Des tumeurs blanches dans les parties où elles
ont le plus lieu.

1^{re} De la tumeur blanche. Anecdote d'un cas
rarement, qui cependant est fait observé de la tumeur
qui peut avoir son siège dans l'articulation
temporo-maxillaire, qui peut avoir pour
cause le vice de développement, les plaques
d'os à son développement des cavités
au des parties d'os denses de dent os

2^e De la tumeur blanche dans les parties. Des tumeurs
des tumeurs, en particulier pour les dents
premières. Il s'en trouve une pièce dans
le Cabinet d'histoire naturelle du Jardin
des plantes, sous l'écritoire d'histoire
dans laquelle les surfaces des cavités
de l'écritoire étaient déplacées d'après
des tumeurs de l'os, ce qui ne peut être
fait qu'en une manière très lente et
non apte. car sans cela il en serait
résulté la compression de la cavité
et de la dent. Il en sera aussi
une pièce représentant de l'os d'os d'os
qui approchait de la précédente,
que lui ont donné
3^e Elles surviennent 97^{es} dans la
dans l'articulation
temporo-maxillaire

194 *Capulo-punérale*, laquelle est aussi
fréquemment suivie de Carie à l'insu
que cela se remarque par les des
dans celle de la langue. C'est particulièrement
lorsqu'elle a eu lieu qu'on a vu occasion
de pratiquer la résection de l'innervation
de l'articulation de l'os peut exister
dans l'os. C'est le siège, qui est même assez fréquent
la quelle est annoncée par la gonflement
de la partie par la difficulté d'ouvrir
qui est la quelle a été le siège de Carie,
qui est celle au lieu redoublée de plus
l'ampoutation.

La Carie C'est elle peut se faire entre elle et
Radiate son siège dans l'articulation. C'est-à-dire
qui peut être seule, ou bien exister en
même temps avec celle d'un os, qui ne
lien guère que chez les enfants, qui ne
arriver d'une manière spontanée, sans
parce qu'on prend les enfants pour la main
pour les faire marcher, qui alors tombent
au vent les rotatives et on leur cause tant
de suite au de la langue la maladie
parce qu'on leur porte, l'avant-bras dans
la supination. Il n'y a pas de meilleur
moyen pour s'opposer que de les faire
de cette habitude, puis de tenir les bras
de la maladie dans le repos et dans une
position inverse à celle qui précède.
l'opération.

Carie C'est au l'os arrivant. Il est dans celle
carrière, à la tête de l'os, par le
des jointures, à la tête de l'os, par le

De cepe les malades ne sont point tant. 195
De suite employé les moyens qui conviennent
pour combattre la maladie et de ce qu'il
ne tiennent pas le membre dans une
immobilité parfaite, De la même manière
qu'on se voit arriver pour le même pied,
on il faudrait qu'il se gardât longtemps
en repos absolu pour dissiper l'inflammation
et pour les membres inférieurs.

De l'élévation
Sans nous nous bornons seulement au de la position
pour ceux qui s'agitent qui affectent la position du
l'articulation des femurs avec les os iliaques
en ce que tant que nous sommes privés
précisément de la supposition à l'articulation
et du pied.

En nous bornant ainsi que l'on a
contenance de dissiper les tensions de
l'articulation de la femur, on de
traverse blanche, nous dirons qu'il n'y a
de l'os de la femur hypocrate qui s'agitent
de l'os qui sont en l'état pas lequel
à depuis ce temps l'articulation de
l'articulation de la femur qui n'est
suffisant point trop les causes la
expliquer comme étant un effet d'une
abondance de lymphe dans l'articulation
qui pourrait la tête de la femur, ce qui
n'est point, puis qu'on ne peut pas
convoier convenablement que se fasse
pourrait agir ainsi, lequel on se
pour bien l'introduire à tout son

196. ~~entendu~~ entre la capsule articulaire, ~~ad-~~
~~attache~~ ~~posée~~ ~~donnée~~ ~~lien~~ à une ~~distension~~,
de la capsule articulaire, puis ~~entente~~ ~~cis-~~
~~ainement~~ ~~fait~~ ~~ne~~ ~~la~~ ~~parait~~ ~~depuis~~ ~~cette~~
~~explication~~, dans tout les cas pathologiques
qu'on a eu occasion de rencontrer. D'ailleurs
Car il n'y a point toujours allongement des
ligaments, malgré qu'on aurait lieu de présumer
qu'il y a plutôt l'effet de l'augmentation en
épaisseur des cartilages qui recouvrent les
os, ce qui d'après cela ne peut point
faire présumer qu'il y a toujours allongement
du membre.

Signes Les maladies, ainsi que la difficulté de
mouvoir le membre, qui ~~peut~~ ~~faire~~ ~~présumer~~
la maladie, ~~peuvent~~ ~~être~~ ~~quelque~~ ~~fois~~ ~~avoir~~
pour signes autres signes, si ~~ce~~ ~~n'est~~ ~~pas~~ ~~dans~~
des ~~cas~~ ~~de~~ ~~cette~~ ~~affection~~ ~~qui~~ ~~déterminent~~
la ~~faire~~ ~~présumer~~ ~~l'effet~~ ~~qui~~ ~~ne~~ ~~peut~~
~~être~~ ~~confondu~~ ~~avec~~ ~~l'allongement~~ ~~du~~ ~~membre~~
ce qui se prouve ~~est~~ ~~qu'au~~ ~~lieu~~ ~~de~~ ~~99~~ ~~lignes~~
au moins il est ~~revenu~~ ~~plus~~ ~~que~~ ~~la~~
de ~~moins~~ ~~de~~ ~~99~~ ~~lignes~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~part~~
il ~~agit~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~part~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~part~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~part~~
ou ~~dans~~ ~~la~~ ~~part~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~part~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~part~~
ne ~~peut~~ ~~être~~ ~~plus~~ ~~montré~~ ~~le~~ ~~membre~~ ~~et~~
surtout la ~~jambe~~ ~~ne~~ ~~la~~ ~~causant~~ ~~elle~~
mole ~~bas~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~succède~~ ~~des~~ ~~signes~~
qui ~~se~~ ~~forment~~ ~~dans~~ ~~les~~ ~~cas~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~part~~
de ~~la~~ ~~distension~~, qui ~~dans~~ ~~99~~ ~~lignes~~

grande quantité de pus, qui après un 19.
arrivera souvent au certain temps, change
de nature, & diminue dans la quantité et
donne lieu à l'angine. Particulièrement. Partout
les moeurs pures & saines sont les
mêmes que dans les autres parties. On
doit seulement remarquer qu'il n'y a
de bons effets de l'emploi des Vésicatoires,
lesquels ne peuvent pas être appliqués
trop tôt, que l'on ne fait point
supprimer et qu'il faut attendre le point
de l'usage.

Le 25 Ventose

Ce ne fait l'opération de même, au
plutôt l'opération de l'oeil, que dans les cas
que l'affection ou la maladie se trouve au
dessous du lieu de l'opération avec celui qui
lui précède, est ainsi M. qui a dit se
faire pour l'opération de l'oeil, la
quelle ne s'est faite pour un cas qu'une seule
fois dans le cas de l'oeil, et est arrivée
la pratique en chirurgie. Elle peut bien
encore avoir été faite dans cette autre
pour d'autres causes, comme pour dans
le cas de plaies d'armes à feu, en France
elle l'a été un très grand nombre de fois,
surtout depuis la révolution qui a rétabli
dans ce cas, tandis qu'en d'autres
cela ne peut se faire.

Elle n'a point toujours été faite de
la même manière, et le Sabatier y a fait
une modification dans ces derniers temps,
qui nous paraît par la manière dont

198 il en présente au contraire les préceptes, un peu
simples, en regard n'est pas aussi facile de
l'exécution qu'il le paraît aux premiers abord,
et que ce qu'il indique fait voir que cela n'est
pas si simple que l'on le croit, et que l'on ne
le voit, mais qu'il y a bien une autre difficulté
dans la résistance que présentent les parties
en effet pour un chirurgien ou pour un
chirurgien un peu plus expérimenté de sorte qu'il
ne présente plus la résistance ordinaire
au fer si est facile de l'exécution, mais
difficile qu'il y a dans une exécution, de l'empêcher
dans l'articulation de la méthode de l'opération
et la méthode veut que l'on fasse l'opération
en deux fois, après qu'il y a eu dix ou
les deux fois des ossements qui sont dirigés
avec l'assistance de l'humaine et de l'art
le ligament capsulaire, de telle sorte qu'il
l'on puisse faire l'opération de la tête de la tête
général de l'opération et qu'il y en fasse
la résection, qui une fois faite au replacer
l'os en contact de la partie opposée qu'il
doit être.

C'est la première fois, pour une
à été faite à l'articulation du bras avec
l'avant bras, laquelle n'a point été avant
l'opération de l'articulation du membre
le croit au premier abord, qui se
trouve rapportée par M. Moreau,
chirurgien de l'hôpital de la Charité, lequel dit
qu'il a pu la faire également pour
la jambe et le pied, qui l'a fait voir
et prouver de M. Moreau. Voici et l'opération

qui m'ont paru encore être possible 1799.
Du vivant, ce qui ne tient à la disposition
des os, comme nous l'avons
dit en parlant des tumeurs blanches.
Malgré ces observations, attentes
par des personnes dignes de foi, on ne
les pratique cependant point, même au
lieu ou la chirurgie brille d'un certain
éclat, en ce qu'on préfère celle de tuer le
membre, qu'à fonder sur des résistances
qui n'ont que ce qu'elles sont une des
applications les plus délicates à exécuter et
qui sont les plus suivies de succès, qu'elle
ont été plus souvent réussies qu'on ne
croirait au premier abord.

C'est à la réssection qu'on doit rapporter
les expériences que fit M. le Chassaigne dans
ces derniers temps de nos arts, le quel
enleva à quatre ans seulement une portion
de l'un des os des membres, dans une certaine
étendue. Soit par la continuité, après
quelques jours réécrit en maintenant en
contact les deux extrémités des fragments
cela réussit et même toutes qu'il fallait
tenir dans le repos. Il a également tenté
à d'autres de l'un enlever des os même
entiers, mais cela n'a point réussi, il a vu
que les os se guérissent tout à fait comme
en ossement plus vite faite, malgré la
résistance qu'il faut pour la guérison.
de suite, puis qu'il faut faire que cela
réussisse mieux que l'un et d'autres en
lui fait mieux garder le repos et

189 place dans une position qui avertisse
du Diastasia

Sans avertissement du pas leu entrant des
entorses, mais nous l'avons dit.

Un homme ainsi en état dans laquelle
surfaces articulaires ne se trouvent point
affermies comme elles devraient l'être, ce qui
ne tient qu'à la distension des ligaments
qui les affermissent. On le remarque dans
les articulations par imputation avec les
dents, dans celles où les os ne sont que
juste à poser comme pour les os du bassin
puis ensuite dans celles qui jouissent de plus
certaines qu'on les voit pour les os de la
bras intérieurement, de la jambe.

1^{re} quand à la distension des dents, cela
produit une gêne que par conséquent partiellement
de la manœuvre singulière de la marche, qu'
on les tient plus alourd aussi ferme comme
elles devraient être, sans qu'on n'ait remarqué
en rien passant, pour les affections qui les
attaquent.

2^o pour les os du Bassin ou à accessoire
des os du Bassin 97 ff chez les femmes après
les couches, de telle manière qu'elles ne peuvent
plus marcher dans cet état, ce qui est dû
qu'à la grande distension des ligaments, au
point que les os ne se trouvent plus solidement
articulés, de sorte qu'elles s'accablent en marchant
au moyen d'un remède au moyen de fumigations

regre eussies d'aint au state tout la 187
surface du bassin, solo le quel any appétit
des camprissas qui s'en trouvent indubies,
que l'on méritait avec une cervelle
qui l'entend par tant. Il est des cas ou
l'on est incertain sur son existence.

30. Le Diastasis est bien mieux constaté Des os de
par les os numéros supérieurs et inférieurs, surtout des
qui ont lieu dans le cas d'achute, de même que
contre et s'accompagnent les entorses des os de la jambe.
qu'ils il en diffère que parce que les ligaments
de transport plus distendus, cela est arrivé
par les os par les os, surtout par
l'avant bras, que l'on peut faire exister
des mouvements d'abduction de l'os scapulaire
et au radius en des ossements. Il est aussi
accompagné d'entorse, spécialement par les os
du pied. Il y a peut être d'autres mouvements
et d'entorse, de faire tenir le membre.
dans l'immobilité de l'os de la jambe.
dissiper le gonflement qui peut exister
et d'entorse, d'écarterment des os entorses.
Raccourcissement représenté le l'os de la jambe
arrivent au paravant.

De l'Anquilose.

On donne ce nom à une affection dans
laquelle les surfaces articulaires se trouvent
dans un état qui ne permet plus aux os
de se mouvoir librement les uns sur les autres,
de manière à être en quelque sorte soudés.

282 Il y a deux parties dans toutes les articulations
 ce qui les compose. Les uns, ce sont ceux
 les deux exemples de deux personnes
 qui en font affecter à peu de distance
 l'une d'autre il y a deux ou trois ans
 les quelles ont toutes une articulation
 dures, de toute sorte qu'elles ne puissent
 exciter aucun mouvement, c'est à dire
 qu'il y en a une qui est une même pelle
 de la mâchoire, des quelles elles ne peuvent
 qui n'auraient été produites par une
 l'humidité. Quant à l'ancien, de même
 s'exprime.

On les distingue par rapport à l'état
 de la bouche les articulations en vraies
 et fausses, ou bien parfaites et imparfaites.
 La distinction de l'articulation est en deux espèces
 qu'elle se résout en deux. L'une est de la nature
 ce qui nous paraît plus ou moins de la
 de l'articulation. Les autres sont de la nature
 pour celle dans laquelle il y a difficulté de la
 des mouvements, puis de l'articulation également.
 Les causes qui y donnent lieu sont les
 causes mal redites de cette sorte que les causes
 trouvent plus dans la position qu'il y a de la
 occupant les ententes le défaut de mouvement
 longtemps, prolonge les fractures, la cause
 des muscles, la partie de la partie de la partie
 de l'articulation au défaut de mouvement
 Signe du membre qui est le siège, ou bien
 à l'articulation plus ou moins grande
 l'articulation de la partie qui est la partie de la partie

qui en a déterminée l'extension des. 183.
Cartilages, l'oppression la plus ou toutes
des fois que la nature résisterait
le phosphate calcaire qui peut être
qu'elle y a déterminée, il est de même
pour d'autres causes.

Comme les fois que l'angine se porte
à son haut degré, on en peut la guérir, l'écoulement
qui suit la cause qui y a donné lieu
au lieu d'écoulement qui disparaît, au
lieu de plus en moins de temps, étant
résultée par l'opération des os, c'est à dire qu'il
se trouve des exemples rapportés dans les
ouvrages chirurgicales de Desault et de Petit,
lesquels ont parvenu à réduire des luxations
qui ont duré de deux, trois, quatre mois,
plus ou moins et même un an.

La faiblesse angineuse tient à un état
rupture des ligaments au dos du cou,
qui se trouvent comme rétractés, de manière
à ne permettre qu'une simple rigidité dans
les mouvements de la tête. Dans ce
dernier cas, à laquelle on se trouve
distendu comme dans un état d'urgence.
Il faut dans ces cas pour qu'ils les
étaler, ramener petit à petit la tête
à son état ordinaire, si ce n'est
par une fois qu'on y aurait même
un employé des moyens qui puissent
le tenir, ainsi fait, et qui auraient le
pouvoir de la ramener à son état
naturel. Il est cependant des angines
qui peuvent devenir graves, en ce qu'elles
sont une circonstance il est très-painable au fond de

183 Synovie que dans l'état actuel.

Ce sont toujours les articulations qui
correspondent du lieu affecté, que
sont touchés les anguilles, et qu'il arrive dans
les fractures, que l'on se plaignait par
l'effacement du sue osseux dans l'articulation
ce qui n'est point cela n'est pas qu'à la par
qui prennent les parties musculaires qui
constituent ces ligaments, les membranes
synoviales, le périoste. Il faut remar
quer de la différence imprimée des mem
bres membres de telle sorte que les parties
représentent leur simplicité naturelle, ce qui
est suffisant, mais d'autrefois point, de
manière qu'il faut avoir recours aux
applications topiques, que l'on a remarqué
produire de bons effets, comme les bains
les inaltérables les Douche, en se servant
de l'essence des eaux minérales. Les
de certains autres de même que celle de l'eau

Reformation de la charpente
animale.

Forme en l'absence de conformation, l'est
est qui porte sur les parties dures, ande
charpente animale, d'autres sur les parties
molles. Dans les examens, l'usage de
points de l'usage, 1^o Il en est qui par
l'usage de l'usage, 2^o d'autres touchés à
l'usage de l'usage, 3^o d'autres qui par
l'usage de l'usage, 4^o d'autres qui par

l'usage de l'usage, 5^o d'autres qui par
l'usage de l'usage, 6^o d'autres qui par
l'usage de l'usage, 7^o d'autres qui par
l'usage de l'usage, 8^o d'autres qui par
l'usage de l'usage, 9^o d'autres qui par
l'usage de l'usage, 10^o d'autres qui par

Si ce n'est de la conformation, d'une des monstruosités 284
est ainsi qu'on voit des enfants naître
avec deux têtes. D'autres fois comme
avec elle l'un contre l'autre de manière
que sans cela n'auraient fait deux, et par
à encore qu'un a deux pieds. D'autres
variétés, qu'on ne saurait pas énumérer,
peuvent être vues tant qu'on veut multiplier,
ce qui fait que nous en parlerons pas, de
qui ne servent à rien, puisqu'ils ne
vivent pas. Dans ces différences, nous dirons
qu'il y en a qui ont leur cause commune, et
par pied, dans le nombre est excédent,
au lieu que la quantité n'est point
ce qui fait que dans le premier cas, l'un
est obligé de retrancher celui qui
excédent; dans toutes autres, il n'y a plus
différence que ce qu'on appelle pied bot.
On admet ainsi un état dans lequel
les enfants ou les personnes qui sont affectés
au pied tartiné en dedans, qui sont
aussi en dehors, qu'on appelle pied bot
plus rare, ce qui les rendent pour les
distinguer de l'autre, appelant ainsi
le premier cas Marie, tandis que le second
est en dehors Valgus.

Il y en a qui croient que cela a une cause
de ligaments, de la manière qu'il en a
rétraction, ce qui n'est point, de la même
inspiration des parties, qui se séparent avec une
au point de se rapprocher des surfaces articulaires
des os, non point de l'articulation avec
le tibia et le péroné, mais bien du premier
avec le calcaneus et le scaphoïde, qui

285

se trouvent dans un état particulier d'humour
ils arrivent qu'ils l'ont l'habitude
Signes Il est facile de reconnaître cette maladie
à la simple inspection des parties affectées
si le pied est dur de dedans, l'infirmité
suffisamment externe tandis que l'infirmité
liée par conséquent il est en dehors.
Moyen Un grand nombre de images ont été
imaginées pour y remédier, il y a même
des talismans anglais et français qui disent
arriver, lesquels ont été plusieurs années
multiples, de sorte que sans même qu'il
le fallait, allaient jusqu'à y attirer une
copie de char latéral, qui s'humilient
les appliquer pour soustraire à l'humidité
la main. Tout est donc construit pour vaincre
l'incapacité de meilleur traité pour vaincre
toutes celles qui ont existé que le même
à l'armée. Scarpa, qui a été transcrit
et H. Rénique, qui a eu aussi l'intention
d'en faire un qui se passe avec un
examineur petit à petit. Le pied a un état
naturel, qui s'en fait qu'il y est
maintenant. Il est construit de manière à
faire le pied, qui va se fixer à la jambe
ou au moyen de ressorts.

Car il est une très chère - que l'on
est pas dans le cas de l'acheteur pour
difficulté de l'œuvre, mais par la charité
à l'égard il faut l'acheteur de l'œuvre par
autres moyens qui l'acheteur le pied et
parviennent à produire l'effet que l'on
se propose.

Il arrive g^o que lorsqu'on veut faire ^{l'éducation}
guarir les enfants trop bombés, on s'efforce de
cubert de g^ores mais les g^ores P, J, & J^o sont b^otem^o
q^o alors ils ont point assez forte p^our le par la marche
pauvres; ils marchent sur le ^{trousser} ^{des enfants}
de l'enfer, au lieu d'en l'interne alors
dans ce cas il arrive approchant la même
chose que dans le pied - bot, ce qui fait
suspense que les g^ores se trouvent déjetés
en dedans, puis qu'ils ne peuvent plus marcher.
Il faut alors lorsqu'on s'en aperçoit y
remédier tant de tristes enfants & surtout
des sautelles dont la semelle de la p^o plus
épaisse du côté opposé à celui auquel
ils marchent au lieu celui vers lequel
il se trouve déjetés qui cela diminuant
si l'en juge à propos petit à petit alors
ils guérissent.
Les g^ores de différentes se partent - ^{différentes}
aussi g^ores. La p^o est la p^otrière ^{de la p^o de}
sans celle du col, cela arrive assez souvent
chez les personnes qui ont la vue basse qui
en passant voient d'une manière éloignée
après avoir le col, ce qui arrive fréqu^o
chez les enfants au lieu d'en marcher par
une mauvaise habitude qu'ils ont de
de la fléchir. Il faut aussi qu'on s'en
aperçoit les g^ores lire Deduit, à l'âge
leur une espèce de p^otrière ou les faire
travailler également dans cette position
sans partie les p^otrière au visage auxquels
ils se livrent. Il est même pour les g^ores

leur fait porter des colles d'une
certaine consistance, au lieu même de
surpe qui pendent des apophyses, d'une
à l'autre lorsque s'écroulent la tête
quand cela se termine, cela était d'après
fréquent avènement, qu'au lieu de la cause
de Maladie on étroit les femmes de parties
des corollas de balins, ce qui fait que
étaient pas aussi libre qu'ils étaient, qui
ancien l'ancien la partie plus large
pas qui ont l'ancien d'une autre plus
étroite, l'ancien d'une autre plus
à l'ancien, lesquelles causent une espèce
de cela ne tenait que parce que
se trouvant gênés, alors elles d'ancien leur
des opacités d'une autre, qui ne pouvaient
ancien l'ancien d'une manière continue sans
prouver la tête. De cette espèce alors
d'ancien la Maladie. Il ne s'agit
d'ancien d'une autre que de faire qu'ancien
les d'ancien et de mettre à l'ancien des
indistinct d'un plâtre qu'ancien qu'ancien
redonne la col de la tête. Si l'ancien
Le Bassin peut encore dans certains cas

Locand
23 Sauton

présente des Différences qui pendent
de la manière dont on tient les enfants de
les bras, ce qui fait que dans certains cas
il présente plus d'ancien de devant en arrière
que l'ancien d'ancien de l'ancien qu'il se trouve
appetit dans le d'ancien cas, il faut par
ancien d'ancien que l'ancien d'ancien
qu'ancien la manière d'ancien que l'ancien

parties ainsi les enfants.
Il est qd de vers de conformation qui sont accidentels
provenant de la nature. La conformation, est ainsi que
l'est pour certaines personnes qui ont tous
les membres mal conformés qui a lieu
le plus souvent par une cause rachitique.
Est ainsi que la voit chez certaines personnes
chez qui l'affection se trouve également sur
la colonne spinale qui se trouve courbée
de manière à produire la gibbosité, qui se spinale on
trouve le plus ord. au milieu du dos, de gibbosité
dorsale que les personnes se trouvant courbées
en devant. D'autres font la courbure antérieure
du côté, de sorte que la poitrine est tournée
dans quelques cas toute rebattue d'un côté
tandis que l'autre se trouve agrandie plus
que d'ordinaire. Il est à remarquer malgré
cela, cependant que les fonctions de la
respiration ne se trouvant point troublées
et qu'elles se font comme d'ordinaire,
tandis qu'on croirait le contraire, il
en est de même pour la rate qui se
trouve qd s'élève à différentes hauteurs
de l'abdomen que l'on croirait comprimer
ainsi que le tractus utérin. Il n'en est pas
de même pour le Bassin qd s'élève
traverse affectée parce que durant dans
pareil cas l'écoulement ne peut se faire
comme d'ordinaire, ce qui est très
estuet à savoir dans qques cas parce
qd au lieu d'être droit il s'est courbé
de sorte que l'on puisse voir que certaines
qui en ont affecté font pour cela beaucoup.

du Bassin

288 Étendue du Bassin par le pape en juger
par examiner les membres; l'effet de l'organe
le rétrécissement ne se trouve qu'en diminuant
est presque toujours d'unelli affecté,
le plus petit correspond.
C'est qu'il y a l'âge de cinq ans
que les ligaments qui lient le Bassin
sont encore en temps au même état.
Ensuite, Des fois il arrive que l'effet
porte sur ce qu'on nomme le grand Bassin
tandis que le petit n'est nullement affecté
d'autrefois l'affectation a lieu, ce qui s'explique
par ce que j'ai vu en d'autres endroits, où on a vu
dans le Bassin l'affectation, c'est à dire que
bien a vu le petit Bassin n'est que
étendu d'un pape, tandis que dans d'autres
il s'en trouve presque rien. Différence absolue
dont on a vu l'importance de cela
prouve que l'affectation du Bassin peut être
l'effet de l'affectation du Bassin par le pape
l'affectation qu'on a vu en d'autres endroits, il n'y a
pas de plus fortes que lorsque c'est
l'affectation postérieure, en de qu'on a vu la partie
de la tête qui y correspond le plus ordinairement
qui est la plus considérable, puis que
dans l'état ordinaire c'est la tête qui est
qui se trouve dirigée du côté du dos
tandis que c'est l'affectation qui est en dessous
Des membres d'autrefois l'affectation se trouve par
inférieure par les jambes, qui se trouve éprouver
les en fait de manière de l'affectation.

On en a peu encore assisté au sein, qui grand 199
cela arrive produit l'ane inclination d'un
côté; de l'autre manière que cela arrive
par le Brachio car nous l'avons dit, l'autre
la fait que l'ob a pûnt en lui de l'autre la
tête droite; qui donne lieu à une
route entrecroisée de la colonne spinale
et musculaire. On a occasion de les
remarquer également au moins et au plus
puissamment, au sein de la tête de l'adulte.
Des Maladies de la vie organique, l'altération
des Maladies de Conformation pour
les appareils d'organes

Lors qu'on commence à laborer par
l'appareil digestif, lequel est susceptible
de l'ob de sens de conformation, mais dont
nous nous occupons point de tant en
ce qu'il y en a l'ob qui appartient à la
colonne vertébrale que nous de la l'ob, de
l'estomac, des intestins, l'ob de l'ob, de
Rectum dont nous nous occupons de
même que nous les parties de l'ob
d'ob qui l'ob l'ob de l'ob
les Maladies focales, quelques maladies
autres natures

Superfétation de la Bouche.

Il arrive qu'il que les enfants en venant
au monde ont les lèvres réunies de sorte
à ne permettre aucunement le passage
des liquides, et de solides, qui l'ob
présentent encore de l'ob, l'ob
ce qui se fait d'après cela l'ob
incomplète et incomplète, à cause

Des maladies
originelles

qui se trouve d'autant plus grande que
l'affection est plus considérable. 192

Le moyen de remédier consiste dans
une opération qui se fait faire. On a
varié sur le point de la pratique, les
praticiens ont dit qu'il fallait la faire
le plutôt possible, parce qu'on la faisait
on prévenait de mettre l'union l'adiffinité,
et quand ailleurs la division ne s'écarterait
pas si grande. D'autres au contraire ont
préconisé qu'il fallait attendre
que l'enfant ait acquis un certain
caractère convenant à son état et qu'il
soit raisonnable pour en faire
l'opération. Ce qui commence par
favoriser la consolidation. L'opérateur
voici ce qu'il conviendrait de faire, toutes
les fois que la division n'est point
considérable, qu'elle n'empêche pas que
l'enfant tette, on doit attendre, lorsque
le contraire a lieu, que l'enfant se donne
les forces nécessaires, il faut en venir à la
l'opération qui empêchera que l'enfant
l'enfant.

Opération du bec de lièvre consiste à la
rétablir la continuité des lèvres, naturellement y avoir
d'abord la lèvre supérieure, ce à quoi on parvient
en mettant les bords de la division en contact
immédiat. Mais il faut pour cela qu'ils soient
rafraîchis, car s'ils ne le sont pas ils se réuniraient
point de sorte qu'il faut en faire l'opération
attendu qu'ils se réunissent requièrent de la
combinaison des lèvres, d'ailleurs
que ces dernières.

Le 27 Septembre

798 Il y a en différents moyens pour cela. L'un
est d'appliquer des emplâtres de plâtre
Emploie des gâteaux de plâtre mouillé et approchant analog
Chaque gâteaux qui sont au lieu de tout autre enduit
ou de plâtre qui, croyant suffisant pour cela; mais il
a observé qu'ils se courbaient point, pour
point de faire que la plaie restât tendue
paraison de l'usage d'un autre et que d'ailleurs
ils peuvent supposer. L'autre l'un peut dire que
quand bien même ils seraient d'acier, ils ne le
feraient pas bien, à raison de leur forme
courbée, de sorte qu'ils laisseraient une espèce
de rigole au milieu de la plaie, ce qui serait
très-différent. Un second moyen d'appliquer
l'usage de la plaie, est de faire la réssection
au moyen d'instruments tranchants, soit de
soit de l'acier, soit de l'usage à réssection pour
bien et pour l'autre alternativement. On dit
que depuis l'usage du plâtre de Bistouri,
ce que disant au de l'acier machant, tout
les bords de la plaie mais maintenant on
presque repren de tout cela, au lieu
l'autre que l'on a occasion de le remarquer
et l'on réunit sans faire toute autre chose
D'ailleurs en supposant que l'on fût
usage du Bistouri, on ne peut s'en passer
tout seul il faut toujours d'un gâteaux
chose avec soit de cette manière
de point d'appliquer que l'on place sur
la lèvre et l'arcade d'ailleurs on bien
de pincer cette corbeille sans que
seul l'usage et que de plus au lieu
pas aussi vite la réssection, en observant

que les deux incisions que l'on fait
doivent servir à angle aigu lesquelles
doivent servir à détruire le pôle médullaire
de sorte qu'il n'est plus possible
d'unir.

Les Bords divisés il faut ensuite tâcher
de mettre en contact, ~~ce qui est~~ de la suture
au moyen de l'emploi des quatre sœurs
dont on se sert dans les plaies. Tabard en
a proposé la position, mais elle ne peut
être mise en usage. Les Bandes et les agglutinatives,
mais elles ne sont que moyens accessoirs
de même que les Bandages dont on se
sert à l'emploi de la suture, qui seule
est préférable dans les plaies. Cependant
Leprieux propose d'en user y suppléer le
Bandage unissant, mais qui ne contribue
pas à ce qu'il ne peut être appliqué à
la contraction des muscles. Après donc
la suture c'était-il déterminé à faire usage
d'un point de suture entrecroisée à
la partie inférieure de la division, dans
les derniers temps.

La suture dont on fait usage maintenant
est l'entortillée, qui se pratique en faisant
passer des aiguilles dans les bords de la
plaie sur les extrémités desquelles on
applique un fil que l'on entortille sur
de petits morceaux d'appareil. Des lésions
de la plaie on s'est servi pour cela
d'aiguilles de différents formes mais
maintenant on se sert d'un fil qui se fait usage
sans l'usage de l'aiguille, de l'aiguille, qui
peut être insérée d'autre, même de

198 Pinglois La matrice également avec les
quelles on les fait à l'usage, au lieu
fait d'or, d'argent mais ce sont celles-
d'acier d'acier d'acier maintenant, d'acier
l'une des extrémités se trouve un peu appu-
vibrant, de quelle on mettrait sur l'extrémité
de charpie, mais que maintenant l'air d'acier
avec de petits morceaux de linge qu'on
place dessous les extrémités. Au cas où
maintenant de l'extrémité qu'il y a de commun
pour introduire les aiguilles par la partie
inférieure des bords de la dissection, parce
ce la faisant pas il peut arriver qu'il y ait
point la même ligue inférieurement, comme
cela est arrivé à l'usage qui le faisait
commençant par en haut. Ayant attaché
par en dessous la peau et les bords
des bandes agglutinatrices et les bandes
unissant, qui ne sont pas les mêmes que pour
les plaies de même, aussi il y a des plaies
faites d'agglutination, de celle, comme nous
le verrons.

Secunda de suture Il y a des moyens opératoires qu'on doit
se servir au même usage avant que d'y arriver
du lieu de la suture, c'est ainsi qu'on emploie
moyens avec avantage en bandage unissant pour
opératoire manutention réunis pendant quelques jours les
bords de la dissection, malgré que l'écoulement
qui en résulte ne dépende point de cette
dissection, il en est de même pour les
écoulements agglutinatrices, opératoire habituel ainsi
les Malades et qu'il est souvent moins qu'on
de la présence de la suture. Il est égal
bien de détruire tout le pus qui se trouve

exercer les enfants, afin de les élever, 198
grâce, pour qu'ils ne dérangent pas l'apprentissage,
mais de leur apprendre à écrire, d'écouter
autour comme ils le font les deux premiers
jours qui précèdent l'opération, avant
laquelle on leur donne également un
légal, et cela pour l'affaire d'écouter
après qu'ils l'ont faite.

Les aiguilles courbées qui doivent
servir à appeler d'écouter et de poser, qui
sont des aiguilles au cui, et qui
servent lorsque c'est de lui dont on se sert,
des aiguilles; des fils de petites
compresse pour mettre dans les patentes
des aiguilles; des fils pour mettre dans
celles-ci et d'autres; des aiguilles de linge
pour les langes, une bande qui
doit servir à faire le bandage, puis deux
compresse longues qui sont destinées à faire
celles-ci. Il est à observer que les aiguilles
ne sont point employées en nombre au point
qu'on les faisait autrefois, et qu'on en
place à chaque ligne de distance, et
étaient unis, et sont maintenant en
un seul plus usage qu'une au-dessus
des enfants et de trois au plus pour les
adultes.

Il faut faire pénétrer dans les bords
de la plaie, ou par la racine de côté du
bord, et de l'autre et l'en faire
sur le gauche; pour cette fin, il faut

299 L'extrémité du bord droit de la main
gauche du côté de celui-ci et l'autre fait
pénétrer les aiguilles ainsi de de l'autre en
dedans, mais de telle manière que ne doit
point la membrane sanguine de la lèvre
qui parvient au bord droit du intérieur
de l'autre portion de la lèvre, on y fait passer
les aiguilles également, qu'on a soin de tenir
celles de tenir à une distance plus éloignée
du bord et du même côté, avec la même
attention. On pourroit le faire si l'on n'avoit
encore des petites pièces dont nous avons
parlé. Il faut avant tout avoir en soin
d'éviter de faire les malades dans une position
convenable, si ce sont de grandes personnes
on les fait assise devant soit face à soi
tandis que si c'est un enfant, on le fait
tenir sur les genoux d'une personne. On
place qqs. avec de l'autre l'autre doit sortir
et pénétrer les aiguilles, après de ce point on
On doit toujours commencer la section
d'abord à la division du côté droit en premier
l'un que l'on maintient avec la dextre et l'autre
et le pouce de la main gauche après qu'on
passe au gauche, qu'on maintient également
de la même main si ce n'est qu'elle doit
se trouver plus portée à gauche. Les incisions
doivent être tellement faites qu'elles se rejoignent
à l'angle d'angle d'angle du haut, de manière
à empêcher tout le petit tubercule qui
se trouve qqs. Il est inutile de faire une
compression des lésions, facile, on ne
l'aient comprimée, on pourroit par

Supposons à ce qu'il survienne une hémorragie
dans les autres artères qui s'ouvrent le
cœur également, telle que la sous-orbitaire.

On fait on introduit les aiguilles en
commençant d'abord par appliquer l'inférieure
que l'on fait pénétrer dans le cœur et d'autre
malade en venant diriger la pointe de
bas en haut et de dehors en dedans en
faisant attention pourtant qu'elle ne traverse
pas le membre une queue et qu'elle
se dirige à son côté interne, l'aiguille
étant parvenue on la fait pénétrer de
nouveau dans le cœur gauche, en la
dirigeant en deux insures, au bas le plus
ainsi qu'à la fin de l'opération de la grande
petite tumeur qui se trouve à la base
supérieure naturellement.

Il faut introduire au place sur chaque
artère une aiguille en fil de manière
à ce qu'elle soit dans le plan, que l'on donne
desorte à tenir à l'aide de deux
extérieurs, qui se tiennent dans une direction
droite, de sorte que l'aiguille se
trouve dans une direction horizontale. On
fait l'un appliquer dans un second fil de
la même manière que pour le premier, et
ainsi que l'on cultivera, puis que
l'on a avec lui que l'on introduit les artères
des aiguilles, puis on les dirige de sorte
que les deux aiguilles se trouvent au bas
mais l'une remonte de bas en haut, dans
celles qui l'une l'autre, il y en a en les
à l'extérieur de manière à former un petit
de l'apophyse, et de sorte que l'autre se trouve
à l'extérieur de sorte qu'elle se trouve dans l'insure,
en passant de sorte qu'elle se trouve dans l'insure,

199

de sorte toujours à entretenir les bords
de fibres avec le même appliqué. L'un
l'autre que l'on continue de faire en même
manière depuis et l'on finit par la herse
Cela fait au place des petits morceaux de
linges sous les coiffures des aiguilles, on met
dans la remède des bords, de sorte à couvrir
la plaie, puis un petit emplâtre aglutinant
pour en affermir la réunion, qui peut être
dans certains cas pour en favoriser la réunion
qui étant l'on applique de suite la même
par dessus toute l'appareil pour l'étendre
plus ferme, en commençant à en appliquer
le bout l'un le front, que l'on fixe par un
bande circulaire, puis l'on finit par un band
la tête supérieure, et ainsi en descendant de
bandes finies à son milieu, qui l'entourent
sous le nez, parce que la précédente distinct
par devant est perceptible, en ayant fait
toute fois pour déterminer la réunion des
bords de la plaie de place de l'entente
linge sur chaque joint au paravant, sur
laquelle elle repose, et qui ayant percus
le chemin qu'elle doit faire, alors la fin
au moyen d'une épingle.

Comme l'on voit souvent qu'on applique
sur les jointes plusieurs bandes, au lieu
de l'un et la grande de chaque côté, avec
cette l'entente, qui l'entente de la
le moyen et que l'on fixe au bout
de l'entente, qui doit toujours en être
la même.

Comme se faire de l'entente au la place dans la
coudure de la grande de chaque côté, avec
cette l'entente, qui l'entente de la
le moyen et que l'on fixe au bout
de l'entente, qui doit toujours en être
la même.

704 De l'oppression à tout ce qui paraît les
distinguer

C'est ce que nous venons de dire est
parfaitement applicable au cas de lèvre
simple sans accident, mais il faut faire
attention qu'il paraît en l'absence alors
dans ce cas il faut lacher de la simplicité
et le qu'on a instantanément par suite de l'absence
qui paraît y exister, une hémorragie
par la division des artères qui sont le
rendre à la terre supérieure, alors dans ce
cas il faut avoir soin de faire cracher
les Malades, afin qu'ils évitent point de
sang qui ne dans leur bouche, et qui peut
les suffoquer.

Seconda. Ce que nous avons dit jusqu'ici, est applicable
28 Septembre qu'un cas de lèvre simple, mais il faut
se faire qu'il fut double, comme cela est
Hoc de l'un dans ces circonstances, alors il faut se
lèvre double conduire différemment suivant qu'il est
est plus ou moins considérable. car il
est si petit, il ne faut d'autre chose que
que de se conduire comme quand il est
simple, qui est différent de celui de l'absence
qu'une petite portion de lèvre, ou en
compréhension après qu'on en réunit. - Avant
de tenter et il est plus considérable, d'ailleurs
à dépendre en que toute au contraire
la lèvre, alors on se conduit différemment
d'abord, vaillant et après d'autre que la lèvre
l'opération au bout, temps, est adipeuse
commence à réunir d'un seul côté, de la
même manière que pour le simple, puis
qu'il est réuni au point de suite à la

Cette manière est maintenant abandonnée, 292
en ce qu'on remarque que les malades ne
suffisent pas plus. Lorsqu'on se fait des
dents à la fois en gomme verte, type pour un
seul. D'ailleurs en supprimant qu'on veuille
le faire, on ne saurait pas précisément
l'intervalle qu'il faudrait mettre entre chaque
opération à l'insu du patient de qu'il
faut que l'usage lui-même a fait, qu'après
l'espace de trois semaines, un mois.

En supprimant qu'on suppose, voici comment
qu'on se comporterait, au commencement.
D'abord par faire une résection des dents
de la plaque de la même manière de chaque
côté, qu'on passe le simple, qui se réunissent
également à angle aigu dans les dents
fentes. Cela fait on prendrait des aiguilles
que l'on introduirait car il a été dit, si
ce n'est qu'il y a un peu de la lambeau
qui se trouve résigné de chaque côté dans
la position, on se sertant d'aiguilles un peu
plus longues que précédemment. Cela fait
on se comporte fil a été dit.

Il est à observer que la simple et la
double peuvent être compliquée d'adhérence
avec la corde dentaire, alors si la corde
existe, il faut dissuader la lèvre après
un instrument tranchant, qui étant
en place un petit angle entre afin qu'elle
ne repousse pas, que l'on doit faire
dans le repousse au lèvre la apertur.
pour se faire entendre qu'il y ait une
provenance de l'épine ~~modèle~~ antérieure
au lèvre simplement une éminence

seuse, alors il faut la détruire, ce qui est
pas extraordinaire, rare de voir, car le rhyssus
Lafage et chepout qui sont en accoussion
d'un rhyssus. Enfin il peut se faire qu'il
y ait un rhyssus dans le palais
et palatine, ce qui peut physiologistes ont
puent expliquer par le défaut de réunion
dans cet endroit. Plusieurs parties du corps
dont on suppose l'union formée, mais qui
paraît pas trop être déterminée par là.
Il n'y a rien à faire pour empêcher les
il n'y a rien à faire pour empêcher les
opération, parce qu'il disparaît
peu de temps après que la réunion d'un
bucc de lièvre est faite, ce qui peut gêner
après les enfants qui le portent, pour
la mastication et la déglutition.

La fente au fillet.

Un membre ainsi en état dans la quelle la
langue présente à sa face inférieure, un
éplis de la membrane muqueuse qui la tapisse
plus long qu'elle s'étend, lequel gêne à
ce que l'enfant qui la prend aussi bien tant
est possible.

Cause. Indignement de ce que nous venons
dire, il peut se faire que cela tienne à d'autres
causes, et que par la nature trop serrée
des membranes de la personne qui donne
à l'enfant, de sorte que l'enfant ne peut
le saisir par un enfant de lait, ce qui
peut arriver chez une nouvelle accouchée
aussi peut il provenir cela que la femme ait.

laine d'auccas d'atténuer les premières fois 204
un enfant qui se déjà tait, afin qu'il
la déglutisse qu'il déterminera ainsi au sein
de lait s'y accoutume, de même pour le développement
Cherchez chez elle où il en sortit presque pas
possible entre autres, enfin il faut faire
que cela dépende de ce qu'il faut ne plaira
pas bien la langue dans le sein.

Ainsi d'après cela pour reconnaître si
un enfant a le lait, il faut arriver à tout ligament
acquiescer à dire, de qui est facile à
reconnaître au rapport qu'on nous fait en
interrogeant les personnes. D'ailleurs l'enfant
si le lait vient tout de suite pour arriver tout
fait savoir si la chose existe ou pas tant le
doigt sur la langue de l'enfant et y passant
quelques temps, le lait s'il est épais
peut taiter, tandis qu'il se coupe si la
chose existe. Il faudrait faire que l'enfant
éprouve de la difficulté de faire succion
le doigt, alors d'auccas ou de la tétine
de l'enfant, afin de le faire bailler et peut-être
espérer par la bouche.

En supposant reconnu, que cela ne dépend
peut-être point de l'angine, il suffirait d'empêcher
d'y remédier en le coupant au moyen
d'un couteau et d'une bande causée qui présente
une plaque fendue à son milieu pour
permettre l'air frais de passer. Il faut aussi
soigner toute fois lorsqu'on le coupe, d'en
puiser avec une arête parce qu'il
en résulterait une hémorragie, de laquelle
l'enfant pourrait périr, au moyen de
la suffocation qui en résulterait. Il faut

225 à avaler le sang, ce n'est qu'une question de
de l'artere ramille que l'on divise et men-
elle, attendu qu'elle se trouve garantie au
moyen de la petite plaque. Puis ensuite on
prendre garde qu'il ne parte la langue
arrière, lequel produirait le même effet. On
le rapporte petit l'osier par deux fois. Il faut
venir ensuite de couper l'artere Ramille
porter la pointe des ciseaux du côté de la
Si malgré toutes les précautions qu'on a
avancé, il arrive qu'elle se divise, il faut
tacher que l'enfant ne suce point, pour
éviter qu'il n'aille le sang qui est resté, et
qui le suffoquerait. Il faut aussi qu'on ne
tache de remédier, ce qu'on fait au tant
l'artere au moyen d'un fil de soie que l'on
porte dessus, qui est le meilleur moyen de
dans une que les phlores englobent, qui
suffoquent le sang des parties, au moyen de la
petite escarre que l'on établit d'abord sous
Il y a bien encore la bourse de Sibragne
la petite bourse de boucane que l'on
insère, qui se fait en passant une grande
de cet arbre et l'on s'applique de linge, lequel
ne le laisse point. Il faut aussi pendant
la journée, ainsi que celui qui est que la
personne chargée de l'enfant promène le doigt
dans la langue pour empêcher que le sang
ne contracte d'habitude.

Quant aux remèdes de la langue
avancée par les dents, par suite de la division
très grande du fil, cela n'est point
connu de tant de praticiens, il y en a qui

lui, en ce que disent-ils, on a puient mieux 206
 en occasion de le remarquer. Depuis lui
 exprimant il est de fait qu'il y a des maigres
 avallent comme on l'edit le bon langage,
 mais cela ne peut avoir été observé
 en France, car on n'a point à quelle fin
 ont eu indistinct de le faire pour le
 la mort. Il faudrait si bien s'en appercevoir
 engager les parents d'enfant à prendre
 garde à ce que le dernier ne porte la langue
 marquée de parties de la langue
 les fois qu'ils s'en appercevaient, et de la
 fin - ils le peuvent.

Les autres Maladies de la Bouche sont
 de la langue ou quel on ne peut
 de la langue, de même que l'écoulement de la langue
 qui est qu'il double; quand aux autres affections
 elles se rapportent à celles des lèvres, de la
 langue. Les lèvres qui sont composées de
 téguments, d'un tissu charnu et de la membrane
 muqueuse, sont susceptibles d'être affectées
 d'ulcères, de ces tumeurs, de l'herpès,
 de tumeurs varicelleuses, de cancrs, d'aphtes.
 La langue de l'écoulement.

2e cun du
 3e 1re partie

Affections Des lèvres
 Des Gencives.

2e Des Maladies
 organiques

Au nombre ainsi de petites fentes qui
 surviennent sur les lèvres et la membrane
 muqueuse qui les recouvre, les petites lèvres
 arrirent finissent plus ou moins profondes
 et se trouvent en nombre indéterminé.

208. Les Causes qui y donnent lieu, sont la
malpropreté, de qui arrive souvent chez les
personnes qui ont les doigts sales et qui se
portent souvent sous leur nez. L'usage
du froid; puis l'habitude qu'on a de
personnes de se mouvoir souvent les lèvres avec
leur Salive, au moyen de leur langue. On
les reconnaît par l'inspection des lèvres et
par les douleurs qu'elles déterminent. On y
remédie avec différents soins, en général
les corps gras conviennent, soit ainsi qu'on
fait usage de l'état avec succès.

Leucorrhée Pariqueuse des lèvres.
On nomme ainsi un gonflement de la lèvre
qui vient à l'apex, qui consiste dans une
sorte d'infiltation de la lèvre qui
arrive par les pores suffisants
au monde. On les reconnaît par une
augmentation de volume.

Elles ne sont pas susceptibles de dignité
par l'application de topiques appliqués sur
elles. Tandis qu'il faut qu'il y ait une certaine
petite compression que l'on applique dessus,
mais il faut prendre garde lorsqu'on en
fait de l'usage trop fortement, car il
pourrait en résulter une cause de lèvre
par elle-même. Quand elle vient d'être
considérable il n'y a point d'autres choses
à faire que d'en faire l'abstinence, ce qu'on
fait avec les tisanes au vin de Rhenus,
mais de préférence de l'eau de Rhenus.

le dirige plus facilement, et par là même 228
enlève mieux ce qu'il convient.

De l'usage des levres.

Peut-être il commence par la lèvre inférieure,
d'autrefois par la supérieure, au lieu
par l'autre lèvre, mais le plus
valable, par le fait, que les lèvres
des lèvres sont une des parties où elles
développent le plus, sans que l'un l'autre à qui
cela tient, (on verra de même pour
la fréquence plus forte chez les hommes que
chez la femme, qui ne l'efface presque
jamais cette dernière.

Il est rare qu'il survienne d'une manière
spontanée il est presque toujours l'écoulement
d'une petite humeur qui se développe sur
la lèvre au lieu de la suite de gencives
qui le couvrent d'une petite pellicule, d'une
petite croute et l'écoulement par la suite
des lèvres, déterminée une petite infection
qui réitéré fréquemment d'une lèvre au
Caneau.

Cela nous apprend pas à ne faire signe
qu'entre les lèvres, attendu que nous
l'avons fait en traitant de l'usage des
mouvements généraux. Cela nous donne seulement
qu'il en provient la même cause, l'écoulement
que lorsqu'il est sorti à un haut degré,
lequel peut rester dans cette partie même
plusieurs mois, même, des années, sans
qu'elle ait lieu, qui n'arrive que lorsqu'il
a envahit toute la partie supérieure,

209. sur les commissures, les jointes, les glandes
du col, ce qui assise de la même manière
que lorsqu'il est porté à un haut point
pouvant entraîner de graves, en faisant seulement
remarque qu'il se manifeste plutôt lors
à son siège aux reins, au testicule, tant
cet état d'une manière sympathique du système
de sorte que d'après cela l'on voit des individus
en porter très longtemps, sans que l'état
en souffre.

Traitement Il faut presque dorénavant les cas employer
les instruments tranchants pour le détruire la
caustique ne pouvant pas être, parce qu'il ne
procure qu'augmenter la maladie au moyen
de l'irritation qu'il détermine, à l'exception qu'
ne peut venir en application tout d'abord
une suffisante quantité pour cela la suppression
qu'on en fait usage, il en résulterait une
écroûte très difficile à briser, attendu cela dépend
de l'alt. qu'il en résulte que quand il y
a un gonflement considérable, il faut enlever
un symptôme sp. Il y a néanmoins des cas
général et local qui supposent qu'il y a une
lésion, soit ainsi que quand il y a une
une grande partie de la face, qu'on ne
peut guère le traiter autrement que par
l'excision. Concernant la tumeur, on connaît
qu'il y a généralement qu'il faut l'enlever
qu'il a déjà acquis une certaine étendue
parce qu'il n'est pas en état de se résorber
et l'alt. que de la respiration à une
certaine, on en a vu de la diathèse cancer
qui pousse et développe.

L'opération du Canard des larrus, se ²⁷⁸ ~~pratique~~ ^{pratique} différemment ~~en raison du lieu~~ ^{en raison du lieu} où il se trouve. ^{1^{re}} ~~au milieu de la~~ ^{Gervinot}
~~différence de la~~ ^{des commissures, en ce}
que dans le lieu si bien nommé à l'ottou
une grande portion de la terre, il en
résulte un rétrécissement considérable ^{79th}
de l'ouverture de la hanche, aussi est-ce
pour cela, toutes les fois qu'on s'en a
besoin on n'otterea. Dans cet endroit qu'on
enlève la portion d'une manière circulaire
tandis qu'on millien de la terre on la fait
en un grand de deux incisions, qui se joignent
de réunir à angle droit, mais il est des
cas où cela ne peut pas toujours être fait
à cause du défaut de régularité du Canard,
de sorte que d'après cela elle doit être
faite d'après l'usage du chirurgien qui une
fois enlevé, est réuni, de la même manière
que pour le bec de lièvre, c'est d'après
cette sapologie pour la terre supérieure.
Quand à la terre inférieure, cela se fait
avec une bistouri en commençant du côté
gauche du Malade, tandis qu'on tient la
partie Malade de la main du même
côté l'incision faite on la détache, d'après
de faire la muqueuse, après quoi on la
donne à tenir à une aide tandis qu'on
pratique une autre incision du côté
droit, qui se joint à l'angle
aigu de la ligne médiane, on l'en

21) *Structure cutée, saignie Marie* D'après le limas
ce qui représente ce qu'on pratique dans le
de ce delier. Si on que l'angle de la plaie
au lieu d'être en haut, elle est en bas, après
qu'on a réuni de même, si se met qu'on
introduit les aiguilles de bas en haut. On
fait presque toujours après les incisions
une évacuation de sang, mais une grande
quantité, ce qui tend à la dilatacion des vais
Il est rare que la réunion s'en fasse aussi
bien, à cause de la formation de pus qui
se forme ggt, qui est des mouvements de
mauvaise nature, ischoreux, et qui peut causer
la diathèse cancéreuse par son absorption.

Affection de la langue.

Elle est susceptible d'un grand nombre de
maladies, qu'il lui faut pres, soit les uns
appartiennent à la membrane muqueuse, tandis que
d'autres appartiennent à la tige charnue.

Cause de la langue.

Il faut tout ce qui les cause me l'un ou l'autre
designés sans point - attendu que nous en avons
par la cause d'elles, lesquelles sont trois aux aphtes d'elles.

La Cause de la langue.

Il faut de même qu'une seule des trois
soient à une cause particulière et non à une
Cause Diathèse cancéreuse
lequel peut tantôt s'affecter qu'indépendamment
de cette cause, tandis que d'autres fois
il peut en attaquer une grande portion

De la tumeur de la langue

ou de l'engorgement.
 On trouve aussi un état dans lequel la langue se trouve considérablement augmentée. Elle peut être aiguë ou bien chronique, et être ou ne survient qu'une manière lente, qui dans certains cas est tellement considérable qu'elle est comparée à la langue du Saint.

Causes

Elle peut résulter de l'usage d'une nourriture spontanée ou l'application de certains corps irritants appliqués sur elle, tels que ainsi qu'il se voit que avoir lieu par la langue, sur des personnes qui boivent beaucoup de lait, dans laquelle elle se trouve des orageaux et d'écailles dans la langue au arriéré. Réposé de la salive sur des feuilles, qui sont très rapprochées par leur base, est également sur un jeune homme qui n'avait mangé que du lait. Elle peut également être sympathique d'une autre affection, est ainsi qu'on la voit dans certaines fièvres putrides, dans la peste vérolée, ou dans d'autres effets de l'administration du mercure, lequel étant le plus fréquemment administré au lait ou administré en plus grande quantité qu'on ne le fait maintenant pour les affections vénériennes.

Signes

Il est facile de passer de reconnaître cette affection par ce que présente les personnes, et qui est une augmentation.

Moyens de guérison

On y remédie par l'usage de légers purgatifs, des fumigations de sue de lait, que l'on fait sur la langue, moyen qui avait déjà été employé par Galien pour l'usage de lait et autres moyens adoucissants auxquels on fait des lotions fréquemment.

repentir qui quand l'usage dure longtemps 23A

Dans cet état sans remède alors pour
en prévenir les suites fâcheuses qui peuvent
en résulter, l'usage le gomme, la poudre d'or,
à cause de l'infirmité de la force de celle
se trouve, alors on y pratique des petites
saignées qui font faire à
une certaine profondeur les petites saignées
presque du côté de la Couronne amovible,
par le débouchement de sang qui s'y fait,
aussi depuis que l'on a pratiqué ce petit saignée
religieuse, on a vu qu'il y avait une occasion de
remarque est accident, qui s'est fait, l'air
parmi les anciens.

Section du voile du palais Le 21^e de
2^e Germinal
et des parties qui l'entourent.

Voile du palais de la membrane muqueuse.

Cette partie de la membrane muqueuse, qui
recouvre les vases digestifs, est susceptible
d'être altérée très fréquemment d'infirmité
qui se termine alors souvent par des ulcères
lesquels ont presque toujours pour cause
les vices du sang ou ceux du cerveau
qui en résultent.

Opération de la lèpre

On caractériser par ce terme, son usage
au lieu de celui de tulle sorte qu'on en
elle a lieu elle frotte la base de la langue
et donne souvent lieu à des infirmités de
l'urine.

On ne doit pas trop si cela ne tient
pas à l'infirmité du muscle palato-staphylin,

Par les

281
Sui. bien à la paralysie
ligons

Me survenant chez les personnes qui sont
dans cet état, par les infirmités fréquentes qu'ils
ont d'avaler, qui les empêchent même pendant
leur sommeil, assez souvent de porter à
leur face croire qu'ils ont un corps dans
la bouche qu'ils sent qu'ils avalent. Elle
a fréquemment lieu chez les personnes qui
sont exposées à avoir une inflammation de
voile du palais.

On y remédie au moyen d'une incision faite
sur elle, afin de déterminer la contraction
ou bien la relaxation, par l'action du muscle
qui la meut, c'est pour cette fin qu'on lui fait
de faire, qu'il se trouve pulvérisé, qu'on
y porte avec une cuiller, ou bien de
l'huile, ou de l'autre substance choisie
il a été souvent fréquemment par cette
affection se renouveler chez quelques personnes,
alors il n'y a point d'autre moyen que
de le faire à la résection, toutes les fois
que lui a tenu. De quelques fluides d'indigence
d'autant plus qu'il n'y a point d'inconvénient
à le faire.

Cette fin lui sert de la légature ou
des instruments tranchants, ou de pincettes
ou de ciseaux en ce qui concerne la ligature ou
par le moyen du malade à être suffoqué
la chute dans les voies digestives toutes
les fois qu'on la fait, au lieu que l'on a
pu à l'écarter la même chose lorsqu'on
la coupe avec des ciseaux et des pincettes.
On peut encore le servir d'un couteau.

insulte par l'usage, à qui on peut en dire
l'application sans état d'ignorer.

Maladie des glandes Puygades

Elles sont capables d'être engorgées, de manière à former un corps plus anormale
Halumians de chaque côté de l'axe du
Gosia, tant les bords que les ailes, de
sorte à la ténacité dans l'indication.

Cet engorgement peut être aigu ou au lieu
chronique, les parties n'ont que produite.
d'un infirmité du voile du palais, l'autre

aucun autre ordo par le virus vénérien.

Il peut cependant être produit par

la même cause qui produit l'engorgement, tant les

soit que l'engorgement soit aigu ou chronique.

qui dans ce cas ne fait qu'augmenter de

symptômes de la glande. (Elle redonne), lorsque

l'engorgement est parti à un haut degré

du point le ténacité des parties latérales

est ce qui dans ce cas cause des difficultés

à la déglutition. Il n'est point intercepté

de déglutir en l'absence, de sorte que

les parties ne font pas souffrir, même

qu'un y fasse trop d'attention.

Il est facile de reconnaître l'affection si l'on

peut le rapporter qu'on fait le malade

par l'inspection des parties.

On doit par l'inspection l'engorgement

toutes les fois que l'on soupçonne qu'il est certain

cause par le virus vénérien, il faut

employer les antiseptiques, tandis qu'aucun autre

297 De la Stricture par les moyens topiques, des
aussi qu'on lui fait usage de liges, applique
de moyens irritants, tels que la Stricture l'aloue
et même toutes les fois qu'il y a quel-
que engorgement au point de faire de
petite scissures, afin de faciliter la
pénétration du dégorgeant, qui suffira
les uns et les autres pour le faire passer.

S'il persistoit à l'emploi de ces moyens,
il faudroit faire à l'exemple de Bell,
tailler la Stricture avec l'ongle, en portant
le bout du doigt, ou grattant la plaie
mais comme l'opération est persistante et qu'on
ne peut la faire passer, alors il faudroit
en venir à l'excision, ce qui se fait au
parvient avec la ligature, les cautères
et les instruments tranchants.

298 De la Stricture déjà longtemps qu'on a vu
la ligature, il paroit qu'il y a des opérations
angloises à qui l'on attribue l'excision mais
cela est avancé au-delà de nos jours, non seulement
à cause de la difficulté de la faire, mais
encore parce qu'il y a des cas où elle ne peut
être faite, ce qui dans tout les cas
ne pourroit être faite que par un état
particulier de la glande, par elle-même
de la facilité à faire, mais même par
cause de pusillanimité.

299 Les cautères deont être aussi
un fréquent usage surtout après l'emploi
qu'on pourroit cependant les réserver pour
le cas plus avancé qu'il faut les employer
pour faire passer la Stricture en grande
puisque cela impasse et qu'il y a des malades

et la chirurgien parle quantité de fois 228
qu'il faut les porter, que l'on pueroit
faire au moyen d'un petit linge qui
en seroit inséré, que l'on auroit mis au
devant d'un petit linge, de la même manière
que pour le Vétical, crainte qu'il ne
tombât dans la pharynx.

3.° Enfin on peut enlever la glande
avec l'instrument tranchant, c'est ainsi
que l'opérateur fait usage pour cela de
Ciseaux. On distingue de la force et d'une
pression, dont on peut porter les pressions
à plusieurs reprises si l'on veut d'une
fois de nécessité. L'opérateur le sort de l'isthme,
en la fait en deux temps, que l'on a bien
avant l'opération extérieure de l'inge jusqu'à
la pointe, que l'on l'aît avec une
épingle d'acier, simple, ou bien avec
avec des pinces à disséquer. On s'assure
d'abord par compression de bas en haut, puis
de haut en bas, parce que dans le premier
cas on pourroit aller plus vite le Vétical
du fait, que dans le deuxième si on
l'en fait au bas on le fait au
haut sans empêcher qu'un usage
à faire lequel convient, pour pousser
l'air comprimé puis que d'extraire la
visitation faite, l'opérateur pour en tirer
dans les pinces digestives si elle étoit
pas retenue. Il est très difficile à faire
cette opération d'abord par la position
de la glande puis ensuite par ce qu'il
peut se faire, que les mâchoires soient
bien rapprochées que l'on est obligé de

249. Dilato sans poursuivre bien la faire
q^{est} un moyen de spéculum au dit
autres moyens, mais bien de faire
tenir la bouche ouverte après les autres
qui peuvent se faire suffisamment,
et d'abaisser la langue avec le doigt, que
l'on tient fixe dans l'application des
caustiques. On ne doit point craindre
comme on le fait de dénuder les parties
près du col, attendu qu'il s'en trouve
encore un peu éloignées. Il faut aussi
tant qu'on est dans les autres opérations
avoir placé commodément le malade
sur une chaise et au jour, de

Leçon de 4^e Juin. Après la résection de la glande, il découle
une plus ou moins grande quantité de sang
qui si elle étoit considérable pourroit donner
lieu à quelques inquiétudes, qui cependant les plus
ord^{es} n'ont point de considérable, qu'elle soit
bien il faudroit alors l'arrêter par l'application
de caustiques appliqués dessus, ce qui a été dit
pour cela. Il arrive q^{est} après avoir été
chassé qu'il survient un écoulement de sang
sanguinolent, qui exigeat alors qu'on en fît
l'arrêt de la même manière.

Maladies Des Dents et Des
membranes muqueuses Des Gencives.

1^o Les dents sont à examiner les dents sous
deux aspects généraux. 1^o Dans leur
altération physique. 2^o Dans leur altération
opérée par le sang, ou par le sang. 3^o Les affections
des vaisseaux et des nerfs qui sont de deux sortes.
4^o Les affections locales qui sont de deux sortes.

pratiquer.
 1^o Sans une altération physique, il peut se faire l'organe d'une nouvelle dent succédant
 de celui qui est naturel, chaque ne peut altération -
 avoir lieu que ^{long} que une de la représentation ^{physique des} dents, vu de leur
 usant pas tombées comme elles auraient ^{nombre d'excédent}
 de les faire. De sorte qu'il peut se faire que ^{de l'excès} de l'excès
 le nombre soit moindre, qui dans ce cas ^{position d'excès}
 si, tient au contraire à ce que tant les
 qui se trouvent de recréance dans les
 altérés par la seconde dentition ne se
 sont pas développées au fait venir.
 Elles peuvent être mal placées, par cela
 même que le nombre de la succédant, de
 manière qu'il peut se faire qu'il y en
 ait une, deux au devant, qui peuvent
 former une proéminence plus ou moins
 considérable (qui ne peut être détruite
 qu'au moyen de leur arrachement). Il peut
 se faire qu'un leur être indolores
 soient au dedans. 3^o Il peut en être
 de sorte qu'elles aient une mauvaise direction
 dans leur implantation de sorte qu'elles
 peuvent proéminer en devant au contraire
 ce qui peut gêner en outre, par la différence
 qui en est 4^o la dent d'au plus d'autre
 moyen d'oppression y empêchant qu'on
 ne fasse l'opération, ou bien de faire
 une impression, qui suppose à l'imbécillité
 2^o La substance de la dent peut être
 atteinte d'écrou, et affectée de Caries. La substance
 d'écrou peut non seulement attaquer ou résister
 la carie, mais encore elle la faire Caries
 par la racine et c'est lors qu'elle la
 sont dans toute leur longueur, elles.

S.
 02
 3

22 Deviennent vives, vacillantes, de manière
à ce qu'elles ne tiennent point le point qui
coïncide avec le point où se trouvent les
à ce point les arrache. Lorsque vient la Carie
qui les attaque, elle peut être plus ou moins
considérable, qui agit est plus ou moins
liée chez l'homme que chez les animaux, qui
tient sans doute à des différences de structure
dont il fait usage soit dans la vie, ce
qui cause une flexibilité plus ou moins forte.
Quand elle vient à attaquer l'intérieur de la
dent elle est suivie de douleurs très vives
peu de temps de l'introduction de l'air
ce qui lui tient qu'à ce que la pulpe nerveuse
du nerf dentaire se trouve en contact avec
les douleurs sont très fortement portées, qu'elles
engagent les personnes à réclamer des
secours, auxquelles on ne peut remédier que
par le moyen de l'air de plomb qu'on
introduit dans l'ouverture, tant qu'il peut
y entrer, ce qui est très difficile à faire
qui dans certains cas suffit pour faire
disparaître les douleurs, pour doit chercher
à plomber une dent qui lorsque la Carie
dont elle est affectée n'est point encore
très avancée, car dans cela il faut en
faire l'arrachement plutôt qu'un peu tard pour
éviter qu'on ne la casse, qui quand cela
arrive, on éprouve le point de difficulté pour
arracher les arrachés, et de circonstances
ou l'application seule de substances
irritantes appliquées dessus suffit pour
faire passer la douleur, et ainsi qu'on

le voit pour l'écoule, dant au cetiv des
manchete Dehors offette

22

3^e. Les douleurs des dents produites
par l'affection de leur nerf ^{est désignée}
sous le nom de doutagie que l'on peut ^{désigner}
considérer en essentielle et en sympathique, ^{ou d'outagie}
Les essentielles peuvent tenir au nerf
lui-même, se report à porter sur une
dente dant, ou bien sur plusieurs et
qui dans ce cas n'est qu'une véritable
névralgie dans qques cas, puis qu'il est des
personnes qui insensiblement indiquent qu'elle
est celle qui leur fait mal (qui peut à
ce que je crois porter sur une dent flante
malade), ce qui le prouve, c'est que l'on ne
a vu chez qui les douleurs se sont tantes
lente disparues, quand on leur a dit
qu'on leur appliquera le feu pour les faire
disparaître derrière l'oreille et qu'on leur
a serrées qu'au bout d'un temps p. m. d'après
Elles peuvent également tenir à une
affection rhumatismale et à la quelle
pour les quels on a l'usage de l'huile de camphre
par l'application de l'essence de camphre
sur les oreilles. La Carie comme nous savons
de la dire plus haut, peut aussi produire
l'outagie, quoiqu'il n'en soit pas
l'effet. Elle peut tenir au travail même de
la dentition chez les enfants, ou bien à la
distention des muscles masticateurs
recuser la machoire chez un est qui d'ant
serrée les gencives: aux quels on remède
en leur donnant des corps durs qui -

S.

02
5

228 L'usage de l'opercule les quels sont en
une Doute la Manche au la Veste d'acier
la membrane à ce que l'on a dit, les lesquels
au tout temps sont durs, parce qu'ils sont
bien au lieu d'indurcation les douloureux les
angoureux de sorte que d'après cela l'on
pourrait croire que les praticiens l'ont fait
inciser la membrane une seule fois
de la pointe d'une lancette, ce qu'on
fait pas souvent, d'abord parce que les
parents ne veulent pas y faire le moindre
opercule douloureux qu'ils croient qu'on
leur fera, puis ensuite parce que les
praticiens ont même usé de l'opercule
douloureux douloureux de remarque
chez certaines femmes grosses, les douloureux
ce qui le prouve dans les premières est
qu'il est est chez qui il fait l'opercule
tantôt les fois qu'ils conçoivent une dent
par l'opercule que l'on a fait l'opercule
pendant que pendant qu'ils ne le font point
elles ne souffrent pas, sans que l'opercule
à quoi l'opercule au a été encore le
remarque l'opercule certains embarras
gastro-intestinaux, mais cela n'est point encore

opercule
opercule H^o L'opercule les opérations qu'on peut
qu'on pratique l'opercule praticien peut se rapporter
à l'opercule l'opercule la cause de la
opercule l'opercule d'une Opération qui se forme
l'opercule l'opercule d'une Opération qui se forme
qui cause l'opercule l'opercule l'opercule l'opercule

aux personnes qui en ont une certaine
quantité, qui dans des circonstances
donne une couleur tant même aux dents
qui se trouvent ~~par~~ en grande quantité
au point de les décolorer au point de
leur donner une couleur. Au lieu d'exprimer
trop la cause, on ne sait pas si cela
tient à la présence de la salive dans
la bouche, mais on le voit presque
comme elle ~~contient~~ Ap. de phosphate
calcaire et que le tartre n'est pas
que par lui, on a tant lieu de s'étonner
qu'il se trouve qu'à cela. Il faut remarquer
Ap. plus, savoir les dents incisives et
carnées que sont les molaires, et même
celles-ci plus du côté au archange
pas si souvent. Au point de la dent
par la grande petite brèche de orifice
intérieur de corps avec les qu'il faut
les dents car encore elle fait l'éponge de
dentes substances pulvérisées, avec le vinaigre
la crème de tartre, que l'on frotte avec
une lingette de dentelle extra soignée, que
les dents on insère qui sont en très
grand nombre, qu'il faut quand on ne
peut pas travailler avec une machine
qui ne soit qu'il est utile, il faut
plus qu'il faut travailler plus, ce qu'on fait
par agissement et par nécessité
20) Au les plombage comme avec les
dit dans les cas de carie.

20 ou les
plombage

15.

02
1.3

225 30 an les arrache, ce qu'on fait avec de
3. On le arrache ^{petits instruments particuliers}, qui differe
liens qui on sont en arrache dressant
au lieu haute la dent. Dans le premier cas
au le sort de pied de pichet qui est est
un que l'on introduit entre ^{la racine et}
l'alveole, qui y est parvenue au la fait
sauter en passant le manche. Sans doute
et ya la pichet de Garreget, des anglais,
et une infinité d'autres dont on ne peut
donner le dénombrement qui ont pour but
de faire sortir les racines des dents entières
en un mouvement au quel se trouve un
petit crochet qui ^{est} fait, et dont on les
arrache d'autant mieux qu'elles le sont de
bas en haut en les soulevant et non de
haut en bas comme l'on se cache à l'enlever
racine rompre le bord de la mâchoire
40. Il y a des personnes chez qui on en
peut les substituer d'autres à celles qu'elles ont, ce qui
a été le plus fait qu'on ne le fait maintenant
surtout en Angleterre, car c'est là qu'on en
en ne le fait et qu'on le pratique toujours
Il faut remarquer que les premiers d'une
personne vivante ne peuvent en en
les transplantées, ce qui fait que pour leur
faire, il faudrait avoir plusieurs personnes
ou au moins; on ne l'exécute que chez
les individus qui ont attaché le esprit
à avoir les arracher d'autres qu'on
Il est remarquable cependant qu'on ne le

fait plus qu'une, non seulement par acquies-
cement des praticiens qui ne croyant point que
les dents puissent repousser, mais
ensuite qu'il en est assez qui se paient
régulièrement de dentelles. 246
Il faut le faire, on ne le peut que par des
incisions, canines et premières molaires, et
non pas les dernières à cause de leur
racines. Lorsqu'on veut le faire par un
ce ne peut être que par elles, qui leur tiennent
tant qu'elles sont dans la cavité, on instant avant
qu'on les fasse pénétrer dans la trou-
ve. 247
Soit qu'on en substitue d'artificielles ou naturelles
que l'on fait au nombre d'une, deux, d'artificielles
trois plus au moins et même des fois
toutes une arcade, que l'on ne place
ainsi que pour la beauté, l'usage d'un
impropre, ou bien pour l'utilité. Par exemple
on les fait qui sont faites d'ivoire, d'hyppopotame,
même à Paris des dentistes se font
quelques des canines, d'une ou de la
racine, on les fixe ainsi à une voisine
par un petit fil de laiton, qui est rempli
passé dans un trou qu'on présente à
une dent.

Section de la Gencive. Section de
5° Effection de la Gencive. 5° Effection
Elles sont extrêmement multipliées.
Elles peuvent être liées. De l'effection
qui fait qu'elles se gonflent, plus ou moins et de la dentelle
les causes qui y donnent lieu sont ordi-
la cause des dents qui indépendamment de
cela, occasionne qu'il en y a souvent de
la gencive qui correspond du côté affecté
on le reconnaît ce qu'on sent des gonflements
ou plutôt une inflammation par les dents.

2^e qui y éprouvent les Malades et par suite
à l'usage et par l'inspection. Il a été
guéri à l'extrême par résolution, d'un
par le sapper alors dans ce cas il se forme
la petite Verrue qui s'élève sans être
au fait on fait l'ouverture au moyen
la pince d'une lancette, que l'on y introduit
comme avant, que le sapper soit formé
les malades éprouvent des douleurs, au point
taches d'écailles diminue au moyen de l'application
de pain détrempé qui se trouve imbibé de
quelques liqueurs molles que l'on tient
placé sur l'endroit affecté au moyen
des jupes, on simplifie tout par ce
collation et pénétrant peut suffire, ce qui
conviendrait mieux que l'application de ce
sur la joue, attendu qu'il ne pénétrant pas
produit son effet, par l'application de parties
2^e 99^e Elle peut être utile la paille
se ramollissant de sorte à ne plus présenter la paille
qu'elle existent, ainsi ce qui arrive dans ce
cas principalement chez les personnes qui ont
passé de leur temps, qui y ont du tort,
il y a point d'autres moyens dans ce cas
pour y remédier que de faire de ce qui
peut les entretenir pour d'autres fois
ce qui n'a l'usage de l'usage, car on
le peut dans les Malades, l'écaille se
qui se fait alors que l'on pousse
précipitamment. Enfin cela finit 99^e
une paille. Une application de l'écaille
à l'usage sur les personnes qui ont
99^e, ou bien présentent tout ce qui se fait

un scortutigne, su agraie il me fiant pas 278
 l'au l'au l'au impossible, puis qu'on ne peut
 t'en bien se rendre. Parcela m'est
 antique, elose pour cela il faudra
 l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme
 de la manière de l'isotomisme de l'isotomisme
 tout que cela que c'est le plus de l'isotomisme
 une figure. C'est impossible que madame Fraise
 n'ait regardé une attente de l'isotomisme
 par Mr. L'isotomisme de l'isotomisme, m'estelle dit
 et qui cependant ne l'isotomisme pas, et qui
 Mr. L'isotomisme lui a dit. L'isotomisme de l'isotomisme.
 Lorsque cela ne dépend pas d'une
 affection scortutigne, ou parant y remédier
 par de l'isotomisme. L'isotomisme de l'isotomisme
 l'isotomisme de l'isotomisme, l'isotomisme de l'isotomisme
 usage de l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme
 accident minéral. L'isotomisme de l'isotomisme
 alors on aurait recours au l'isotomisme
 anti-scortutigne, qu'on ne s'en rend pas
 difficile.
 3. Les l'isotomisme peuvent être l'isotomisme de l'isotomisme
 l'isotomisme de l'isotomisme qui peut être l'isotomisme de l'isotomisme
 l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme
 en donnant l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme
 ce qui se remarque dans les l'isotomisme de l'isotomisme
 tant de l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme
 de l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme
 est accompagné d'une l'isotomisme de l'isotomisme
 par y l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme
 l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme
 que l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme
 y l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme de l'isotomisme

S.
 02
 01

179 Le cas en cela ne suffirait point. Du reste
actuel pour la conversion en une vessie de
la tête des quereux, mais dont on doit ne
s'occuper qu'à la dernière extrémité.

Opérer de l'interieure de la Bouche

Ils sont extrêmement fréquents, quel-
qu'un doit distinguer en deux espèces, ceux
qui sont vénériens et en ceux qui ne
le sont point.

1^{re} Des - Les Vénériens sont extrêmement fréquents
Vénériens. qui passent ordinairement au voile du palais
et du bout de la pharynx, des tumeurs qui
donnant lieu à un tumeur brèche au
que la diphtérie constitutionnelle. On les
reconnait par tout ce qui a précédé, ainsi à
une influence de ces parties qui dure déjà
de qu'il y a longtemps, à de petites piquetures
à des points blanchâtres qui dégénèrent en
un ulcère, qui déprie 99th considérablement
et envahit les parties voisines. Il faut s'en
se tenir que la suite d'une partie du
voisine, d'interieure celle-ci n'est qu'un
effet constant qui qu'on s'en à la
on peut résumer la partie des parties
des pharynx. Il n'y a point d'autres choses
à faire, tantôt parfois qu'il y a dégénération
d'une diphtérie constitutionnelle, de la décomposition
par des autres parties, qui en général
peuvent être plus de suite que ceux qui
se développent qu'un traitement local.

2^o Des - Les autres espèces d'ulcères qui y
non vénériens. 2^o Les autres espèces d'ulcères qui y
arrivent sont désignées sous le nom

Déptes, qui leur peut rapporter à quatre espèces. 280

1^{re} Dabore il en est qui peuvent se voir d'une manière particulière, sans qu'on en sache la cause, c'est ainsi qu'on les voit pour certaines personnes.

2^{de} Les têtes de gonflement d. s. gencives, qui contiennent tout un amas de pus, que l'on remarque encore chez ceux qui ont usagé de mercure. Il n'y a point d'autre moyen pour y remédier que ce qui consiste à purifier le sang, à quoi on fera usage du Colère de l'infirmité.

3^e Elle est un symptôme d'une affection particulière.

4^e Enfin elle peut dépendre d'une affection générale, qui se complique avec le rhumatisme, qui tient dans certains cas à une grande quantité d'induration qui se trouve dans un endroit. Il est des affections qui ne paraissent point encore, si elle en dépendent ou bien elle sont une maladie qu'on attend qu'elle se rencontre sans en avoir l'attente.

On ne parle point de ceux qui sont symptomatique et qui ne surviennent que par suite d. s. parties environnantes ou par d. s. appas leur siège dans la tête cellulaire d. s. j. ou a.

Cumours fongueux de la bouche. Ils surviennent dans tous les cas de certaines duretés même considérables, il en est 1^o qui présentent

S.
02
3

28^e Une certaine consistance, qui se remarque
principalement sur la langue, est à elle-même
que l'on doit le premier d'un avis, par lequel
qui sont plus fréquents qu'on l'a cru, en
peut les détruire avec deux moyens, avec
les instruments tranchants et avec l'altération,
sans donner la préférence au premier
ou ce que avec ceux ou les autres tout d'un
côté et l'on ne suppose point à cause
une vive douleur au malade, qui peut
se prolonger un certain temps, qui peut
être suivie d'ulcère comme dans les ulcères
altérés. Cependant si l'on voulait leur
servir l'on aurait soin d'employer une
force suffisante, pour parvenir tout de
suite au succès, d'après les causes.
Des éponges 2^e D'autrefois elles ont une forme
spongieuse, ce qui bonfait comme les autres
qu'on a vu tant à large base, d'autrefois
à pied, au lieu même une forme
que l'on ne peut pas dire, les quilles
sont en se perdant sur les parties où
elle se trouvent qui sont les plus délicates
les gencives, les joues. C'est à elle-même
qu'on a vu d'autrefois d'après qu'on
affecté des os voisins, sans qu'il y ait
affecté de carie, d'après qu'on
venant à cette dernière, par l'altération
des os, chez elle, d'après qu'on
intervient dans le premier cas avec les

instruments tranchants dans le domaine
il faut pour en procurer la guérison, que
l'on détruise la carie avec le cautère
actuel, après en avoir fait l'écision, de
la même manière que cela a lieu pour
les tumeurs fongueuses du sinus maxillaire,
qu'on ne le faisait pas, cela ne s'opère
de rien, qu'on doit d'ailleurs s'attendre
de faire que cela aigue

Lorsqu'il se présente des tumeurs dans l'intérieur
du nez, on se comporte de la même de la même
manière que pour les autres, en faisant
remarque que l'application du caustique
ne suffit pas, qu'il faut une lente force et que
l'on doit y avoir recours plusieurs de suite.

Affections du Pharynx Le 6^e de
Germinal

Les affections appartenant à la membrane
Muqueuse qui le tapisse à l'intérieur.
D'abord celle dernière est susceptible de
l'inflammation aigüe constitutive aigüe, inflammatoire
appelée l'angine pharyngienne, l'angine
des ossements elle est appelée l'angine
laryngée ou laryngite. Elle est presque
toujours du domaine de la Médecine
cependant il est des cas où elle n'y
appartient pas, tel que quand elle se
siège dans les tumeurs ou glandes
amigdalaires, que l'on nomme dans ce cas
l'angine amigdaline, laquelle donne lieu
à l'écoulement qui s'appelle
l'écoulement du pharynx, et d'autrefois à l'hémorrhagie.

S.
02
1.3

238 Du fluide muqueux à une intérieure région
est en impossible pour de petite quantité
antérieure, sans aucune participation à la cavité
Ligne. Il est caractérisé par une douleur
dans la gorge, la cavité, par la
difficulté de la déglutition, l'altération de la
voix, elle est gâtée accompagnée de la
scarlatine, ce qui fait qu'il ne s'en
trouve si elle est une affection de la cavité
ou primitive.

La terminaison. Cette inflammation arrive différente
terminaison, d'après la résolution, peut être
faite, ensuite par dépôt, peut être
les suites, qui peuvent arriver deux lieux de
la pharyngite, savoir dans la partie
latérale du col. Dans le premier cas, on
trouve dans le tissu cellulaire qui se trouve
entre la membrane muqueuse et la
cavité charnue de l'organe. Dans le 2^e
Dans le tissu cellulaire également qui se trouve
sur les parties latérales du col. On les
retrouve dans tous les cas presque assez.
Le dépôt d'un peu de pus, mais pour les autres
on est le pus purulent, ce qui fait
qu'il faut bien examiner l'intérieur de la
pharynx, qui si on le rapproche de la cavité
dans la partie de dépôt, l'altération, on
est même obligé de faire gâté la cavité
du dépôt. On en doit faire la cavité
de la cavité sans pas de pus, comme avec la
pharyngite, même la partie d'un

Histoire, que l'on a enveloppé de linge. 234
jusqu'à cette dernière. Il est des cas où
elle a une grande tendance à déterminer par gangrene
par gangrene, mais pas que cette même
à l'égard l'intensité, mais bien par son
caractère, qui dans ce cas est d'ordinaire
de la Méénie, qui ne doit point être
confondue avec le charbon qui se développe
général comme nous l'avons dit en lieu
propre. Enfin elle peut déterminer par son
état squameux, qui est très caractéristique, qui est
de manière à résister à l'extension du pharynx,
et ne plus permettre l'aspiration, ce qui
est extrêmement rare. Dans un cas comme
peut être trop les causes, si ce n'est que l'on
peut dire que cela tient à une affection
l'insémination de manière à être d'ordinaire
causée de petite tumeur: il n'y a pas
d'autres moyens pour y suppléer que d'introduire
une sonde de gomme élastique dans l'organe
par laquelle on fait passer un cathéter
pour tenter de l'écarter.

Des causes qui s'opposent à
ce que les aliments parviennent dans l'estomac.
Elles peuvent se rapporter aux rapports
aux parties qui servent à former l'œsophage,
le pharynx et l'œsophage.
1^{re} Les causes qui sont rapportées à la
lèvre sont une contraction spasmodique de l'œsophage.
des muscles qui concourent à faire la bouche.
incurable la machine qui constitue le
trismus, son imperforation, le gonflement
de la langue.

15.
3
302
1.3

passer dans les cavités nasales antérieures. De la 2^e 36
 Branche, toutes les fois qu'on le veut, parer
 cela est plus facile, la quelle doit être
 longue et s'étendant au loin qu'à l'usage
 l'obstacle et avoir un diamètre assez gros.
 Dans le cas on ne pourroit pas le faire
 pénétrer par les cavités nasales on auroit
 recours à la Branche, par laquelle on pourroit
 la même y ramener au moyen d'une attache
 d'une autre qui seroit l'usage des cavités
 nasales, on en auroit de 2^e 37 se trouveroit
 fixe. Sans l'impossibilité de l'usage de
 l'autre on auroit recours aux instruments
 nourissants.

Maladies du Rectum

Sans revenir aux celles de l'estomac
 et des intestins après celles-ci

Il est tout comme celles des autres endroits
 originaires et acquises.

Les sores sont extrêmement multipliées et de celles
 peuvent être rapportées à trois espèces, originaires
 1^o Le rectum peut exister dans toutes les
 étendues, mais être branché simplement à
 l'extérieur au moyen d'une petite membrane, l'impotencia
 de telle sorte qu'il ne puisse pas avoir de contact
 et sera un peu brisé; 2^o Le rectum de
 sorte à ne point le voir extérieurement
 l'extérieur, ce qui fait qu'il y a continuité
 malgré entre les deux parties; 3^o Les sores
 pénétrant par orifices extérieurs, mais être
 divisés au dedans de celui-ci, p. m. profondément.

Fig. 3

par une petite-membrane, en manière de clop
3.^e Enfin il est est au il n'est pas d'autant
seulement dans une petite tumeur, au lieu
tout à fait, le quel peut dans ces cas-ci n'est
point de communication avec les parties
environnantes, au lieu de s'écarter, tout avec
le vagin chez le sexe, tout avec la Vessie chez
l'homme. On peut encore y avoir une rétroversion

Signes

Ces deux signes sont faciles à reconnaître par
de temps après la naissance des enfants, par
l'absence de cette excroissance ou bien qu'il y aura
une écoulement, dont on se confirmera. C'est
ce qui introduisant l'écoulement.

Contre

Il est facile au moyen de dilater, &
d'étrécir le rétrécissement du rectum, en faisant
usage de ces indiques (Pins & ligatures), en
même temps qu'on le veut de corps gras, ou
Fig. de Cérus. Il existe fait qu'une petite membrane
à son orifice; facile à la détruire avec
un instrument tranchant. Les Pins se reattachent
à son orifice au il y a continuité entre les
téguments, ce qui est exact. une cloison à
son intérieur; dans ce dernier, d'une dans
l'autre on ne peut y remédier que par
l'introduction d'un trois quart, ou un instrument
tranchant, qui dans le 1.^{er} cas d. l'écoulement
est exposé à des incarcérations. Au lieu
d'écoulement à craindre trop d'incarcération il y
au soit d'autre partie à prendre, qu'on doit
une autre caeter. matière au col au qu'on
et non au soit à raison du trop d'écoulement
C'est à l'écoulement qu'on a l'écoulement qu'on a l'écoulement
dans l'écoulement, qu'on a l'écoulement qu'on a l'écoulement

les replis du péritoine, mais bien évidemment
que l'on ne peut mesurer pas avec conséquence
le péritoine, qui d'ailleurs n'est pas
facile à saisir. Pour tout les autres lieux
il n'y a rien à faire, en observant que les
petites filles qui ont eu l'intestine communi-
cations avec le Vagin, ou même plus longtemps que
les petites garçons, après qui ils commencent
avec la Vessie.

Il ne parait pas que le rectum puisse se séparer
de l'os sacral comme les autres, attendu que
c'est que le sacrum qui peut en dériver une accidentelle
l'os sacral; mais il peut se séparer en
un seul morceau en déchirant de la membrane
unequise; de manière à présenter, par
une tumeur d'un volume considérable.
L'os sacral n'appartient en exemple d'un pied.

Conséquence de la membrane
unequise du rectum.

Il paraît dans certaines circonstances
qu'on a cette maladie de manière à
former une petite tumeur à l'os sacral du
rectum, ce qui arrive surtout chez les enfants.
Les causes qui y donnent lieu sont la
diarrhée et l'effort sympathique qu'elle occasionne
dans cet Intestin lors de la présence d'une
puissance dans la Vessie, qui leur fait faire
de grands efforts pour aller à la garde-
robe, ce qui dans l'affaiblissement de l'Intestin
ne se fait qu'en vain et en vain, et en vain,
qui disparaît aussitôt qu'ils se débarrassent
plus, qu'il est bon de ne pas confondre.

15.
3
02
1.02

239 avec la chute du rectum. Il n'y a d'autre chose
à faire que d'administrer des remèdes capables
de braver les douleurs, & de braver qu'il soit possible
par la diète, afin de détruire si est
possible la sensibilité des intestins. Dans
le cas de calcul, d'en faire l'extraction.

Chute du Rectum

Ce la désigne ^{l'homme} en outre le remède
qui consiste dans l'inspiration de la partie
supérieure du 1^{er} intestin dans l'isthme
qui peut braver toutes les épreuves de la
cause. Les causes qui y donnent lieu, paraissent
dépendre des efforts auquel on se livre
pour aller à la selle, ce qui est facile
d'autre part, par la bégayement ou la difficulté
en bas, qu'il faut elle arrive, l'intestin
présente comme un boudin dans son
intérieur maintenant par un ^{reflet} ^{l'homme}
forme un ^{reflet} ^{l'homme} à l'endroit où
il existe, en manière d'indiquer de son
présentant un volume p. m. considérable
susceptible d'être étranglé, par le sphincter
Il n'est pas toujours facile la reconnaître
parce qu'il peut arriver qu'il n'y ait point
encore un remède assez considérable
que l'on ne l'apprenne, nullement, ce qui
ne paraît alors qu'un point. Adieu
dans le rectum de fait elle n'est nulle
difficulté, d'abord par la petite ouverture
donnant passage aux matières fécales qui
permettent qu'on y introduise le doigt, l'isthme

est assez grande, on imagine d'après cela
l'abondance du sang de l'intestin, formé
par son reversant.

reintennet

On ne parviendrait à guérir les personnes
que le prurit tourmentait, que dans les cas où
le remède ne serait point au lieu et
près de l'âme, car autrement on ne le
pourrait guérir. On doit donc entretenir
la rectitude de la membrane
portée d'après la rectitude des corps qui
aient cette propriété, ne donne à l'arranger
que des substances qui ne produisent que
des matières fécales, fécules dans
l'opération horizontale. Administrer des
laxatifs, puis des substances légèrement
stimulantes dans le rectum. A la suite
imaginer des bandages; mais ils ont été
sans effet. Vient-il à arriver un étranglement,
il faut débarrasser le rectum de l'obstacle.

Salippes de la membrane et l'arrangement de la
de rectum et autres affections.

1.° Cette membrane est une capsule ambulante
qui, si elle a lieu, est déterminée par l'arrangement
l'action du corps extérieur.

2.° Les Salippes de cette membrane sont
extrêmement rares qui peuvent dépendre de Salippes
quand ils ont lieu. Les hémorroïdes de la
entrent dans le même genre. Il n'y a point de
arrivent, qui se composent de Salippes
de autres parties.

3.° Les hémorroïdes, qui sont des tumeurs

15.

302

1.3

Il est des praticiens qui croient qu'elle ne consiste qu'dans la dilatation des sinus kinnaroidales, mais cela n'est point, d'après l'examen cadavérique, et fait seulement croire qu'elle ne consiste qu'en une infiltration de sang dans les têtes cellulaires. Presque 75 ft. de sang sont contenus dans les artères, qui percent et se réunissent aux v. ch. de la jugulaire, phlébotomie au bras, et même que par une incision latérale des veines, longtemps prolongées, donnent l'écoulement, on les voit encore chez le sujet gras.

[illegible]

qui peuvent dégénérer en squirre, qui ne
peuvent point à l'extrême, mais entre
les de Douleur à l'extrême, lesquels
malades nous la garde-robe.

Il est des personnes qui apprennent l'existence
qu'ils ont avantagées d'autres dont
est d'un traitement contraire de manière
que suivant les 12. et il ne faut y rien
faire et suivant les 12. y remédier pour
moins nous dirons qu'il faut y remédier
l'état squirreux qui paraissent au sein
que pour y parvenir on doit enlever
les petites tumeurs dures qui sont bien
général, ce qui ne peut faire étant placé
dans, que dans les moments où les
personnes font effort pour aller à la
garde-robe, doit on à dire du repos
seulement, afin que suggérant qu'il
soient salutaires, que ce qui laisse l'oreille
à ce qu'il en résulte d'autres.

§. Du Squirre du rectum. 1.^o Squirre
On donne ce nom à des tumeurs qui ont la structure
d'une tumeur dans cet intestin. C'est la plus
sévère des dépendances du résultat d'une
syphilis constitutionnelle, ayant la même analogie
avec le squirre du pilaire, tant au point de
d'autrefois étendue, pouvant en résulter
même toutes les parties du bas, après
avoir dégénéré en cancer, qui cause un
trouble dans les excréments. Causes.
On ne peut en rapporter les causes

15.
3
02
1.3

De la rétention du Urine Vénérienne, et
d'autres, voir l'article de.

Signes On le reconnaît par les symptômes
qui précèdent le malade, ~~par~~ difficile d'attribuer
à la garde robe, qui est en raison de la
consistance des matières et de l'état de la
maladie, qui rétrécit l'urètre et de l'urine
qu'on reconnaît par l'introduction du doigt
qui porté à un haut point, peut intéresser
le passage des excréments.

Continuement On ne peut y remédier que par le moyen
de la compression, car la fistule de la vessie
est corrodée et bouchée, malgré ce qu'on indique
qu'on prétend, qui est de rétrécir le canal
pourrait pas qu'on les malades, ce qui est
une contradiction avec les observations
expérimentales. Les malades ne s'en rendent
en ayant l'urine de la glande (l'urètre)
qui doivent être accommodés aux parties
cas de non rétrécissement d'autres parties après
le l'emploi des calmants car d'ailleurs
l'opération d'ingestion d'urine, pour
éviter les douleurs.

Legende Les fistules de l'estomac et de
10 Primaries sont intestinales.

Elles sont les plus fréquentes au rectum
qui dans tout autre endroit qui sont
plutôt des ouvertures que des fistules véritables
De l'estomac
1.2e fistule de l'estomac se présentent dans

circumstances le font aller jusqu'à des anastomoses
faites à l'estomac, mais elles sont très rares.
par suite d'un sang qui y a été porté, de
suite à la contusion, ce qui donne lieu d'aller
à ce qu'il s'est formé puis de contracter l'anus
adhérence avec les parois abdominales, qui est
général. L'uni de l'isthme, qui donne une ouverture
qui communique avec l'intérieur de l'estomac.

3^e Enfin les fistules du rectum à une
ouverture externe, ou l'estomac peut se
percevoir et permettre le passage de l'aliment.
Cela s'appelle fistule, les anastomoses qui
succèdent au développement primitif des
fistules, parce qu'il y a altération organique,
tandis que dans les autres, ces précédentes, cela
n'a pas lieu, il n'y a qu'un seul trou qui
permet le passage de l'aliment. Par suite
un danger de ces fistules, il y en a qu'une
seule et qui ont obtenu la guérison,
qui fut très longue à obtenir, ce qui tend
à faire voir qu'il est obligé d'introduire des
aliments dans l'estomac, malgré la grande
difficulté de l'ouverture.

Les moyens pour leur emploi, en sont
une patience; on se contente d'empêcher le
contact de l'air.

Ces fistules sont moins incurables que
celles des intestins, parce qu'elles sont
plus près de l'estomac, par conséquent plus
faciles à guérir.

2^e Quand une fistule des intestins est 1^o de l'estomac
et de l'anus, 2^o l'anus contre nature
afin de conduire l'intestin le mieux dans
l'ouverture même de l'anus, qui

15.
3
02
1.5

Donne passage à toutes les matières - ~~assimilées~~
et à la portion d'intestin qui est au-dessus
de l'estomac, mais contient toujours des masses
qui sont rejetées par la nature naturelle d'une
part et par le contre nature de l'autre. On
les remarque à la suite d'un étranger
ou la portion d'intestin fixe l'est par
cause de la disposition ~~stagnante~~ ^{stagnante} placée par nature
transverse. On ne doit point s'y méprendre
cette dénomination que la division totale
des intestins, ~~stagnante~~ ^{stagnante} comprend sous le nom
de fistule la sortie des matières fécales
par une seule ouverture d'intestin dans un
point, de son contour, mais sans l'ouverture
cette dénomination, ou enfin par une seule
d'un corps étranger. Quand elle précède
une hernie il y a toujours digression de
substance, soit que la hernie soit tout
ou qu'elle en ait fait la rétraction.
Signes. On les reconnaît par la sortie d'une
~~rétraction~~ ^{rétraction} matière fécale en plus ou moins grande
quantité, qui se trouve parvenue à l'anus
de la fistule, qui donne lieu à ce point
d'épanchement dans l'abdomen et cause un
inflammation. On ne peut qu'être simple
spéculation de la nature, mais dans un
malade qui a une petite quantité d'urine
puis de présence l'absence de corps solide
et du contact de l'air dans l'anus et
en ayant soin de renouveler fréquemment
le linge du malade.

Des Anus contre nature. 246.

On surcroît le plus fréquemment à la suite de hernies Ep. qui d'après ce qui cause à priori de juger s'il y a d'abord de continuité sans l'intestine, au Cercle existe.

Dans ce cas-ci les matières ne s'échappent que par une partie de l'intestin qui a pu se faire une partie par les traces naturelles. Dans d'autres cas au contraire, toutes sortent par l'ouverture. Desant M. M. Labat et P. Baillet en ont fait les plus communs.

On les reconnaît à une anomalie contre nature, existante aux parois de l'abdomen. Pour les briser sans que par transformation produise par l'irritation des matières fécales qui y passent, soit en callosité au hiem partiel, qui est très par un jet de marasme, raison de la distension avec l'abdomen.

Le traitement des anus contre nature est, 1^o Seconda. de deux sortes, palliatif et curatif. Le curatif est en core de deux espèces; ou les malades traitent par le seul simple temporaire ou permanente, au moyen duquel ils échappent pendant quelques temps, après que de les arrivent une durée une aux matières stercorales; Au lieu ils ne peuvent si passer à cause des douleurs qu'ils éprouvent par leur contact de sorte qu'ils doivent avoir recours à des pas par les recueillies que l'on peut faire de gommées et légères, ou

~~Les~~ Les altitudes qu'elle présente, pour le mettre en
ou le point. Le 1^{er} a point d'attention que grande
y a encore une portion du contenu de l'intestin
restant, qui sans cela ne le permettrait pas
ce qui prouve qu'on le peut, si sont les fibres
respirées par le sang et le cœur, qu'on s'attache
à la compression coarctée des liquides
laquelle qui se remarque, qui est faite
par l'intestin que lui doit servir, tant
le fait qu'il y en a une partie qui s'élève
avant que de la fin, qui si il y en avait une
grande portion, on dirait qu'il y en a une
un corps dans l'ouverture. Pour le but dans
cas met que de presser la partie de la par
sortie et de faciliter ~~celle~~ la réunion s'il
possible.

Des fistules du Rectum.

Il est notant que toutes les fistules comme
qu'on pathologistes l'ont prétendu, qui sont
liées avec une ou plusieurs parties qui y passent
dans les parties environnantes. Il y en a
de la pénétration qu'il s'ouvre dans cette
cas. Je dis qu'elle ne sont pas toutes les fistules,
qui y en a qui ne communiquent pas
dans l'intestin. Il y a de plus les fistules
nommées par les fœces.

On la distingue d'après la manière dans
la distinction elles se manifestent. Le trou est incomplet
ou incomplet. Les premières sont celles qui ont
une ouverture au dedans et à l'extérieur, les
autres, au contraire, sont celles qui n'ont
qu'une, soit au dedans, soit au dehors.

Ces à fait désignés sous le nom de l'organe. 248
interne et de l'organe externe.

On a encore désigné d'autres deux sortes de
les fistules en ~~interstinales~~ et en non interstinales,
qui peuvent être divisées en complètes et
incomplètes.

Les non interstinales ne sont autre que des ~~non interstinales~~
ulcères fistuleux qui ont leur siège aux
extrémités de l'anus, succédant à la ~~dijette~~ Cause
qui s'est formée, au lieu d'une balle
qui a son siège soit aux os du bassin,
ou aux vertèbres, dont le pus s'est formé
un dépôt dans cet endroit, ce qu'on appelle
dépôt par congestion. Ceci prouve qu'il en
est, c'est qu'on en voit de pareilles advenir
sur tous les os, au-dessus de
l'organe succédant aux mêmes causes et
qui guérissent par l'ambroisie.

Les interstinales succèdent indépendamment également ~~des~~ ^{des} interstinales
qui se sont ~~généralement~~ formées aux extrémités de
l'ectome, chargées sont au reste, par la rupture
des vaisseaux, au lieu encore par la présence
d'un corps étranger, qui, par sa présence tant
les vaisseaux digestifs, que les autres, arrêtent
au lieu qui y a été introduit, les qu'on appelle
les parois de l'intestin. Soit le
l'organe dans le système vasa recta, ou dans
soient des dépôts, qui sont ~~généralement~~ ^{généralement} ~~l'organe~~
de l'organe, par la présence d'un corps étranger
interstinales qui y résistent, de la même manière
que cela a lieu pour l'infestation de l'organe
dans certains cas.

249. Malgré que les fistules larges internes
secondaires puissent être très dangereuses sans qu'on en
13. Germine apparence, il arrive cependant insensiblement au
ou les décombre, soit par quelques efforts
Sigue au point qu'on ne peut les députer qui résulte du
passage des matières au lieu qu'elles surmontent
d'elles mêmes. Quand aux externes il est facile
de les reconnaître, qui ont une ou plusieurs
orifices. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 222

est abandonnée, parce qu'elle présente des inconvénients
parce que d'une part il faut refaire que l'infirmité
ne fût assez forte pour que l'adhérence n'ait
de l'autre, soit que le fluide peut pénétrer dans
la tige cellulaire enflammant et déterminant des
déplacements.

Suppositaire
emplastiques 2^o. Les Suppositaires emplastiques, à qui l'on
donne une Volume si considérable, qui ont
pour but de dilater les parois de l'intestin
Aortum et de former l'apophyse de la fistule;
Mais elles sont également abandonnées, parce
qu'un Volume qu'on leur donne elles ne peuvent
jamais pénétrer suffisamment; aussi est-ce pour cela
que les matières peuvent passer également dans
l'ouverture et se rendre dans la fistule. En
coûtant même cela, ils ne réussissent pas dans
le cas de la diminution de l'intestin.

3^o Les
Canstiques 3^o. Les Canstiques avec lesquels on veut
tenter l'intérieur des fistules, afin de réduire
une escarre à l'intérieur de manière qu'on
tenterait les parois se réunissent. Mais il est
qu'il fallait pénétrer de la même manière dans
partie intermédiaire, qui peut se faire avec des
trachiques, ce qu'on ne fait pas avec plus et qui
pourrait être fait tout au plus qu'avec les liges
passablement, qui arracheraient les instruments
à qui l'on pourrait substituer encore de préférence
la ligature.

4^o La
compression 4^o. La compression de parois directrices

au moyen de corps dilatants, qui se font
avec des mèches, à qui l'on envoie l'inspiration
à fétit, qui prétendait que par là l'air
pénétrait l'apophyse à la que la matrice se
passait par le orifice de la fistule,
ce qui est bien d'autre dit, mais qui ne
peut donner le volume convenable aux
mèches, qui se trouvent assésées par la
matrice. C'est pourquoi, qu'on est bien pénétré
de cela, il est évident que des personnes qui
ne font aucun usage d'aucun point qu'ils
croient guérir les malades, mais machinalement,
en attendant qu'ils emploient la ligature ou
l'incision, laquelle ne présente aucun
inconvenient.

10. L'incision qui est abandonnée, qui consiste
à enlever toute la partie affectée entre
incisions, qui présentent de grands inconvénients,
en ce qu'il y aient toujours incontinence des
matières, par la destruction d'une partie
du rectum, qui l'on enlève et trépan de
l'opération, puis ensuite qu'il y aient une
suppuration toujours assez considérable et que
l'on avait de la difficulté à faire. Ce
sont tous ces inconvénients qui ont fait
que le vulgaire approchant l'opération de
la fistule qui maintenant n'est rien, plaigne
l'usage des mèches en manœuvrant.

11. Enfin il y a la ligature et l'incision. La ligature
qui sont les deux moyens maintenant dont
on se sert, dont l'un qui est la ligature

S.
02
13

253. On a vu à comprendre entre dans l'arc du
fil faite la portion d'intestin comprise
la ligue de l'invagination fistuleuse et les extrémités
du rectum, qui la coupe de haut en bas, et
non par les deux extrémités, attendu qu'elle
placée entre les extrémités des fils de petite
morceaux de linge, amoncés par les aînés
alors le cicatrice se formera d'autre manière
se fera d'un seul coup de bistouri, au
d'un grand cautère, et par conséquent il n'y aura
aucun avantage, d'abord l'incision est faite
au 6^e mois de temps, et au regard ensuite
aux douleurs qu'éprouvera le malade, c'est
il faut la ligature, mais il est à observer
pendant le temps le quel le malade ne sentira, qu'elle
ligature sera celle qui endormira la muqueuse
de la partie elle exige des attentions qu'un
médecin ne peut pas prendre dans la ligature,
qui dure 15. L'observation des matières fécales
que le malade évacue dans le repos, que l'on
empêche de traîner fistuleuse avec le bords
qu'il ne soit il est rare qu'elle réussisse.
En admettant qu'elle soit aussi avantageuse
l'une que l'autre, il est évident de ces
on l'un doit être faite de préférence à l'autre
existe-t-il plusieurs trajets fistuleux, on doit
préférer l'incision en raison de ce qu'il y a de
de ligature qu'il y a de fistule, on fera d'abord
une incision qui sera jugée dans l'intestin
rectum, puis des autres qui iront se réunir
dans cette dernière. La ligature n'est-elle

anémotrice débile, maigre, ant-ila-
la-diarrhé, on doit faire la ligature
encore qu'il n'ait eu pas les malades, si la
diarrhé a été que passagère, il faudrait
surtout : et en sera de même pour une
personne qui n'aurait pas la faculté
restée quelques jours au lit, parce qu'on
pourrait lui faire de la ligature.

André Debove avait que d'un aspect on pouvait
voir l'intestin par un lavement.
L'ano-pratiguala ligature au ténu fait la ligature
en premier lieu servit de fâche de chambre. Le second
mais qui a été remplacé par un déplacement de Gorgias
que l'on introduit par l'anus et la fistule.

De Debove : on en a vu pour aller dans le
Rectum. Comme il arrive des cas au Corifée
de la fistule interne par au haut d'elle
alors il faut que l'on y impratige une artifice.

De même pour les bourses externes. Pour
être de l'abord introduit au moyen d'une pince
d'une flexible présentant une pince au rectum
au son extrémité, on tire le Daptier l'ayant
du fait d'un bout, mais maintenant on l'introduit
tout ce qui exige qu'on introduise le
doigt indigénaire et du milieu d'une
rectum, pour qu'on puisse le retirer, ne
pourrait point dans ces cas, on est obligé
d'employer comme aux instruments internes.
par d'autres causes et effets, qui sont le
Gorgias et le Gorgias.

De Debove pratiqué par la voie externe
des cas confusés par la fistule et fistule
bourses externes, infirmité de pince instrument

15.
202

35 Afin d'examiner mieux les parais de l'intestin
rectum qui ne sont autre qu'une tumeur
que l'on fait pénétrer dans la fistule
jusque contre ce dernier y étant parvenu
à l'aise dessus une petite tumeur canaliculaire
de sorte qu'elle se trouve contenue dedans, on
procède à la conduire jusque contre
celle-ci on retire le tuteur en place de
quel on fait pénétrer un petit troiquart
que l'on pousse dans l'intérieur du rectum
ce qui établit une anastomose et rend ainsi
la fistule complète. Afin de garantir la
partie opposée de l'intestin, on a eu soin
d'y avoir fait pénétrer les deux doigts
afin de s'en tenir approximativement à la page
que l'on doit y donner d'entrée. Etant
au tiers le troiquart et on conduit un fil
de plomb en place, que l'on ramène au
dessus de l'intestin comme nous l'avons
dit, après quoi on retire l'aiguille, tant
fait qu'on introduit le gorgeste que l'on a
substitué aux doigts. Si l'on a été dans le besoin
on fin de suite les deux bouts de fil
en les tortillant l'un sur l'autre, au lieu
encore de pénétrer, on les introduisant dans
une petite canule insérée également par le
parce que l'on craint qu'elle ne se rompe
en ayant de mettre un peu de linge entre
eux une lanière de, puis de ne pas
trop serrer afin d'éviter une trop forte
pression de la part de la chaise, que l'on
donne tout les jours serrer un peu, afin

de couper les parties, jusqu'à ce qu'il n'y
en reste plus. 256

Pour faire l'incision avec également la manière de
grande à la manière de la pratique on fait l'incision
à l'oreille sert d'un instrument appelé
couteau à son milieu ou même
qu'il y avait tranchante. C'est d'un bistouri
couteau, terminé par la pointe en un
couteau, tranchant dans toute son étendue
également abondamment, par conséquent très utile
pas impunément aussi dans des parties
instrument tranchant. Tous les bords. L'étant
apparemment de la nécessité d'un bistouri, on
est sortit d'une grande cannelure, sur la
quelle on faisait glisser un bistouri, afin
elle ne peut enlever que toutes les fois
que l'infirmité est placée à une distance
de l'oreille, car autrement elle ne peut être
employée, malgré la facilité qu'elle
a de saisir la cannelure qu'on lui donne.
Maintenant au sujet du procédé de
Desaut qui a rétabli le gargarisme de
châtaignes, qui est fait de bois, ce qui
est d'autant plus commun qu'un biseau
est même, puis d'une grande cannelure
d'un bistouri on y parvient en commençant
d'abord par introduire la grande cannelure
après avoir fait mettre une lanière de
cotonne appliquée à la maladie, puis le
gargarisme, que l'on fait pénétrer à une
autour incidente l'infirmité de la fistule,
ce qu'il a cela d'avantage, puis qu'on peut
le faire de tout leger cannelure, y étant

28) En place l'extrémité de la tige de l'épave,
sous la rainure de la gâchette anglaise un
Bistouri droit, avec lequel l'opérateur lève
la partie qui se trouve comprise entre
et la gorgore. On doit avoir soin pour
quelque soit l'opérateur de ramener la tige
et la gorgore ensemble, parce que de cette
manière on voit si tout est divisé, toute
fois après avoir retiré le bistouri. Et
fait, il y a 99 ans, trois personnes qui
existaient au les diviser avec la tige de l'épave
et le bistouri, au lieu encore le gorgore
il s'abaissent dans l'intérieur.

Second On ne doit faire la réunion que quand
16) Germain la ligature a coupé l'entierement - les parties
qui se trouvent contentes, De même que pour
l'excision; pour cela on place un corps entre
les bords de la plaie. Et l'on donne temps de
chacun que l'on induit de l'état, que l'on
retient avec des compresse et un bandage
en C. toute fois on ne doit le faire que
quand on a suspendu l'écoulement de sang
il y avait excision. D'une autre manière
la ligature, ou la compression. Ce doit être
le Chirurgien qui doit prescrire la méthode
ou tout autre personne instruite, parce que
sans cela il pourrait être. Bien de faire
que la plaie se fait plutôt à l'intérieur
qu'à l'extérieur, ce qui s'opposerait de la tige
si l'on y faisait attention.

Dérangements des fonctions 238

du Rectum

Il peut être affecté de deux espèces, ou
il y a rétention des matières fécales, ou il
y a incontinence.

1. De l'incontinence des matières

On nomme ainsi l'expulsion involontaire ^{Cause}
des matières fécales, qui peut avoir pour
cause, l'irritabilité trop forte de l'intestin,
le défaut de force de la contractilité ^{de l'intestin}
spontanée, la paralysie, ou cela arrive chez les
déprouvés, ceux qui ont reçu une
commotion du Cerveau, la paralysie.

On le reconnaît par la sortie de ces ^{signes}
matières, soit le jour, soit pendant la
nuit.

Lorsqu'elle dépend de la sensibilité trop
forte de la part du Rectum, par la
présence de ces matières dans son intérieur
et n'y a aucun moyen direct pour parvenir
à remédier, on doit se proposer d'écarter
d'abord la précaution de donner aux
opérations aux enfants le soir, les faire
suyver de bonheur et de les faire à l'heure
bellée avant qu'ils se couchent. Si dépend de
la paralysie de l'intestin, on n'a point de
moyen de remédier, que les causes qui l'ont
disposé, ce qui arrive fréquemment si on
a négligé dans l'éducation de la propreté par
excès ou par l'absence d'une certaine
quantité de sel est due par la paresse.

15.

202
1.3

Il y a donc beaucoup de choses qui ne sont pas certaines, il y a que les causes qui peuvent le plus y contribuer et le traitement, mais qui ne peuvent pas être portés à l'excès.

2. De la Continence des matières.

Elle est la maladie insérée dans le rectum qui peut avoir pour cause l'hyperforation du rectum; la présence de corps étrangers dans le canal, mais dans un des exemples, soit par l'usage de l'opium et l'usage; la contraction trop forte du sphincter anal dans le tétanos général; la paresse; l'usage le défaut d'irritabilité du rectum, de l'indolence qui le lubrifie, la consistance trop forte des matières.

Il est facile de la reconnaître chez les personnes qui disent ne point avoir été constipée depuis longtemps.

Après-telle de l'hyperforation, dans les enfants; de la présence de corps étrangers au niveau du rectum avec des tumeurs, après-telle avec de la présence au niveau du rectum le doigt dans le rectum; de la contraction du sphincter, constipation la maladie générale. De la paresse, faire des évacuations et de la contraction. Au bout de la constipation; faire des évacuations, faire mouvoir l'opium, de même que dans les autres causes. Les Malades ne peuvent pas en être traités.

De respirer laque de l'asthénie des intestins
par les aliments, & il pourroit se faire qu'un
lapis, encore plus un épanchement de sang
que l'un en souffrirait point, attendant que l'un
occupe toujours la partie inférieure de l'abdomen
à remuer la maladie de l'osier par la
distension d'une manière insensible, lequel
forme une espèce de boule pénétrée de la
fluxion. La distension des intestins chez
les hydropiques par des gaz, pourroit
pouvoir être en imposer, mais qui sera facile
à déceler en questionnant le Malade sur la
distension. Il y aura encore les continents
puissent que les malades ressentent à l'extrémité
de l'abdomen par le tiraillement des muscles
à droite, et sur les côtés par les obliques.

Quant au remède pour la guérison de la pénétration
qui se fait aux intestins, quel que soit le
suo lieu de l'abdomen, après avoir
fait suer le parois de l'abdomen en
faisant d'abord suer le ventre le Malade
puis par une légère pression que l'on exerce
sur l'abdomen, crainte de l'abdomen
avec la pointe d'un instrument en continuant
que l'on a soin de corriger la position en
bas pour faire passer le sang plus facilement
et qu'il ne s'accumule point sur l'abdomen, malgré
qu'on pourroit s'arrêter. L'écoulement, ou
l'application d'un des compresses trempées
dans l'eau de l'osier, que l'on continuera
par un bandage de corps. Si l'un survient
dixième l'asthme épigastrique, on arrêtera

l'hémorragie par l'introduction d'une bougie
de gomme élastique, qui sert à tenir l'air
l'empêchant de s'échapper, & de se renouveler.
Des Maladies de l'appareil, Respiratoire.
De l'Empyème, dans le cas d'Hydropneumonie.

On donne ainsi ce nom à une opération
que l'on pratique sur les parties latérales
de la poitrine, pour donner issue à un fluide
purulent contenu dans la cavité, qui peut
dépendre d'un abcès ayant son siège au péricarde
dans le tissu du péricarde du péricarde
transverse le plus ou bien entre la plèvre costale
et les branches intercostales, au péricarde
des bronches, Modiastris, qui se sont formés dans
cette cavité, par la rupture d'une artère,
ou d'une veine, d'une péricardite, d'une
pleurésie, ou d'une inflammation du tissu cell.
Vaisseau, par le Diaphragme, du foye, du péricarde,
ou d'un autre organe.
Le reconnaître est une des plus importantes
de la poitrine par les symptômes de fièvre que
les maladies présentent, la fièvre, le délirium
de péricardite, le Diaphragme, la difficulté
de respirer, le mouvement de palpitation
d'un fluide lorsqu'il se rend à la tumeur
sèche, la rougeur des joues, la chaleur de la
poitrine des vaisseaux, par la péricardite
qui peut former la liquidité, c. la sortie
du pus en plus grande quantité dans le
mouvement de la respiration, annoncer
est dans le péricarde qui a son siège
qui sont alors, plutôt que de s'échapper
dans la poitrine, par les adhérences que
peut avoir contractées les membranes de
la plèvre.

Continues. On ne peut que appercavoir des moeurs patétiques
 dans ce dernier cas, en faisant des ingulations
 assez un peu de fluides, quel que ne soit pas
 encore si à cause de l'effort au quel on est
 qui peut être si grande. Accidents si elle est
 trop forte. Quand la manière d'affaire est
 entretenu à la manière mauvaise à ceux indigne
 la manière de l'affaire allongée.
 Des Maladies de l'appareil circulatoire.
 De l'hydropneumonie.

Quelque chose à un amas d'eau contenue
 dans le péricarde, qui y arrive de l'extérieur
 manière que l'hydropneumonie a lieu dans le
 péricarde, par suite d'une affection de son
 membrane séreuse. Il est très difficile
 car ce genre de l'hydropneumonie peut approuver
 mêmes que pour cette dernière, est à
 dire l'indifférence de la respiration, l'inspiration
 d'abord, les irrégularités de la pulsation, puis
 l'absence de la respiration qui lui peut être
 en pressant la région épigastrique. On se
 peut y donner et même que par une autre
 que lui y sera, pour l'hydropneumonie.
 L'hydropneumonie le péricarde, qu'on peut voir
 entre un espace intercostal, par le
 sternum, par le sternum les extrémités des
 fausses côtes et l'apophyse xiphoidienne,
 mais de préférence l'apophyse xiphoidienne,
 pour voir la tumeur qu'on trouve au fait
 puis montre est que lui a à l'extrémité
 l'apophyse, l'apophyse et la lésion peut être

se fait jusqu'à l'excès.

264

Maladies des Appareils sécréteurs

Elles sont extrêmement multipliées et compliquées, et qui sont au raison de leur fonctions qui presque toutes conduisent à des opérations. Elles sont susceptibles comme les affectives, d'autres organes qui nous avons examinés 1° à des vices de conformation, et à des Maladies organiques, soit de l'organe sécréteur lui-même, ou bien de conditions qui en part; 2° à des dérangements de fonctions, qui portent également sur les deux dernières. Toutes ces affectives ne dépendent point de la chirurgie, il y en a qui appartiennent à la médecine. L'altération générale sur les altérations du fluide sécrété; 3° pour en donner une idée, nous en avons un exemple par ce qui arrive chez les hydrophobes, au des altérations interanigues, qui peuvent résider dans l'organe lui-même, ou bien dans le canal, et ainsi qu'on le voit pour les pierres urinaires, biliaires.

Affections de l'appareil lacrymal.

Les vices de conformation de cet appareil sont extrêmement rares au sein même. 1° Exemple: les Maladies dont il est affecté 1° originelles sont plutôt accidentelles qu'originelles, et sont en rapport avec l'altération de l'organe lui-même, ou bien de conditions qui en part; 2° à des dérangements de fonctions, qui portent également sur les deux dernières. Toutes ces affectives ne dépendent point de la chirurgie, il y en a qui appartiennent à la médecine. L'altération générale sur les altérations du fluide sécrété; 3° pour en donner une idée, nous en avons un exemple par ce qui arrive chez les hydrophobes, au des altérations interanigues, qui peuvent résider dans l'organe lui-même, ou bien dans le canal, et ainsi qu'on le voit pour les pierres urinaires, biliaires.

15.
3
202
1. 252

283. Une cecité lénie à une cicatrice résultant
d'une ophtalmie de la conjonctive à la suite d'une
petite fièvre. D'un petit ulcère, qui avoit
2^e Organisme son siège proche d'un l.

Maladie
de la glande
lacrimale 1^{re} Des Maladies de la Glande lacrimale
Elles sont extrêmement rares, au non connu
presque point d'exemple, si ce n'est celle que
site Cranchat qui dit avoir une fois traitée

de son inflame son inflammation qui peut devenir squameuse
et son squameuse puis prendre le caractère Cancereux, qui peut
inflammation l'une grande partie de l'œil. A la
qui dans l'histoire de son d'origine, qui se
trouvent rapportés par D'Almeida et D'Almeida
lesquels en ont fait l'histologie. Mais
pourrait qu'on reconnût l'inflammation de la
glande, ce qu'on ne pourrait pas enlever qu'on
des signes qui ne se finissent point et se prolongent
très longtemps. Quand à son état squameux, on
ne pourrait que le faire presumer d'après
certaines cas, mais qu'on pourrait reconnaître
par la pression. Il n'y auroit pas d'autre
partie à prendre une fois reconnue
de faire l'histologie, qui n'est pas très
aisé à faire.

2^e De celle de la pointe de la cornée
C'est la membrane muqueuse qui les
laquelle on fait rapporter les maladies
auxquelles ils sont exposés. D'un seuliment
les attaquent, qui sont les fistules et les
cataractes. On y aient rangé les maladies
le boursoufflement de la membrane muqueuse

qui n'est qu'une affection catarrhale de 256
Cataracte, ou inflammation de la membrane muqueuse.

1^o Les fistules sont le résultat de l'extension
des larmes dans le sac, qui s'est rompu, la fistule
qui dans ce cas présente une ouverture
par suite de sa trop grande dilatation,
qui produit une sorte d'écoulement, qui peut être
accompagnée de la carie des os voisins, en
même temps que les parties molles extérieures
du sac se trouvent affectées, ce qui peut être
déterminé par les causes, même y résister
ailleurs.

2^o Le Cataracte au liffon chronique, qui peut être inflammatoire
existant dans quelques cas, présente les caractères d'une inflammation
aigue, lorsqu'il a attiré l'attention jusqu'à ce moment, à cause du peu d'effort
qui en résultent, tandis que celui qui
sur la perception s'attire l'attention, qui peut être
entre les dents, de la quelle on peut
l'épiphora, ou la chute des larmes sur
les joues. Anciennement on la prise au
sujet le commencement de la fistule, on la
remarque. Puisque, qui peut succéder à
une liffon de la conjonctive, au lieu de la
petite liffon, de la liffon, de la
maladie vénérienne constitutionnelle, d'une
affection scrophuleuse, qui dans ce cas est
régulièrement accompagnée de la carie des
os voisins.
De cette inflammation de la membrane, il en

267 résulte une augmentation en substance aqueuse
de la membrane, changement des fluides
aqueux, qui devient épais, torré, visqueux,
d'un en résulte l'engorgement des points lacryaux
qui si on n'est à les comprimer il se résout
qu'on ne fait passer le fluide par un autre,
par le canal lacrymal, qui
est la cause de la douleur à cet endroit
du nez qui par son ligament peut former
une tumeur qui a été nommée Anguillap
qui peut dégénérer en abcès. Scarpa croit
que le fluide qui s'écoule ainsi par
les points lacryaux dépend de l'altération de celui
qui lubrifie la conjonctive qui se détruit
absorbé par les points lacryaux, et séquestré
ainsi dans le sac; mais il n'y a aucune
raison qui puisse le faire croire, il s'est
trompé la figure, d'abord si cela étoit vrai
il le dit, il faudroit qu'il y eût instantanément
la membrane aqueuse qui couvreroit
toutes les fois, ce qu'on n'est point parvenu
cela paroît cependant arriver. Ensuite
on peut admettre que le point lacrymal
puisse l'absorber. On trouve même et la
consistance du fluide; plus épais qu'elle
est la cause que le sac se dilate et se gonfle
dans le sac et le canal lacrymal, quel
la formation.

signes

On reconnoît la rétention des larmes
en demandant si la personne a une
une inflammation de la conjonctive, la petite

Vérulé par les forties d'un fluide ²⁸⁸
magnétique la prissie que l'un sacrer duole
sac, puis par le passage des larmes seules
junes.

Pratiqué

Cette affection peut guérir spontanément
par les seuls efforts de la nature, Il meut
cependant qui peuvent durer très longtemps,
telle que celle qui tient à la diphtérie
constitutionnelle, à l'affection de l'ophtalmie,
alors dans ce cas il faut combattre la
maladie générale. Quand à celle qui est
liée à la même d'ille, on doit tâcher de la
guérir, parce qu'il peut en résulter la parie
des os voisins, par son long séjour, ainsi
on emploiera des colaires excitants, des
pommades de même nature ainsi que
des injections, pour débarrasser l'isthme
muqueux qui se trouve entre, qui ne l'on
pas faire par les points lacrimaux
ou bien par l'extrémité inférieure du canal
Nasal.

Fistula lacrimales

Secundu
21^e Germinal

C'est comme ce nom à une ouverture
du sac lacrimale qui donne passage au
fluide muqueux qui le lubrifie, qui peut
exister avec un plus grand nombre, Il peut
se faire aussi qu'il en existe double
traces des points lacrimaux ce qui est
extrêmement rare. Qu'est prêt et d'Al. Guérin,
cité par Arnaud.

15.

102

289) Mes. peuvent succéder à une inflammation
du conduit et du sac lacrymal, qui a déguisé
en chronique, ce qui donne lieu à la distention
des lacunes, qui produisent une distention du
sac ^{et du conduit} qui forme une tumeur plate, à la
partie inférieure de l'œil, qui est plus considérable
à la partie inférieure du tégument rétrobulbaire
qu'à la partie supérieure, attendu qu'il y a
espace qui se trouve, qui peut digérer
en un dépôt, dont le pus peut s'évacuer
dans le tissu cellulaire voisin, qui produit
~~des fistules~~ artères fistules, ce qui est rendu par
l'expérience, au moyen de la punction de
parois du sac. Mais de la trop grande
distention, de la même manière que cela a été
pour les autres conduits ~~et les autres~~
comme on voit à ces exemples dans les
qui arrivent aux conduits biliaires,
Vésiculaires, qui produisent présence de temps
à autres par la pression. De la même manière
donnerait lieu à la sortie du fluide, et peut
se faire inutile, qu'il se tiennent à l'écoulement
des vésicules, les deux ongles, mais cela
n'est point encore bien déterminé, on ne
sait pas trop si elle est que conduits à la
ceci, au lieu si elle est primitive, puisqu'il
peut comme lui s'en former une par
de la punction en suite de des obstructions
des artères du côté dans l'affection chronique
sans qu'il y en ait les symptômes en suite

attaqués.

270

On croyoit anciennement que la Carie
avoit lieu dans tous les cas d'infirmité,
ce qui n'est pas, ce qui diminue à l'air,
ce qui fait qu'un emplace plus le centre
actuel au lieu où elle se fait, puis qu'il
l'est dans toutes les parties, tandis qu'il
est plus maintenant, ou presque plus,
en effet je ne connois d'autre exemple
que celui de l'homme qui se lève
une fois tous les jours de l'est, qui se
fait dans ce cas comme dans tous les autres,
à la fin on applique le centre actuel, à la
différence seulement, qu'il n'est pas
d'importance aussi considérable, mais bien
petite, on avertit de ménager les
parties voisines les plus qu'il faut. On
peut aussi le ranger, au lieu de l'ordre
de la posture caustique qu'on a fait
fondre, dans de l'eau, dans laquelle on
trouve des morceaux de linges blancs.
Avec d'un bûton, qu'on porte ensuite
sur la fin offerte.

De l'opiphora

On appelle ainsi une éruption de larmes
sur les yeux, qui sont assés pour cause
d'irritation des parties voisines, ou
l'obstruction du lac.
C'est tout de cause présente y donne

Lean de
22 Forcunet

15.

02
V.3

279

lin 1^{re} l'air des points lacrimaux ont
cela se remarque particulièrement chez les vieillards
2^{de} l'agrandissement du canal, sans que pour cela il
soit étendu, 3^{de} l'usage d'un abaissement mécanique
car un petit canal, qui ne peut enlever
l'écoulement, l'usage l'on peut encore y placer
l'abaissement des points lacrimaux, les films même
du lac, au du canal, ils sont de la petite
voûte, d'une structure, d'une nature etc.
Après reconnaître l'existence particulièrement
des larmes les larmes, par l'impulsion
l'écoulement d'écoulement un état, qui est
presque toujours accompagné de l'abaissement
de la gorge bien dirigée lacrimaux.

Lignes

Cratium On a l'usage de l'écoulement pour guérir
les malades qui ont une forte (sans forme)
faire remplir et but on impose difficilement
peu de 1^{re} quand qu'il fallait de l'écoulement
lacrimaux en l'écoulement un petit état
pour détendre l'abaissement qui pourrait être
mais elle n'est pas à l'un ou l'autre de ces états
ou à l'un ou l'autre, ou dans l'autre
langue alors dans la première c'est de l'écoulement
difficile de voir précisément le lieu de l'écoulement
de l'écoulement qui ne peut être introduire
le état sans faire une forte pression 2^{de}
de l'écoulement des larmes artificielles sont
l'écoulement qui a été cette l'écoulement d'écoulement
l'écoulement l'écoulement l'écoulement d'écoulement
un fil du lac dans le canal nasal qui
est, l'écoulement à l'écoulement l'écoulement
l'écoulement l'écoulement l'écoulement l'écoulement
l'écoulement l'écoulement l'écoulement l'écoulement
l'écoulement l'écoulement l'écoulement l'écoulement

passer de suite dans le point lacrymal au ¹⁸²
 moyen d'une aiguille qu'on introduit par
 l'ouverture inférieure, qui se trouvant
 croyait qu'il faudrait suffire pour permettre
 aux larmes de passer; Mais cette opération
 est très difficile et d'un autre côté, si
 il est probable qu'on a été le canal
 oblitéré. D'ailleurs quand il persisterait il
 n'aurait pas les propriétés nécessaires pour absorber
 les larmes, aussi est-il entièrement abandonné.
 2^e Enfin on a proposé pour établir la communication
 larmes, de faire une ouverture artificielle
 à l'angle interne au-dessus de l'ouverture
 lacrymale, Fontana, Bertaud, Antine
 l'ont tenté opérant dans le même
 temps, Fontana la faite pour pratiquer une
 ouverture de l'obstacle lacrymal. Bertaud
 y a mis un abais à l'angle interne de l'œil,
 Font et celui qui a établi un procédé
 dans le cas d'oblitération, car il ne s'est
 que proposé de moyen l'ouverture de
 l'obstacle, on y introduit une petite canule,
 alors les larmes venant de l'angle interne
 s'engagent par l'ouverture.

De la Retention des larmes

Dans le cas
 Elle est déterminée par l'oblitération du
 canal nasal, on a tenté plusieurs fois dans ce
 cas il va également s'opposer les larmes ont
 appelé cette situation hydropisie lacrymale,

15.
 02
 1.3

27 ² larme, tumeur lacrimale plate, Anchylope,
mais toutes ces dénominations sont impropres,
celle de rétention seule lui convient.

Cause Les causes qui y donnent lieu sont étran-
gées au canal, ou bien lui sont étrangères
puisque il est intact. Les seules sont l'atonie
du sac que Richter admet, mais tout
ce dont on a dit de l'atonie du sac, doit
se rapporter à celle du canal, qu'on ne
sait encore indistinctement s'il est rapporté
à l'atonie générale ou à l'atonie locale
du canal, est que le sac peut être
dans le mécanisme du frage des larmes,
d'après la structure, puisque l'une des
parois est osseuse et l'autre fibreuse tandis
que l'autre est membraneuse et flaccide
pour ainsi dire dans le supérieur osseux
que forme le sac. D'après cela il me paraît
probable avoir de rétention des larmes par
l'atonie du sac, avant qu'on en ait
notées exactes sur cette maladie on
exercerait une compression dans la direction
où l'on était que cela dépendrait de l'atonie
du sac sans la faire avec une insensibilité
indéfinie, ce qui était très propre à
causer des fistules par la rupture des
parois du sac qui guérissent avec l'atonie
la rétention des larmes dans le canal
peut tenir à un calcul qui est très
rare, le plus souvent cela tient au rétrécissement

à la constitution des parois de ce conduit, 294
cette coaptation. Survient dans plusieurs
circonstances, 1^{re} q^{ue} l'obstacle d'un catarrhe
chronique, quel qu'il soit, soit, 2^o l'absence
de fréquence corrélat, 3^e la compression
mécanique des parois par l'accumulation d'un
pusillipe dans les cavités nasales, au lieu d'un
le sinus Maxillaire, alors on doit faire
une attention sur les maladies et sur
leur rétention des larmes.

La rétention de ce conduit peut être
portée à différents degrés, mais jamais
l'obstruction n'est complète, il y a toute distinction
il en résulte épiphora, distinction du sac
à la suite d'obstacle lacrimale, mais la distinction
du sac ne se fait que lentement, et onant
qu'il ne soit guéri à l'intérieur il y a
épiphora, la racine de ce conduit est sèche
la distinction du sac se fait indistinct et au
dessous du tendon du muscle palpébral,
q^{ue} l'on aperçoit, mais rarement. La tumeur
provoquée par le virus l'ancré de la
maladie, alors il peut y avoir une simple
rétention de larmes, c'est alors qu'on
appelle hydropisie du sac lacrimale, qui
peut se présenter avec de petites abscesses.
qui donnent lieu à la formation d'un dépôt
de pus à la suite des quels il résulte une
tumeur fistuleuse, qui est toujours accompagnée
de catarrhes. 2^o 3^o Gernival
Il y a d'abord simple rétention, tumeur
peu considérable, à l'angle interne. Lignes

295 Si il au dessus d'entendant du muscle Saphéris
épiphora, l'échec de la larme correspond
même plus considérable le matin que dans
le reste du jour, indolente, non circonscrite,
tongues d'un volume peu considérable
qu'il est comprimé, donne sortie à des larmes
par le point lacrymal correspondant, d'un
que par le canal nasal, au lieu d'un
de ce dernier. Les larmes qui en sortent
ne sont point toujours tingées, quelquefois
elles ont une couleur lactescente, ce qui tient
au mélange du mucus avec les larmes,
puis en font par les sucs lacrymaux, au
sature s'il y a liberté entière du trajet de
larmes.

Traitement Si la rétention dépend d'un état du
canal lui-même il n'y a qu'une double partie
à prendre, ou il faut dilater le canal dans
son état naturel, ou s'il est oblitéré entièrement
en pratiquer une percution ou une grande
incision ou une fistule ainsi qu'une fistule
une route artificielle raccommode cette
opération est suivie de succès est sans
doute pour cela qu'il y a tant de percussions
à employer à employer pour parvenir
à dilater le canal.
On pratique cette dilatation de deux
grandes manières, ou sans intervention de
ou au contraire par la partie des voies lacrymales
ou par l'ouverture du sac lacrymal indirect,
soit qu'il y ait fistule, ou sans l'employer

et stants sont pris dans une grande 296
anneau indigne en général.

Allegari de la ppe manière il y a de
procéder dans, bien de l'Allegari, l'autre
Lafort. Le procédé de l'Allegari consiste à
détacher le canal nasal par une petite
mèche qu'on introduit de bas en haut
après un peu de suie, auquel on fait
succéder l'écoulement par le canal lacrymal.
Après, le fait et le canal nasal, l'écoulement
est introduit, il se convertit en une petite
tête présentant un œil à l'écoulement de la
extrémité, tandis qu'à l'autre il y a une petite
tête latérale du côté par lequel l'écoulement
de l'écoulement nasal il se convertit en une
canalicule, pour servir de guide, l'écoulement
des canalicules nasales au côté puis on attache
à cette extrémité la petite mèche et bien
retient l'autre extrémité à l'écoulement
de grands incisions 1. l'introduction
du fil est très difficile, puis on passe
il est pointu, on peut piquer les autres
parties, l'écoulement bien sûr l'écoulement
est très difficile, en supposant qu'il est
introduit, l'écoulement dans le canal
lacrymal l'écoulement peut être déterminé
rupture.
Le procédé a une différence importante,
M. Gouin avait imaginé de faire
un fil jusqu'à dans le canal lacrymal
l'écoulement, mais il paraît en réalité
incertain, car si on introduit une mèche
assez grosse pour détacher le canal nasal,

S.

02
1.5

Il arrivait qu'un dilatateur de trépan ou de
lacrimal, ~~de l'acier~~ ^{de l'acier} plane entraine l'orbite
à imaginer deux petites plaques, présentes
de petites anastomoses, susceptibles de glisser
l'une sur l'autre, alors le titet parvenant dans
les cavités nasales, supporte les deux plaques
qui y étant entrées, s'attachent de force à l'orbite
l'entraine. Le titet, avec les plaques sur la
tête. L'allure arrive une petite cavité
particulière au volume du canal lacrimonasal
dont l'ouverture permettrait le passage du titet
en l'éloignant; il se produit d'une sorte d'obstacle
analogique à l'obstacle, lequel l'entraine jusqu'à
l'entrée du canal lacrimonasal. ^{propre} ~~propre~~
Le titet se compose de deux parties, qui
consiste d'une partie de l'acier, qui
seconde la conduite du titet, lequel s'écoule dans le canal
et s'écoule dans le canal, qui y sert
de injection, mais il aime à s'écouler dans le canal
pour dissoudre les parties qui sont entrées dans le canal
faire des simples injections dans le canal
catarrhes. Parvenant il se termine dans le canal
d'une petite tige, d'acier comme les algues
d'une fine longueur, étant encore légèrement
sur une des extrémités, pour introduire cette
tige dans le canal lacrimonasal par les cavités
nasales, on porte la tige de manière que
la cavité est dirigée en bas, qui s'écoule
parvenant dans la partie inférieure, et l'écoulement
l'instrument de manière que la cavité
qui est dirigée en bas, soit en haut, ainsi
que l'écoulement de la tige, alors on en
cherche à pénétrer dans le canal par le

liges mouvements, et une fois qu'il y 298
est pénétré, on peut ensuite l'ébranler
en portant le doigt à la partie interne
de l'œil la sonde avec ses introduites
on la laisse séjourner et lui fait des
injections avec la sonde d'acier, que l'on
représente par plusieurs autres grands nombres
de fois, ce qui se fait avec une petite seringue.

Les incrustations qui se reproduisent à l'opacité
est la difficulté d'introduire la sonde, qui est incrustée
99 est très difficile et même impossible,
parce qu'il y a une obstruction du canal,
en supposant qu'on y parvienne, on en fait
encore l'obstruction parce que les injections sont
sans effet, direz inutile, il n'y a que la sonde
qui agit mécaniquement, en dilatant, à la
guille ou rapproche encore l'aggraver avec trop
de dureté, par laquelle on s'oppose à la dureté,
qui a grande constance de l'obstruction avec la sonde,
avec une sonde simple, c'est pour quoi les
soudes de gomme élastique ou de caoutchouc
quelque peu se font d'un autre petit calibre
on pourrait encore diminuer les incrustations
de ces procédés en se servant de la sonde
de l'acier d'une petite sonde brisée tournée en
spirale qu'il faut tourner de l'œil, dont
l'introduction est facilitée par la tige
de l'acier qu'il retire avec la petite
patte, dans le cas de la sonde brisée de
l'aggraver avec la sonde mais cette obstruction
d'incrustation de faire séjourner sans

199 Dans le canal et de lui faire écouler
des maux humeurs & de prévenir de sa part
ne devrait être mis en usage, que lorsque
les personnes ne voudraient pas souffrir qu'on
fit une ouverture au sac lacrymal d'une manière
de disolubilité le sac lacrymal sans intérêt
des parties, voyons maintenant la manière
de le rétablir au fillet.

C'est au fillet que l'on rapporte ordinairement
d'avoir intéressé le premier le sac lacrymal
puis d'introduire un corps dilatable dans
le canal mais il paraît qu'il est à cet
égard le droit, parce qu'il est à l'usage en
cela approchant en quel indigne dans une
observation qu'il a donné à ce sujet, du
moins s'il la présente sans l'avoir eue
on procède se rapporte à ce de ce qu'il
est au lui doit au moins de l'avoir
fait remonter dans tous les cas. Mais si
en Angleterre et autres, l'on fait approcher
une balle même éponge
fillet fait. son procédé, en disant le
sac d'abord en deux temps il commencerait
par l'ouverture d'un fillet distendu, puis
le sac puis de suite il s'en servirait d'un
plus large cela fait il glisser une balle
lacrymale qui pénétrerait en l'ouverture de l'œil
de son côté une petite sonde courbée
qui pénétrerait dans le canal il retirerait le
distenseur puis glissant le corps dilatable dans
le canal également qu'elle pénétrerait
de l'autre côté la sonde pénétrerait
de l'autre côté de l'œil
Cependant à une différence invariable

à raison de ces incertitudes, qu'on peut 280
rapporter de l'oreille à l'œil, fait par
l'incision endormie, qu'on fait maintenant
en une seule. De l'oreille on retire le volume
qui se trouve remplacé seulement par un
fil, dont l'insertion était d'un certain
diamètre, tandis que maintenant elle est
très petite et la cicatrice en peu de temps
amortit le fil absent, tandis que cela
n'aurait pas lieu. Les changements qu'on
a fait (sans de l'oreille) le corps de l'oreille
à demeure, plutôt que momentanée, ce que
plombait à fait, de la même manière que
Vassal le fit pour un conduit artificiel à
la partie inférieure de l'œil, (Cela n'indiquera
pas toutes ce qu'on a fait, parce que cela est
trop long, nous nous bornerons à ce qui
fait de l'oreille, ce qui est le plus sûr et qui
a encore été un peu modifié de puis lui.)

Il s'agit maintenant de se servir d'un casier de l'opération
de l'oreille, qui se fait en insérant le sac d'ophtalmie
avec un bistouri ordinaire, on peut en faire
un en une seule pièce, étant au fait
pénétrer un fil dans le canal lacrymal
à fin de le débarrasser, sur le quel on fait
glisser une petite canule, qui doit pénétrer
un petit apertur pour empêcher qu'elle ne
casse dans le canal, après quoi on
retire le fil et on place du quel on fait
entrer le petit ressort d'argent au-dessus
de l'oreille, auquel on donne une

15.
02
1.3

289 grande courbure, afin qu'il tarte par
l'ouverture antérieure de la fosse nasale
au lieu d'y passer par la postérieure. D'aut
aussi peut se procurer la perfection
actuelle si il s'agit d'un placé le fil doit être
servant pour servir, qui s'écartera rempli
par un de plomb. Introduit on retire le
cannule, on passe un bout de fil de soie
par le canal au moyen d'un instrument qui
présente le petit ressort au quel on attache
un petit morceau de charpie qui formera
suffisamment de pression, on le retire, que l'on
tire avec dans le canal nasal, à l'extrémité
de quel il s'en trouve un autre point,
pour servir à retirer lorsqu'on le jette, qu'on
laisse un temps pendant, le fil supérieur
doit être l'extrémité d'un petit platou
que l'on place sous le bout du nez
qu'on déplace toutes les fois qu'on s'en sert
et l'on retire la même chose en haut, pendant
On est ainsi pour faire l'écoulement de
la part la plus prochaine qu'il y a
pour les petits enfants qui se trouvent qu'il
soit au moyen du tact, avec le bout du nez
indiquant, // faut aussi de faire l'écoulement
par les narines au dessus, au moyen d'un
aiguille, dans une direction horizontale puis
l'ong porte la pointe du bistouri au le
bout de l'écoulement correspondant à l'écoulement
des côtés au lieu d'être après de la même
manière qu'un bûche à l'écoulement dirigé de
manière qu'on s'en sert tout d'un coup qui correspond
au nez, et le trouvant en dessous, on le

des fers indurants, tant en arriere, en 282

entree que l'on a tiré de des derniers
doigts appuyés sur la tempe tout ainsi
disposé au lig d'auz perpendiculairement à l'axe
du canal, Ray et de l'axe, on le retire puis
l'un introduit l'autre en place et l'un
conduit au. nous venons de le dire.

Cependant se servir pour la première fois, & Germinet
de culbute - très petites, que l'un augmente
petit à petit, jusqu'à degré qu'on veut adieu
le canal et l'immense en passant, après
qu'on en a discontinué l'usage qu'on veut
engénéral garder pendant assez long temps,
c'est de l'usage, de l'usage et de l'usage,
après qu'on en a l'usage, de l'usage et de l'usage,
l'un veut seulement le fit pendant que temps,
afin que dans le cas où l'un veut l'usage,
avoir besoin de la même, on peut l'usage
tout de suite. Si après l'usage l'usage
pendant que temps tout de suite, que
les larmes passent facilement, alors on l'usage
attends il arrive que malgré tout
cela qu'on ne l'usage point, par lequel
arrive que cas où le canal l'usage
marche, que les points l'usage l'usage,
au lieu qu'ils n'ont point la l'usage de
exprimer leur usage, par lequel l'usage
point l'usage, alors dans ce cas on l'usage
de faire une conduite artificielle de l'usage
qui l'usage.

Dans le cas d'obstruction du canal on l'usage
pratique on l'usage du tendon du muscle
réflex, du l'usage, de sorte à l'usage

15.

02
1.3

portant d'abord une paille, bas en haut, 187
 puis de dehors en dedans en même temps
 qu'on l'élève qu'on lui fait éprouver des
 secousses de rotation et qu'on le pousse
 dans le conduit, y étant parvenu on tâche
 de le faire pénétrer. On se sert ensuite
 de la sautoir ou épave, étant fait si l'on
 a l'intention de le retirer par les fesses
 Malade; alors on l'insère et on tâche de
 le retirer avec une pince, un couteau
 simplement ou se peut même le faire qu'on
 le retire par la paille, si on a l'intention de le passer
 en qu'on le retire simplement qu'on
 le retire par la paille, si on a l'intention de le passer
 ingérées et faire pénétrer au liquidateur
 le liquide que l'on y porte. Sans cela on
 le fait de la sonde d'acier, qui ne diffère
 en rien des autres, si ce n'est qu'elle est plus
 petite, qu'elle présente un petit rebord pour
 la fixer, puis ensuite qu'elle y adapte
 de trois petits diaphragmes pour la fixer
 dans les points lacrimaux.

Maladies de l'appareil

Secundo
 27 Journal

Solitaires

1.° on ne connaît guère les vires de
 conformation, si ce n'est que la glande
 présente peut manquer ou au contraire
 exagérée; puis qu'elle peut augmenter de
 volume sans être malade, ce qui se trouve
 confirmé.

2.° Les altérations organiques sont toutes
 pour la glande parotidienne, les accessoires
 sont plus ou moins point de vue de l'infirmité
 Elle est susceptible d'inflammation qui, au surplus, se
 peut être de quatre espèces, 1.° essentielle, 2.°

15.
 3
 02
 1.3

à la récession dans le commencement des - 286
fièvres adynamiques, la 1^{re} d'antimoine.
Elle est connue alors précocement, qui avertit
à un moment symptomatique. avant même que la
fièvre soit manifestée, ce qui est
très important et annonce le caractère de la
maladie, l'autre qu'on trouve est avantageuse,
il y a que l'antimoine qui peut bien
passer l'être. D'après le traitement est la
même, qui consiste à donner toutes les applications
excitantes, si on a des indications de la
cette deux espèces de fièvre - être réunies et
mélange, sur flg. la poudre de menthe,
cellule cantharide avec l'acétate de
l'antimoine, lorsque la maladie est en période
pale, elle est terminée et de la perspiration,
que quand elle est de la fièvre est inférieure.
L'ouverture du piquet, fait avec des instruments
tranchants, au lieu de cantharides. de la
de la maladie n'est point encore bien
fixe, il y en a qui prétendent que la
maladie réside dans le tissu de la glande,
d'autres dans le tissu cellulaire qui la
recouvre, l'apex est un point admette
qu'elle peut avoir lieu dans l'un et l'autre.
on ne doit avoir la préférence quand il est
superficiel. plus au profond encore l'irritation
se porte sur les mamelles chez les femmes.
Cancer affectueux de la glande
parotide.
Il est susceptible d'être encore affecté de
la même maladie qu'on le reconnaît
par le gonflement de la glande par son engorgement
au gonflement qu'il est facile après la
mort par l'inspection et par l'écoulement.

15.

3
02
1.3

288
Pungentia
Dilatation
Hic a manifestation non squame, celle qui
est, puis son état cancerux.

La manifestation non squameuse est de diff.
espèces. tantôt la g. lante ou l'endurcissement
légère de la tumeur, et, prendre un volume
considérable par l'agglomération de la g. raide
chevelue, apr. le rétro-sébum, et d'alt. de la
qui envoie sur chaque un exemple, car
qui est applicable à toutes les autres glandes
car on l'a vu dans celle qui est faite par
le volume considérable de la tumeur de
Malade.

Signes : On ne peut guère reconnaître cette affection
par le toucher, on reconnaît seulement la
glande, et malade par le gonflement qui
se présente, qui n'est pas une inflammation
de l'hydropisie existant dans l'écoulement cellulaire
qui peut exister, en d'autres maladies.

Traitement : On peut agir par l'emploi des résolutions
et, les applications mercurielles ou par les
résolutions de manifestation, mais lorsqu'on
dans les
de manifestation peut paraître que la partie peut se prendre
squameuse. Si le Malade veut du débarrasser les uns
d'écoulement, peut faire usage de l'emploi
de caustiques, de l'usage de l'extirpation.

Enfin il est des cas où la glande parotide
est primitive. le caractère cancerux, ce
qui présente un très grand nombre de
foies, pour la quelle les praticiens disent
un épanchement fait l'extirpation, car si l'on
le veut, de l'usage d'un protège-
comme tout plante ce qu'on espère
un cas est difficile d'expliquer de l'usage
d'après la manière d'être de la tumeur, et l'état.

La suite faite. On peut dire seulement 288
sible, cette suite, qui n'est qu'une
de précaution, attend un qu'il n'est point
facile de la faire, pour la quelle on
peut même point donner de règles à
ce sujet, attendant les grands rapports avec
les auteurs qui les ont données, et les autres
facteurs, qui doit être l'opinion des
savants, anatomiques et l'usage
du Chirurgien.

De l'arrangement de la Salive.

De la situation de la Salive.
La situation de la salive dans les glandes
salivaires, on doit en avoir une idée, et
presque toujours bien par un autre.
en chirurgie c'est ainsi que cela s'en fait par
la présence d'un calcul, ou la formation
d'une cicatrice qui arrive par la suite d'un
ulcère, ou même d'un corps étranger
dans le Ductus, et ainsi qu'on la
peut voir une dépression dans le canal de
l'organe, voir l'avis en rapporté un exemple
aussi que M^r Dubois qui en occasion
d'un calcul une dépression dans le canal.
La situation de la salive produit une
différence suivant le lieu où elle se trouve.
Lorsqu'elle est dans les glandes elle est tenue
dans le canal de la formation d'une tumeur
et se dans le canal, elle les distend
dans le canal et en même la grandeur de
pour le canal de l'estomac, par suite de la
des fistules pour celui de l'urètre par
la rupture, attendu qu'il n'est pas

15.
02
V.3

Leander
28 Permina

Paula

Liger

reconnaître.
Croitement. Pour y remédier on a cherché à étaler
le sang dans son état naturel, par l'usage
du Nit. Dans son usage qui est abondant
maintenant. Depuis que l'on en a fait
nature, attendu la difficulté de l'extraire
par la distillation qu'il présente. On a cherché
à établir un sang artificiel, qui aussi
difficile qu'il est difficile à faire. On a
une fistule parotide qui ne doit point
considérer comme telle, puisqu'elle est
ce qui existe. On y a mis par l'usage
des canotiques et des instruments. Mais
il faut mieux avoir recours aux dérivés,
parce qu'ils n'ont point de malade.
Il ne s'agit pas pour faire une simple

incision dans le conduit, car les parois
se réunissent bien vite, il faut faire
une incision, après quoi même on
utilise une petite portion par la moyen
des ciseaux. Si on y parvient par la
perforation, on retirerait mes deuxièmes.

Prostatite de la salive dans le
canal prothétique
Elle se reconnaît par la présence d'un
dure tumeur sur la face qui se fait ligne
surtout lors d'un changement de l'écoulement
provenant de la glande, d'un peu dans l'intérieur de
la glande, d'un point abondant cette

est la cause après urine il faut la réséquer
le plus possible, crainte de la formation
de fistules salivaires, qui est très incommode
quand elle est bien établie, par la
perte continuelle de la salive sur la
joue, assésant. Et quand on la reconnaît
la tumeur l'écoulement à l'intérieur pour
d'écoulement issue au testis à la verge, crainte
d'un problème la rupture d'un parier fistules de
à l'intérieur, qui établit une espèce de conduit de
fistule par laquelle s'écoule la salive. On peut
par être même l'écoulement de la salive
le canal par l'introduction d'un fil
mais il est très difficile de l'introduire,
mais quand même on le ferait il pourrait
être bien le faire qu'on fait et former
craintes, par la résistance qu'on le résiste.
Parce qu'on ne peut pas le réséquer
nature de la tumeur, il est très rare

15.
02
4.3

299 quelle, crasse intérieure et qu'elle soit
en rétro, ce qui traverse la salive
à côté, qui cause une maladie par
quelle on ne s'aperçoit point si elle
à l'intérieur, puisqu'il importait pour
prospérer.

Il faut se faire aussi que la grande quantité
de la grande et de la petite, ce qui arrive quelquefois
elle même à la suite de la grande par la division
d'une petite division de la grande. On la
conserve reconnaît-elle alors par la suite d'une autre
signe.

quantité de la grande parvenue au plus
amplitude qui la traverse et qui se trouve
au dehors au lieu par un trajet direct.
S'il y a plusieurs méthodes de traitement
qui sont plus ou moins réussies, ce qui est
plus facile que pour le traitement de la grande
et de la petite par la grande, la grande et la petite
et la grande.

1. La cautérisation a été proposée pour les
en premier lieu, puis par les cautères, et
par la cautérisation des parties à raison qu'elle est
par la grande.

2. Les injections ont été proposées par la grande
dans le cas de la grande.

3. La cautérisation a été proposée par la grande
associée aux moyens chirurgicaux, qui est la grande
avec le sang et les moyens mécaniques.

Les parties de la grande et de la grande
par la grande et de la grande. Les parties de la grande
à la suite de la grande et de la grande. Les parties de la grande
à la suite de la grande et de la grande.

Il est ~~assez~~ difficile d'intercamenter l'un
celles de la patate, l'autre l'autre prolong. Ligne
qu'elle a l'air de macérer, et l'autre au contraire
pour par une compression qu'elle ferait
en presser, si alors elle dépendait de l'autre
la fatigue ne s'augmenterait pas, au contraire
encore peut-être de l'intercamenter d'un
blut dans le conduit, mais cela est
très difficile, alors on se servirait de blut
de l'égout, en même temps que l'autre
un peu la même méthode, pour faire
disparaître la leucorrhée, qui ferait le conduit,
obscurité faite pendant.

La leucorrhée de la leucorrhée au contraire l'écoulement
de la leucorrhée de la leucorrhée de la leucorrhée.
La leucorrhée de la leucorrhée de la leucorrhée.
La leucorrhée de la leucorrhée de la leucorrhée.
La leucorrhée de la leucorrhée de la leucorrhée.

La leucorrhée de la leucorrhée de la leucorrhée.
La leucorrhée de la leucorrhée de la leucorrhée.
La leucorrhée de la leucorrhée de la leucorrhée.
La leucorrhée de la leucorrhée de la leucorrhée.

La leucorrhée de la leucorrhée de la leucorrhée.
La leucorrhée de la leucorrhée de la leucorrhée.
La leucorrhée de la leucorrhée de la leucorrhée.
La leucorrhée de la leucorrhée de la leucorrhée.

15.
02
15

298 admet de suite, par l'effet de la pression
parce qu'il s'agit d'un canal ne pouvant
avoir qu'une seule ouverture. Malgré
cependant on a vu d'autres effets, il en est un
30° Formé par l'usage employé, attendu que la pression
parvenue à un certain point, l'écoulement du sang
avant que la cicatrice soit formée
par le mélange de la compression aux autres
qu'on la fait. On le conduit, entre l'écoulement
et la glande, mais il s'écoulerait sans la
faire sur la glande, parce qu'on a remarqué
que c'est en la supprimant la sécrétion.
ne peut être pas toujours à l'écoulement
avantage, puisqu'il peut se faire, par
qu'un canal, lequel, les artères s'écouleront.
Il y en a qui ont dit que dans le cas de
la division du conduit par une pression
externe, il fallait en procurer la réunion
par le moyen d'une suture, mais qui ne
peut pas attendre la solidité de la partie
et de la différence de la cicatrice.
Enfin l'auteur imagine qu'un canal
est établi de la salive par la dilatation
du canal de la même manière que cela se fait
par les autres conduits, d'une fin, il en est
la suite de l'écoulement de la salive, et de
auquel se trouve attaché un fil qui est
conduit avec un petit fil de soie, qui est
fait avec une brasse de soie, jusqu'à
le doit s'écouler, ce qui force à passer la
salive dans le conduit. On peut appliquer
un petit emplanture agglutinant sur la fin
écouler que la salive ne passe. On peut
pratiquer ce procédé, s'il n'y a rien de
la cicatrice, que quand il ne réussit pas.

293. 3^e La Compression. Elle se fait de la même
manière sur la glande que sur une cantharide
avec des petites compresses graduées, maintenues
par le bandage anné. On en doit y avoir
recours qu'on ne se laisse aller à tout infliger
sans s'arrêter au malade. L'usage du bandage est
la cause de la gêne, ce qui est une grande
inconvénient; l'usage du bandage doit être
suspendu un certain temps pour qu'il ne
soit d'usage que en cas d'urgence pour les
qq. il occasionne des douleurs très vives et
très sans doute à la compression des vésicules
ce qui fait qu'on ne doit s'y employer que
dans le cas où on ne doit être lésé quelque
peu relatif au lieu de la lésion par les vésicules
naturelles, on pratique une fistule interne.

Affections de l'appareil Biliaire

Elles toutes appartiennent à la médecine
il y en a qui sont du ressort de la chirurgie
qui sont les dévies et les rétentions de l'urine
Nous allons successivement examiner les vices
conformation, affective, organique et la
dérangement de fonction.

1^{er} Vices de conformation. Les
qui sont souvent guéris, on ne peut en dire
que son changement de place, mais son
état est au dessus de tout remède.

2^e affective - organique du foie.

Elles sont très nombreuses, mais toutes il
y a les aigus qui doivent nous occuper
celles des organes qui se passent au sujet de
la bile sont peu nombreuses.

Elles du foie les aigus du foie se manifestent de
façon

un très grand nombre de circonstances
succèdent l'un à l'autre. Les causes
qui la produisent sont très variées, les uns
en produisant qu'une inflammation locale
d'une cause locale ou de l'attaque que le froid
amène dans l'air de laquelle tout
très vite et très intense.

L'inflammation qui attaque le pericardium
du cœur porte souvent l'hypothèse ou l'apoplexie
dans tous les cas, mais n'est pas la même.
Les causes qui y donnent lieu sont très
nombreuses, les uns sont générales, tel que
l'altération des humeurs qui naissent
parce ainsi dire que prédisposantes, alors
qu'il faut une autre cause parce qu'elle
se déclare, cette espèce d'inflammation appartient
à la médecine 2^o l'application de
surpression, tel qu'un coup; mais cette
compression ne fait que prédisposer
en elle-même le tissu du cœur, cette
dernière espèce parait plus vraisemblable,
regardant le plus légère compression peut
donner lieu à l'inflammation. 3^o Elle peut être
déterminée pour des causes particulières
telles que l'écoulement de la suite des plaies plus
ou moins éloignées, adhérences -
lésions qui peuvent produire cette inflam-
mation surtout celle qui est produite par
le corps contondant, ou par la pénétration
dans les plaies d'un corps à son intérieur
autres parties, par conséquent d'origine locale.
L'inflammation du cœur a été l'objet
de la formation des septes au cœur.

15.
3
202
N.3

207

18 Bianchi pensait que les gens qui font collection dans les faibles neurent du Peste qu'il avait été déposé là par suite de métastase; mais ces idées ne s'expliquent que complètement qu'à l'effort d'un autre côté on ne saurait expliquer de communication du virus au cerveau. 20 Aré par le contraire de l'effort d'effort. Il lui paraît maintenant qu'il y a sympathie, c'est à dire la même opération, puis qu'on admet l'effort d'effort de la sympathie.

30 Forteau et Bertrand pensent que lorsque l'un ou l'autre porte le virus dans la circulation y était déposé, d'un côté une sténose partielle, en disant que l'un des membres inférieurs était un membre grandement affecté admettait que le sang de la veine s'écoule restait dans la

Alors comme l'effort est très grand on envenime au point de vue de l'effort cette théorie peut être susceptible d'être affectée d'une sténose artérielle.

40 David supposait que l'effort d'une communication au cerveau se faisait par la circulation artérielle qui se rendait dans le cerveau par une sorte de siphon dans l'artère descendante et disait qu'en la faisant reculer une grande quantité de sang, il devait être porté à cette sténose artérielle. C'est donc l'hypothèse d'un siphon qui se fait comme un peu rien, un siphon qui dans la communication de l'effort la circulation soit diminuée. Vient à l'esprit qui à l'égard de l'effort

avait pensé que dans tous les cas il y
avait un symptôme au fait, que cet organe
avait été frappé de commotion. Cette
opinion a été adoptée par un assez grand
nombre de pathologistes, mais il est dore
de doute que les symptômes en sont si simples
que dans les plaies de tête les plus simples
et dans les plaies d'armes à feu, alors
on ne peut pas admettre un ébranlement
général. La plupart des modernes pensent
que cette souffrance est déterminée hypochondrique.
Les signes qui annoncent l'épistaxis sont
une douleur dans la région hypochondrique
droite, qui se communique au côté opposé
de la poitrine et de la région de la nuque
côté gauche. Il y a souvent fièvre
continue, jaune de l'habitude du corps, fièvre
plus ou moins intense, accompagnée
de symptômes généraux, q. souffrance
plus intense, tant les signes sont variables.

Les moyens à employer sont — Et intérieurement
entièrement du d'arsenic de la médecine.
L'infusion peut affecter différents
te, refroidissant, le plus souvent, alors les
diètes pensent l'inspiration dans tous les
points du feu, et faisant une infusion
de saucisse dans l'addition et d'inspiration
le mot de q. l'inspiration fait dans
le intérieur, dans l'estomac, et y. l'inspiration
à la surface externe, q. l'inspiration
dans la poitrine, l'inspiration à la
partie antérieure, il tendent à se manifester

15.
202
N. 312

na v de ce que, alors si l'épanchement se 300
fait dans l'utérus il produit promptement
la mort.

La tumeur et la spume peuvent déterminer l'issue
de cette situation, cependant on a guéri en
regard qu'on s'oppose, mais le plus commun
cette situation tient à une cause mécanique.
On conçoit que l'engorgement de certaines fibres
pourrait y donner lieu mais le plus
communément c'est des causes qui
viennent au-dessus de la vessie du
fœtus et suivant le lieu où il se tient.
On produisant des effets différents. Quand
il est en regard de la vessie, un calcul tombé
dans la partie supérieure de cette partie peut
faire supposer le fœtus avancé et l'issue de la
cavité du calcul peut le présenter à l'issue.
et interrompre l'écoulement de l'urine. Si
un calcul se trouve dans la vessie, il peut
encore rester dans le conduit urinaire, alors
la vessie se peut alors se dilater, et l'écoulement
de la bile de la part du fœtus. Cependant
dans ce cas la vessie se remplît et se
distend, alors la plus grande quantité de
fluide ne tient qu'un moment que l'urine
la membrane ambrée qui la recouvre. Si
aucun autre le calcul s'arrête dans le
conduit urinaire alors la bile s'écoule
facilement du fœtus dans la vessie mais
l'écoulement de la bile se fait et dans la vessie
du fœtus et dans le fœtus. Cette situation
survient pour l'écoulement de la bile
quand la vessie est très distendue,

15.

202
N. 202

tantôt elle contracte adhérence avec la
paroi avec les parois abdominales, on
peut que cela ait lieu, et faut qu'il y
ait une inflammation plus ou moins vive, alors
surgissent qu'il y a adhérence ou non, il
résulte des effets différents. Quand les
parois de cette poche se resserrent, la séquestration
est en adhérence entre elles et les parois
abdominales, alors le fœtus se sépare de
cause et termine la mort. Si au contraire
il y a adhérence, la rupture se faisant de
cette partie, la fille se sépare dans
toute sa longueur de l'abdomen, qui y détache
une incision, par suite des dépôts, dans
l'importance d'un peu de des dépôts,
rétraction de la bile n'est que d'un anneau de
la chienne, quand les dépôts se manifestent
à l'extérieur.

Signes

Dans le commencement il y a toujours
distension de la Vessie du fœtus, qui
est toujours en une grande plénitude de
l'urine, et se sépare, qu'on ne pourrait
s'expliquer qu'à l'aide des dépôts au fœtus
symptômes causant une tension de
l'organe et une adhérence au fœtus.
L'urine s'écoule par une ouverture égale
la couleur de matière fécale, mais
est de peu de valeur, parce que la
rétraction ou pression de la Vessie
du fœtus s'empêche de la cause de cet
qui vient directement du fœtus.
Sans supposer qu'il y ait une fœtus
présentant sur son existence, alors on
la distension de la Vessie, qui

cardes d'ail n'y a point d'adhérence d'adhérence 392
la mort et au contraire lorsque cela
a lieu d'adhérence des dépôts d'adhérence
d'adhérence en fistule alors on peut dire
que pour éviter les suites fâcheuses il
faut éviter la suite plaire par un trépan
dans la fistule pour évacuer le pus
qu'il contient. Le fétit ayant reconnu
une tumeur formée par la fistule
du fétit croit aussi qu'une tumeur
est formée une adhérence avec une fistule
et qu'il s'agit d'un pus jusqu'à ce qu'on
aient disséqué les parties de la tumeur
tumeur d'adhérence adhérence et grande
tumeur après l'indication d'une grande
quantité de pus par les selles. On
peut attribuer cette disposition, à ce que
la tumeur était produite par un
calcul qui alors dans le moment qu'il
produit l'adhérence, passe subitement
dans l'intestin, qui peut bien tenir à
l'espèce de spasme dans lequel entre
le calcul qui en fait symptôme.
J. B. Petit alors attribue à l'adhérence
au il y a adhérence de la fistule de
fistule paria abdominale, alors il
indique son immobilité, son rapprochement,
d'adhérence, dans toutes les tumeurs
qui lui sont données à l'indication
mais ces signes ne sont pas constants
il est difficile de reconnaître s'il y a
adhérence ou une tumeur. Dans cette
incertitude doit on avoir la tentation
ou non d'adhérence de faire cette

in
la
tumeur
ou
cette

15.
3
02
N. 5

remettre il la même manière alors
 peut la faire en tout temps, et qu'elle
 réussit, on enlève, en se servant de
 bistouri.

Si on est appelé pour un induréc
 au'il s'y est fait une croûte et qu'elle
 s'ouvre dans l'épaisseur des parois de
 l'abdomen. On y a supprimé que la tumeur
 contractée adhérence avec les parois de l'abdomen
 alors que la tumeur est en pleine croissance
 ou s'infiltre par l'abdomen, mais bientôt il
 survient une inflammation assez forte pour
 en dériver qui se forme l'abdomen dans
 une tumeur d'une issue à une tumeur
 qui se fait facilement reconnaître, qui
 tient à l'épaulement de la bile et même
 qu'il y a une des tumeurs calculeuses
 peut se former et dans la tumeur calculeuse
 la tumeur.

Ces sortes de tumeurs surviennent communé-
 ment les autres, cette opération donne
 issue à une quantité plusieurs années qu'il
 s'agit, qui s'agit de la tumeur qui se fait
 alors on enlève l'abdomen qui s'agit
 de l'abdomen la tumeur survient si elle est
 calculeuse dans l'abdomen calculeuse mais
 être assurée l'abdomen, on s'en sert
 fistuleuse alors si on reconnaît l'abdomen
 dans l'abdomen dans la tumeur de la tumeur, de
 ce cas il s'agit souvent de la tumeur
 l'abdomen; mais communément l'abdomen
 opération. Aggrandir la tumeur, et
 si l'abdomen n'est pas dans l'abdomen
 itoune alors il s'agit de la tumeur qui se fait
 un grand incision. fit communément les
 fistules dans l'abdomen de l'abdomen, et

Le C. est inconvenient auerit qu'il se voit
plus avantageux d'éditer la fistule et
induite. Distraire les calculs avec des
tenettes au des sines. Quand à la rétention
de la Bile dans la foie, elle est pas
de notre objet.

Affections de l'appareil urinaire

Il y a tout très nombreuses, nous allons
seulement parler des Vies de conformation,
des affections organiques et des dérangements
de fonctions.

1^{re} Vies de conformation.
D'abord les reins sont susceptibles d'augmenter
être affectés, tel que les variétés, les
anomalies de fréquence, qui peuvent être
diminuer ou augmenter en nombre, mais leur diminution
les variétés se remarquent qu'à l'inspiration
ce désigne d'ailleurs quand même on les
de conformation, on ne pouvant pas y remédier.

2^{de} Les Vessies. Elles sont de deux espèces
généralement tant isolément dans la Vessie,
d'autrefois en un tronc commun.

3^{de} La Vessie. Les Vies de conformation
sont plus inquiétantes que celles que nous
l'empêchent d'arriver. Elle peut être 1^{re} Double
et dans ce cas il n'existe pas toujours des
vessies distinctes, il y a que l'intérieur qui
est divisé, et dans quelques cas on en trouve
mais ce vice est très rare. 2^{de} Elle peut être simple
qu'il y ait des parties qui s'élèvent seulement
comme adhésions comme être en rapport.
un exemple, soit état de peu de parties
reçues pendant la vie, par conséquent
un organe pour le moins, la Vessie peut
être entièrement absente, alors les urines
s'écoulent au dans l'utérus, au dans le

305 Vagin, au bas dans le rectum, sur lequel
est une très rare. Si cela existait dans chaque
homme, le canal de l'urètre existerait-il?
S'ouvrirait-il encore pour transmettre l'urine
au lieu de rien. On présumerait facilement
ces choses. Si l'urètre manquait d'organe
suffisant pour que l'urine déboulât par le rectum.
Dans la femme l'urine s'écoule tranquillement
dans le Vagin elle s'écoule continuellement
et sans interruption. Enfin dans beaucoup
la Vessie déverse par une ou plusieurs
ouvertures sans rien dans le canal de l'urètre,
quoiqu'il en soit à un très petit nombre
d'exemples. 11. La Vessie peut manquer dans
un de ses points et il plus communément
est à la paroi antérieure, avec cette
perte de substance, coïncide toujours une
ouverture aux parois de l'abdomen, dans
les bords de l'urètre l'autre ouverture est
contacte à l'urètre. On prétend que quelque
fois les enfants qui viennent au monde
ont une telle ouverture qui s'écoule l'urine
dans le rectum de même qu'on au passage l'urine
de l'acécéphale. La partie postérieure
d'une partie du bas fond de la Vessie forme
l'urètre, qui se présente dans l'aspect d'un
tubercule pour l'urètre, recouvert de
une membrane muqueuse rouge, l'urètre
présentant des rides, qui sont en sautoir
pour une tumeur, turgescence, mais dans
le cas de l'urine l'urètre se contracte qu'elle a que
l'urine sur cette surface, d'ailleurs avec
cet état coïncide d'autres maladies et que
la mobilité de la symphyse du pubis
est comme il semble être un point d'inter-
férence. Ce lieu de conformation coïncide

79 ft. avec taterminaison du canal de 306
bretes à la racine de la mer.

Il n'y a rien à faire ni à la suspension
des conformations du fœtus, ni au lieu de
conformations delaginitation. Quand
la pelvienne doit au l'acide T. han, ou
l'instruction ay ont une certaine étendue
commencement pourroit au la manifestation
réduite. Si les individus qui ont en ces
pièces de conformations ne sont pas morts,
ils ont été forcés de garder entre
toute chose plus que les autres vivants.
L'un s'enfuit à la surface.

Les Stries à la surface.
 1^{re} Grande art. Vies de conformation
 de la lutite, nous y reviennent en passant
 des affections des organes de la génération;
 2^o Affections organiques. -

1.° Les Rives. Elles sont assez nombreuses, mais toutes à l'exception de celles qui peuvent succéder à la néphrite et qui sont à l'extérieur, sont étrangères à la calcaire; car ces dernières se trouvent à l'intérieur de la province de Calcutta, ainsi qu'il résulte de la présence de calcaire dans les rochers de la province de Calcutta.

20. Les bractées, les Spathules et les calices
sont susceptibles d'un très vif nombre
d'affections organiques et inopprimables
et sont toujours de la même de culture.

3.° De la Pessie. Différentes espèces nombreuses
et appartenant tant à la médecine
qu'à la chirurgie. Dans la Pessie nous voyons de la
lin est enragée. Dans la Pessie nous voyons de la
adonne à examiner les altérations morbides
occasionnées de la membrane séreuse, qui la Pessie.
sont semblables à celles du Pôitane, etc.

301

peut être cassée, à la quelle on a donné
le nom de cystite, qui est qq. accompagnée
du dérangement des fonctions de la vessie
telles de rétention, ou au moins différentes
durées. ce qui se remarque également dans
les cyst. chroniques du péritoine. 2°. Du tissu
cellulaire intermédiaire à cette membrane et
à la tunique charnue, on a été en différen-
ces de cette des autres parties supérieures
même affectées par l'inflam. sup. de la vessie
à se propager, d'où la pousse qui se dépose
qui se succèdent tant très graves et même
mortelles. Mais inflam. du péritoine du
bassin ne s'arrêtant que dans de grands
délabrements, cas. q. des chutes, q. des apoplexies,
qui se propagent sur le bassin, telle que
l'opération d'excision de la tunique etc.

Des Depôts
Vésicaux

Dans certains cas il se forme de très
petits dépôts entre le péritoine et la tunique
charnue sans doute sans tissu cellulaire
qui lui est intermédiaire, mais qui en
caractérise les causes, on en a vu en
association de ne les remarquer qu'à l'autopsie
cadavérique.

2°. La tunique musculaire. Elle peut
être affectée se régénérant, mais elle est
très rare cependant dans qq. circonstances
les vaisseaux de la vessie ont un volume
assez considérable, on désigne cet état sous
le nom de vessie à colonne, qui sont
les parties les plus des autres, plus de moitié
qui sont susceptibles de se remplir de réceptacles
à des caillottes urinales, ce qui constitue
une sorte d'obstruction ou d'arrêt de l'urine
des pierres de la vessie, 2°. Elle peut prendre

Des colonnes
charnues de la
vessie

un accroissement d'apartenance dans les 308
points, est état acquis de tout autre chose
un rétrécissement dans la capacité de ^{apartenance}
la flexion des causes sont des anciens catarrhes ^{de la} paroi de la
la présence d'une pièce dans la flexion ^{de la} paroi
pourrait indiquer les cas ou les collants
apartenance sont affectés.

4.° Affection organique de la
membrane muqueuse.

Elle est commune au septième, huitième,
la 9.° qui se présente et son effet
qui peut porter un caractère aigu et ^{Inflammation}
chronique, nous allons de suite examiner
les affections aiguës et les pharyngites
aiguës. De l'inflammation nous ne pouvons pas en
indiquer le siège précis, elle peut être
localisée dans les corps mous, de la cavité
ou à leur surface, il y a toujours inflammation
d'origine, bien que la 10.° dépend de la
la flexion ne peut pas se contracter et dans
la 9.° au contraire elle tient à une adhérence
mécanique, 9.° et 10.° deux états distincts
réunis.

Les causes qui y donnent lieu sont
générales, telle que l'impureté du sang
du péricrâne, les contusions, mais les causes
générales sont très rares, parmi les autres
causes, sont le rétrécissement de l'orifice
vieux, car, dartres, gales, cette 9.° donne
plus fréquemment bien à une inflammation
Essentiellement il y a inflammation de certaines
substances ^{générales} fibres. De certaines fibres
que les catarrhes, qui agissent lorsque

Cancer

15.
3
02
V.3

Grand de la rétention est complète, lorsque
le malade éprouve le ³¹⁰ de difficulté
uriner, mais dans ce dernier cas il peut
disparaître très promptement, le cathétérisme
serait fastidieux, si fréquemment agiterait le flux
de la vessie, d'un autre côté une
introduction serait difficile.

Lorsque cela est nécessaire, qu'on est
parvenu à introduire une sonde dans la
vessie, faut-il la retirer tout de suite
ou bien la laisser séjourner, malgré la
sortie de l'urine? L'un et l'autre ont leurs
avantages et des inconvénients.
1. Si on la laisse, l'écoulement est évacué
librement et sans douleur. Mais a-t-on avantage à
transmettre l'inflammation qui résulte de
la présence continue de la sonde, de
des parties inflammées, et si au contraire
on retire la sonde, on n'aurait pas qu'elle
provoque l'écoulement, cependant il paraît
plus avantageux de la laisser séjourner
dans la vessie, et on croit que dans les cas
où l'on l'aurait retirée, l'écoulement
de l'écoulement s'augmenterait, qu'on
l'aurait allongé du poids de la sonde, on
peut se passer de celle de gomme
élastique, mais on ne doit pas
légèrement l'employer, on peut s'y opposer
l'employer, on ne doit pas l'employer.

Des hémorragies.
On ne parle pas de ces hémorragies
qui dans ce cas sont désignées
dans l'écoulement, on ne les croit pas
par la couleur rouge de l'écoulement qui.

15.

3
202
N. 3

31^e Vient alors très rouge, mais le sang peut
avoir différentes couleurs, tel que les reins
ce qui se remarque chez ceux qui ont fait
Cause une marche forcée, fait à pied, tant à
cheval. Dans ce cas le sang qui est le
siège de l'hémorragie métrique plus d'un
grande quantité de sang, qui se trouve joint à
une grande quantité de sang, en sorte
il y a sentiment de pesanteur et d'inconfort
dans la Vessie, cela peut également servir
lien dans l'urémie Vessicale. C'est
un autre point prochain des urémies.

Signes

Quel qu'en soit la cause, le sang produit
un sentiment de pesanteur et une urémie
fréquente de la Vessie, laissant l'urine
entraîne avec elle de petits caillots de
sang, qui se sont formés dans la Vessie, et
si les caillots sont trop gros peuvent
dans le canal de l'urètre s'écouler par quelques
lacrifices internes et déterminer la rétention
de l'urine. D'autres fois ils peuvent donner
lieu à des calculs, alors il importe
de porter des secours avant cette
époque des saignés générales et locales, l'usage
des bains froids sur la région pubienne

Pratiqué

des bains rafraîchissants, sont les
moyens qui conviennent. Quand il y a
rétention point il faut avoir recours aux
injections de liquides un peu froids ou
d'un peu tiède. Si ce sont des liquides
froids dont on se sert, il ne faut pas
qu'ils le fassent trop.

Affections chroniques.

3. 82. Léger et subtil

La Vessie, qui surmarche, est leathorche. ^{Catarrhe de la vessie}
De la Vessie, qui est mélat dans la quelle
la membrane muqueuse sécrète un fluide
uniquement plus abondant que de coutume
sans que pour cela il y ait inflammation, q. q. uns
pathologistes prétendent qu'il y ait une
si elle existe au v. n. d. i. r. i. e. n. ^{fl. de surmarche}
surtout chez les personnes qui se donnent pour
de mouvement, ou celle de l'utérus, de l'abdomen.

Les causes qui y donnent lieu, tant le ^{Cause}
léger de l'urine p. m. p. d'abondance dans la
Vessie celle d'une pierre ou d'un d'un calcul,
l'affection d'une partie d'organe qui agit d'impuls.
sur la membrane muqueuse de la Vessie latérale
cela peut être essentiel, c'est à dire indépendant. ^{Signes.}

On la reconnaît par la sortie d'un
fluide. On ne s'en rend pas compte en plus ou moins
quantité, en rendant les urines, qui se précipite
aussitôt au fond du vase, qui paraît incessamment
à la superficie. Des certains v. n. d. i. r. i. e. n. e. s.
du Dabtrus, sporique, qui ont fait longtemps
usage du coït, qui ont un Rhumatisme,
la goutte, le g. g. est Vesiqueux, g. l'utérus, p. n. s.
g. g. le sentiment de pesanteur de la Vessie.
qui n'est aussi certain que pour un calcul.
La quantité et son aspect paraît attesté
de manières à faire impossible pour le
sperme, quelques personnes ont le p. n. s.
ce qui a donné lieu à q. q. d'obstacles d'un
faire l'analyse, mais il n'y a point une
aussi grande différence entre une qui n.
ne peut si méprendre, attendu quelle
n'est pas traversée que pour toutes les
autres substances, excepté les fluides a. n. l.

15.
3
302
V. 3

213 Une très grande analogie, qui s'explique mieux
par la vue, que par les expériences chimiques.
Traitement. Toutes les fois que le catarrhe chronique
de la vessie ne se guérit point, il peut
devenir funeste pour un long temps -
continuée qui peut faire tomber les
malades dans un état d'épuisement aisé,
il faut donc tâcher d'écarter le malade
le plus tôt possible, en agissant en
consequence des causes qui y ont donné
lieu, soit la rétention de certains
virus, il faut tâcher d'agir sympathiquement
sur la vessie, tel que par l'application
d'un pommade à la partie interne des
cuisses, d'un cataplasme, il faut en faire
des extractions. On peut encore faire des
injections dans urinales, qui doivent être
légèrement tièdes, ce qu'on doit faire avec
précaution, pour ne pas donner lieu à
une excitation trop vive, qui deviendrait
funeste; on peut aussi en faire prendre à
l'intérieur pour relâcher le muscle, qui est
légèrement, purgatif. Comme une campagne
que le régime dans les lésions, quelle
cause des douleurs plus fortes, il faut
remarque de rester le moins possible.
Autres affections organiques

1^{re} La dilatation de l'urètre l'urinaire
spécialement à la membrane muqueuse de
cet organe, quand on peut guérir
soin pendant la vie, les urinaires
2^{de} Les Polypes, des fongosités de la

de la muguerse de la vessie, qui sont — 334
désignés sous le nom de *phlogos*, qui
correspondent *gft* avec l'existence d'un
calcul, mais qui peut aussi exister dans
lui.

On n'ignore entièrement les causes *Causes*
qui peuvent survenir spontanément, qui
même au les combattent; cela se
fera rien pour le traitement, qui peuvent
se guérir spontanément.

Il est difficile de reconnaître pendant que
la vessie, qui s'arrête *tp* quand elle
est dans une situation, dans l'urètre,
dans l'urètre, dans l'urètre, dans l'urètre,
qui donnent *gft* lieu à la situation de
l'urètre dans la vessie, par une présence
trop proche de son col, qui *gft* impêche
à sa guérison puis *g* faire sentir une
douleur, qui étant introduite si dans l'urètre
avec, jamais une autre ne sentant de
douleur car les calculs, *gft* ils donnent
lieu à la lésion d'une certaine quantité
de sang, mais cela n'est qu'instantané.

Il n'y a aucun moyen de remédier *Contre*
au car point tant au plus qu'en faire
l'interprétation, qui alors exigent quand
form l'opération d'une manière
que par un calcul, si ce n'est que pour
le séparer de la vessie, mais qui ne fait
très rarement, qui ne peut se guérir
qu'en fait l'opération l'urètre.
et qu'en en faire, encore tant les opérations

313 ne le fait il pas, comme le rapporte
M^r. Deschamps, dans son traité pour
cet article, attribuer qu'il peut insinuer
des sentes fausses, car l'ignorance d'une
certaine ignorance de la vessie, qui posent
entraînerent ce qui d'arriverait à un
l'épanchement de l'urine dans le tissu cell.
de la vésicule de l'épithélium, au lieu
comme humoreux, ce qui fait qu'un afflux
pour la guérison les effluents arrivent avec
peu de peine pendant quelque temps, jusqu'à
ce qu'ils ne servent la vésicule.

3.° Des Vescies. Il y a deux espèces
certaines, l'une qui est en queue d'âne
et l'autre qui est en queue de cochon, qui se
trouvent fréquemment que la catarsis a qui s'oppose
dans la vessie, au lieu par la présence d'un corps
étranger, car, si l'on ne les reconnaît
pas, on les confond avec la catarsis, qui
peut la présence d'un corps, par la présence
d'une certaine quantité de matière purulente,
qu'il est bon de ne pas confondre avec la
catarsis, puisque la dernière est guérissable
tandis que la première ne l'est pas.

Traitement. Quoique nous disions qu'ils sont incurables
il est cependant essentiel de les reconnaître
et on peut les confondre avec cette d^e
affection, afin de ne pas faire des
opérations dans la vessie, qui ne servent
qu'à augmenter la maladie, plutôt qu'à
la guérir. Ils sont incurables, de la même
manière qu'un autre pour les vésicules
des reins, qui ont une partie de la vésicule
qui se trouve dans la vessie, et qui y a continuellement

l'impression de l'urine pour le urine 386
l'air pour les autres.

Des Calculs dans l'appareil Vénal ^{Leur d'au}

Ils peuvent se trouver dans les Bourses, le B. P. & le
V. & le S. & la canal de l'urine,
mais tant qu'ils ne sont point devenus
il paraît qu'ils sont entièrement dans les
rins où ils le restent & qui est très d'un
cause, puis qu'il arrive qu'il s'en trouve
dans les urines & qu'on ne peut
trop bien la manière d'être ils forment
ou ne paraissent tant au plus présumés
que leur situation dans les Bourses & le
urètre, & qu'ils font que par leur présence
se rendent dans la vessie. Quand à l'écoulement
il est bien possible qu'ils puissent s'en aller
sans, mais on ne s'en pas sûr, & qu'ils
forment spontanément, & qu'ils se trouvent
dans qu'ils peuvent s'en aller à la présence d'un
corps étranger, & qu'ils se trouvent dans le canal
tels que des hydatides & d'autres d'origine
qui caillent le sang, & qu'ils se trouvent dans
l'appareil & qu'ils se trouvent dans le canal de l'urine
au général sont plus fréquents qu'on ne
le croirait au premier abord, surtout
chez les femmes, & qu'ils se trouvent dans
considérable du canal de l'urine & qu'ils
sont, & qu'ils se trouvent plus fréquemment dans
en l'urine & qu'ils se trouvent plus fréquemment dans
tous les exemples de la sorte jusqu'à
dans les quels se trouvent infirmités de

27. *Irregularité* Dans leur existence, ces vers ont une
irrégularité.

On ne saurait cependant pas leur en
penser, qu'ils aient leur forme spontanée
malgré que quelques pathologistes admettent
qu'ils viennent dans des reins, puis que si
cela était elle, on aurait espérance de les
voir se plus fréquemment après l'opération
de la taille attendu qu'il ne leur feroit
pas qu'en leur dans ces derniers états.
D'ailleurs ne pourrait-il pas se faire que
cela en sorte de la même manière que pour
le testicule du fœtus, au il s'agit d'une
une quantité puis ne sait-on point qu'il
est assisté par l'air des callosités à des personnes
après avoir été traités, dans que plusieurs
elles aient senti la même douleur
qui accompagne le passage d'une pierre dans
les testicules, qui ont encore de très fortes
grandes enfin la présence des pierres
grosses dans le canal de l'urètre, causent
parfois un traitement des maladies de ces
canaux qui s'ouvrent dans l'urètre.

Comme dans l'écoulement de la pierre, dans
l'écoulement dans toutes les parties du corps, dans
les mêmes climats, puis chez toutes les
personnes indistinctement, sans être affecté de
la goutte, et sans plus d'explication etc.
Rabotier veut en l'age, c'est dans les
nature de la vessie chez les enfants et
les vieillards, au il se trouve quand on les
a dit qu'ils sont plus fréquents chez
l'homme, mais cela n'est point, si on

a occasion d'en tailler plus, cela se
tient qu'à ce que les pierres passent plus
librement par le canal du Pécrot, ce qui
n'a pas lieu chez l'homme, qui a ses dents
suffisamment pour la femme. D'ailleurs si on a
égard aux dentures végétales, elles
sont plus fréquentes chez elle. Sans
cependant il est difficile de le dire,
on dira seulement que les dentures sont
plus espacées chez les animaux, ils sont
plus fréquents dans les pays chauds et
froids que dans tous les autres; dans les
lignes froides, chaudes, et humides, cela va en
diminuant à mesure qu'on se rapproche
de l'équateur, ce qui est facile de constater
en comparant l'Espagne, l'Irlande, l'Angleterre,
la France et l'Inde. Quand on a l'habitude
il paraît que la goutte, le Rachitis et l'infirmité
générale, sont trois maladies qui se trouvent
plus souvent se former.

Trajet des Pierres.

Elles peuvent se former dans les reins
de suite, dans le Bassin, la Vessie et
dans l'urètre.

Il peut se former dans les reins des calculs
de calcaire, des graviers et des pierres
grasses. La présence des graviers dans les
reins est assez fréquente, qui
peut occasionner l'infirmité du rein qui
se fait sentir non seulement dans la région
lombaire, dans le lieu qu'occupent les reins,

359 les états, mais dans l'état, au canal de
l'urètre et au testicule même, qui seules
se trouvent tirés en haut par l'attraction
et l'écoulement de la semence qui agit sympathiquement
et qui empêche le passage de l'urine
par leur présence les douleurs néphrétiques
sont susceptibles de disparaître, par
l'usage de bains adoucissants, ainsi que
la sortie de fluides blanchâtres, qui
occasionnent la présence des calculs dans
l'urètre et occasionnent souvent une
suppuration de l'urètre, qui
se termine par suppuration aussi distincte
que rare. Dans des états rendent
On peut en venir, au lieu il peut former
dans le testicule une suppuration abscessive
d'où sort toute la substance du testicule
ou au moins une partie de l'abscessus
au lieu d'être dans l'urètre et former
ce qu'on nomme l'écoulement de la semence
Dans le premier cas lorsque le pus
forme un papeau par lequel on voit à l'œil le
pus affecté, il pourrait se faire qu'une
partie de la pusse, en même temps qu'elle dans
l'urètre ou pus. Il y a des plaques qui
se trouvent dans la partie la plus basse, qui
après avoir divisé le papeau de l'abscessus
ou formant l'impulsion, ce qu'on nomme
l'écoulement, mais il y a d'autres qui
se trouvent le contraire, en d'autres paroles
des opérations qu'on dit avoir été faites
ou le pus peut être, en prétendant

D'abord que pour cette ditte qu'on a
 faite par un criminel condamné à
 peine de mort, à condition qu'il aurait
 indemnité lib. de la ditte opération et qu'elle
 réussisse, n'aurait été, qu'un petit échec
 que c'était l'opération de la ditte par
 la ditte apparence, ou bien l'opération
 d'une ditte étrange, attendu qu'il y a
 eu réduction d'une portion d'intérieur,
 c'est qui cause cette opinion, est que la
 bystérie qui la ditte a été d'apparence
 prouve que pour la ditte elle a été par
 Malgouët au dit échec, les opérations
 n'auraient pas été, les opérations
 modernes n'ont point partiellement,
 attendu qu'il n'y a pas de ditte existance
 qui annulent la présence de la ditte
 dans le dit dit, et quand on la ditte
 ils ne forment pas, attendu de ditte
 qu'il la ditte, Malgouët a ditte
 c'est la ditte de la ditte à
 la ditte de la ditte, pour la ditte
 issue au ditte pour la ditte
 d'une ditte, et pour la ditte
 dans le cas où on la ditte d'après
 la ditte

second
 y floral

20 Il peut se trouver également des colons
 dans les ditte, lesquels lorsqu'ils lib. dans les
 ditte, qu'ils lib. dans les ditte
 influent par leur ditte, au ditte
 serient qui les ditte en ditte
 au ditte considérable, au point de

15.
 3
 302
 1.3

prendre 99th le Volume du Doigt, qui
vous expliquera en parlant de l'air extraction
Vossie 30 Dans la Paille, qui peut être comme
une sève dit être de trois origines,
venir des fibres par le moyen des artères,
être la suite d'un corps étranger venu du
d'hors, puis enfin se être formé. Il y a
pas un nombre déterminé le nombre fort
sp, qui peut être depuis un, deux, trois
jusqu'à 50, 100, 150 et même 200, comme
dans la rencontre. mais cela est très
rare, le plus volontiers on n'en rencontre
qu'un seul, ou deux deux et trois. Ils sont
point non plus le même Volume plus
il y en a moins ils sont gros, liés qu'il
est en a qu'un, il acquies 99th par la
temps sp de Volume, et jusqu'à un tel
point, qu'il remplit presque toute l'écaille
de la Paille, en absorbant toute l'air qu'elle a
pas toute la capacité ordinaire, parceque
les pores se sont en peu de temps devenus
mêmes, en prenant plus d'épaisseur.
Ils forment également qu'une surface
leur solidité et leur résistance, il en est
99th qui sont très réguliers, d'autres irréguliers,
d'autres fois sont très inégaux, présentant
plusieurs petites éminences de forme oblongue
se rapprochant de la quadrangulaire, et
présentant 99th. Il en est qu'on ne peut donner
une seule forme particulière, ou particulièrement
quand l'air se présente, il en est qui ont.

calculant 112

présentement en gros et en même manière jusqu'à
32 onces, l'uro lithiase varie également
il y en a qui sont très solides, qui résistent
d'une manière très forte aux tentes, -
d'autres au contraire qui ne résistent point
et qui s'écrasent pour ainsi dire. Il faut
savoir non plus que les uracates identiques, ce
qu'on voit en les digérant, les fondant, pro-
duire entre l'uro entre à une solidité
supérieure à l'uro uracate qui est apparent
de même nature, tandis que l'uracate
est disposé en couche concentrique, l'uracate
de l'uracate l'uracate est excré-
mentaire.

Les calculs sont composés de deux choses,
1^o une intérieure qui est semblable aux
composés de De chaux, d'autrefois
une sorte d'alumine, 2^o l'autre qui a trois
radicaux, 1^o l'acide urique 2^o l'urate d'ammoniaque
les l'oxalate de chaux, l'aminon magnésien
3^o la base en nature, ce sont les différents
substances, qui différencient les calculs qui
sont en l'uracate qui existe
entre les calculs.

Pour les distinguer les calculs les uns
sont les autres, les chimistes en font
l'état et trois genres qui sont les 1^o

qui rarement acquiescent un volume
considérable, sont arides, très inégaux
présentant de petites éminences semblables
aux d'uracate, ce qui fait qu'il faut -

15.

3

302

V.3

23 garnies d'espérilles. 22 g. qui sont composées
de deux substances, qui sont disposées par
enches énumérées, l'autre par mélange
3. g. forme de substance ternaire, quelconque
Ces deux états sont par conséquent pour leur
composition, qui regarde entièrement la
chimie

Comment les calculs peuvent exister dans la vessie
qu'ils se
transportent sous deux états différents, soit tant libre,
soit tant dans son intérieur, qui. Dans ce
cas gager toujours le bas fond de la vessie,
et se lever sur le trigone vésical, qui
quand ils y sont d'abord par leur position
présentent une sensibilité (elle) forte, que leur
avant dit pour cela être dans un mode
de sensibilité particulière, mais qu'on explique
très bien par la présence de ce corps étranger.
2. Sachant que d'une manière à être dans une
petite cavité, qui se forme par suite d'un
en commençant d'abord par exister dans
une petite saignée formée par les colonnes
chacun deux nous sont sans autre part,
qui amène que le calcul prend de
l'accroissement. Distend la petite cavité qu'elle
forme, qui cause les douleurs de vessie
que on y qui sont libre, ainsi faut-il
de précaution et de sagacité pour les reconnaître.
Les signes auxquels on reconnaît la
présence des calculs dans la vessie sont
des douleurs p. m. fortes, qui arrivent tant
dans les moments qu'on se donne du mouvement
la difficulté d'uriner, l'incontinence d'urine

qui a lieu par la présence de la pierre
 contre le col de l'utérus, par l'écoulement
 anormal de la sécrétion, qui tant qu'il y a de la
 chez les enfants, que les petites personnes la
 la tiraillement, que les personnes âgées sont
 le modéré le plus, de sorte qu'on
 a des ennuis fréquents d'aller à la selle
 malgré qu'on a une ggr. point de
 matière à évacuer ggr. même des
 hémorrhoides ont lieu, l'écoulement de matière
 gravées en urinant ou qui se sent au fond
 du bas. les difficultés d'uriner ont lieu
 ggr. au point qu'on ne peut rendre du
 tout d'urine, au lieu même quand on est
 satoué, on s'arrête tout à court. C'est tout
 encore à ce que quand les ggr. sont
 très volumineuses, car quand elles remplissent
 presque la totalité de la vessie que l'urine
 ne fait que passer sur de petites sillons
 qu'elles présentent sur leur surface.

Si la présence des calculs dans la vessie
 dure longtemps, il peut en résulter la
 marasme, par les suites douloureuses que les
 malades éprouvent, puis ensuite par la
 trouble de toutes les fonctions de l'digestion.

joint à ces signes Raccourcissement, il y a encore l'écoulement
 de l'écoulement de l'urine, l'introduction de l'écoulement
 dans le Rectum chez l'homme, ou dans le
 Vagin au moyen duquel on peut reconnaître
 la présence des calculs dans la vessie, surtout
 chez les enfants et chez les femmes, avec

15.
 3
 302
 1.3

328 Les parties ne représentent pas l'éprouvette pour
l'introduction de la sonde dans la vessie par
le moyeu du canal de l'urètre, avec elle
qu'elle va tacher le calcul, ce qui est le signe
le plus fort, ce qui s'écartera en imprimant
des légers mouvements à la sonde. Elle sent
de trois espèces, il y a les sondes de
gammes élastiques, qui ne courent
point pour cela, parcequ'elles ne peuvent
point communiquer de chaleur; l'autre
les algues, qui sont des sondes sèches,
ou enroulées desquelles on peut tirer
de l'urine, en retirant le moule; mais qui ne sont
pas préférables à ces dernières.
Il faut qu'on peut sonder les personnes
quelles ont uriné, parcequ'il est
plus facile de le faire et qu'on reconnaît
mieux la présence des calculs cela n'empêche
cependant pas de le faire en supposant
qu'ils n'ont uriné. On doit autant qu'on
peut lorsqu'on sonde, que l'on reconnaît
la présence d'un calcul lui imprimer un
léger mouvement sec et brusque, que l'on malade
et les assistants tussent, afin qu'en cas
qu'on parvienne à en faire l'éjection,
quelqu'un se trouve pas de calcul ou ne
dise rien de suspect de suppuratoire.
Il est par conséquent facile de reconnaître

La présence des pierres dans la vessie - 326
parce qu'il peut se faire que les pierres soient
trop petites, qu'importe les algues peuvent
être de suite. De canal de l'urètre dans
les urèters, parce qu'eff. ils sont étendus,
dilatés, de manière à permettre l'écoulement
du bout du doigt, et sorte que la pierre
ne toucha nullement l'algue, cette algue
est séchée au jumo à l'herbier et elle
pétit au au moment où elle alluvait
après un enfant, chez qui ils ~~apparaissent~~
la pierre qui par toutes les tentatives
qu'ils firent de nouveau et d'autre façon
presque sans succès, ce qui fit qu'il tomba
dans le Marasme et l'épuisement, des qu'ils
ils moururent, malgré que la pierre
était très grosse. Malgré ce que nous
venons de dire, on ne peut qu'écrire
la taille, que quand on est sûr de son
existence.

Il est encore des circonstances qui
peuvent empêcher la présence d'une
pierre dans la vessie. qui sont fig. des
coulures charnues dans l'écoulement de la
vessie, des tumeurs fongueuses, ou bien
encore quand les fibres se trouvant
en état de contraction de sorte qu'après
pour ne laisser aucun doute sur la
présence d'un calcul, il faut lui imprimer.

15.
3
302
V.3

387. chaque, qui puisse faire pénétrer
la présence. Par le cathéter ou même bouchon
général pour reconnaître la présence de calculs
ou peut aussi approximativement savoir leur
volume et leur nombre, et c'est d'après cela
qu'on donne une étendue plus ou moins
grande à l'incision. Recourus, il n'est guère
de personnes qui n'aient fait point faire
l'opération, toutes les fois qu'il est possible
cause qui se présente, attendant les dactyls
qu'ils font indurés ou Malades, qui tombent
dans le marasme si elle est très forte.

Continuant. Il y a deux méthodes pour localiser
les Malades qui l'ont, il y a les Dactyls
et leur extraction. Les Dactyls n'étant
point connus dans le milieu de l'Asie
dernière, ce n'est qu'après cette époque
qu'on en a fait usage, attendu qu'ils n'étaient
point connus, on se bornait seulement de
quelques dactyls, qui avaient peut-être
été mis en usage pendant un temps
ou ce qu'on appelle l'opération qui fut
d'abord en usage par un Dactyl
Stéphane, qui ne comprit de coquilles
différentes de l'Asie, que le quinquina
lui-même l'Asie, de qu'on en a fait
dans les premiers temps, retirée de l'Asie
effets, mais qui fut bientôt d'approfondir
pour la pratique l'Asie de chaque, une

De potasse, les eaux minérales sont également
chirurgien, mais on ne doit pas oublier que
pour les Sujets qui sont très-âgés, afin
de faire sortir de la vessie les calculs
petits & rariés.

C'était la seule manière mise en usage
jusqu'à l'époque du calculin moderne
notre vie, c'est à dire avant alors qu'on
est parvenu à reconnaître qu'il y a
quelques points de calcul, pour lesquels
espèce de calcul, qui est au-dessus
de danger, et il est à remarquer que
pour cela il faut les reconnaître, ce qui
est très-difficile et qu'il y a même impossible.
En effet on ne le peut que par l'analyse
de l'urine, mais on ne peut pas dire qu'elle
présente les différences qu'il y a dans les
matériaux, comparativement avec ceux
qui sont au-dessus de l'analyse de l'urine, qui
sont les points de calcul, ce qui le prouve c'est que
l'analyse n'a jamais trouvé de l'analyse de
chacun des points de calcul différents
entre eux, on ne peut pas dire que
l'analyse dans la vessie, de l'analyse qui
sont calculs pour chaque espèce, puisqu'on
ne les connaît pas, mais on sait qu'il y a
seulement points de calcul, et on sait
de suite quel que la vessie est très-
irritable on ne peut pas dire que l'analyse
soit les points de calcul, ce qui le prouve
c'est qu'il y a des points de calcul.

329 Pour faire à l'excitation que les fluxions
peuvent produire sur les lèvres, mais on
sait que les parties de notre exécution
diffèrent entra elles par leur portée vitale,
que d'ailleurs on s'acquitte également par le contact
d'un sang sur les plaies de la vessie, par
de vives excitations aussi d'après l'opinion
qu'on a eue des fibrillogéniques sont-ils
maintenant abandonnés.

Le mardi
10 floral

De l'opération de la taille.
Méthode à pratiquer une incision sur
parois de la vessie pour extraire une pierre
qui est enroulée, qu'on a dû faire par
grandes malades souffrant de l'opération
pour pas uriner. Méthode à pratiquer
pas dans les deux extrêmes de la vie, cette
dite chez les enfants et les vieillards, puis
certaines d'entre les maladies qui peuvent
opposer.
L'opération doit être faite par un bon maître
ainsi on doit faire prendre des bains, démolir
l'intestin rectum avec des lavements, ce qui
doit être fait au moment où l'on doit
opérer, prendre des acides vermineux et
cassette, attendre qu'ils en ont presque
toujours de la pratique maintenant dans
tout le temps, qu'on l'a fait avec un
que pendant le même temps et l'autre
de l'opération dans deux autres
de l'opération, 10 autres du fubia, qu'on
naturelle des polypes, et autres qu'on

même point pubienne qui est de quatre 389
espèces, 1^{re} celle de l'âne, 2^e le grand -
appocel, 3^e la latéralie, 4^e

Dans la première on divise le col de la Vessie, et la glande prostate. Dans la 2^e De celle dont
le col de la vessie l'oprie on a fait une Pubienne
incision au canal de l'urètre. Dans une
autre assez grande. Dans la 3^e une petite
partie du canal de l'urètre,

qui se fait avec une grande
manière d'instrument. Dans la 4^e on colle
de l'urètre qui est abandonnée, & qu'on
régime au diviseur le bas fond de la
Vessie sur son côté gauche. Ces quatre
méthodes peuvent être réduites à trois
méthodes, puis qu'on peut faire
pour extraire les pierres de la vessie par le
col de la Vessie et le canal de l'urètre, de
toute par son bas fond. En parlant
de ces méthodes, il me suppléeront qu'au
parvenir, quand on se feroit venir par l'urètre
ailleurs, & la manière de le faire.

Chez l'homme on ne pratique plus -
que la sus pubienne et la latéralie
en faisant observer que pour tous les
pécuniés décrits ci-dessus qu'on
qui ont les autres, on n'a pas
pas d'avoir les détails, que l'on pourroit
faire.

Et quant qu'on s'en est fait d'abord
plaisir, le malade comprendra ce qui
la faire suivant les méthodes, à l'avenir

389 ^{1re} méthode de Lelie. — on fait placer le
enfant sur les genoux d'un aide, qui
tient les pieds de l'enfant. quand
autres il met qui fait placer les
malades horizontalement, ou bien verticalement
mais maintenant on a reconnu la saignée
qui en résultait de les mettre obliquement,
parce qu'on parle au plus de facilité
à saisir les pierres avec les tenettes. Il
suffit de se placer sur une table sur
laquelle se trouve une matelas, ou bien
sur un lit, et non sur des corps molles,
afin qu'ils ne déforment pas; Il suffit
de placer une oreille derrière le dos, pour
les maintenir dans une direction oblique.
On doit de suite lever les pieds les élever
avec les pieds, avec des bagues, ce qui
empêche et non le corps de tourner
chez, pour les faire à différentes parties
du corps, dans la table ou au bout du lit,
parce que cette seule position offense
aux malades.

1^{re} méthode de Lelie.

Elle se pratique en commençant d'abord par
introduire le doigt dans le rectum chez l'homme
et le vagin chez la femme, avec lequel on
tient la pierre qui se trouve en avant.
Dans la femme en devant, pour qu'elle donne
lieu à une saignée des parties, afin
qu'on sache l'endroit ou elle se trouve.
Après qu'elle a pratiqué l'incision,

en commençant par les parties
les plus tendues, de suite le flanc allongé
et les muscles, puis en fin les parois
la vessie. Il est sans doute des cas où l'on
dixième la grande prostate avec le col de
la vessie. Une fois les parties divisées, on
y introduit les tiffettes, l'un saisit la pièce
et on enfait l'excision. Cette méthode
ne court pas grand danger dans les agues
la fièvre, mais elle ne va pas sans danger
les adultes et les vieillards, parce qu'on
trouvant une épaisseur de parties molles
très considérable entre les tiffettes
et la vessie, on ne peut point former
une tumeur avec les pierres. Il est donc
circumstances empêchant de lui la pratique,
et c'est là dans les cas où l'on peut se dispenser
d'intervenir dans le col de la vessie et qu'on
ne peut pas faire rétrograder par conséquent
possible circonstance les malades ne peuvent
arriver.

2^e Méthode au grand appareil

Elle consiste à l'excision et à l'excision.
On se sert pour la pratique d'un lithotome,
d'un lithotome, d'un dilatateur mal et
fermette. On gorge, puis enfin de l'excision.
Pour la pratique il faut commencer dans
les autres places les malades sans exception
convenable, leur fixer les mains avec des
pièces au moyen de ligatures, ou plaçant
empêcher d'écarter, puis on introduit le
cathéter dans l'urètre, on le guide au
toucher de l'urètre le col, introduit au
la donne à tenir à une aide pendant que

23^e L'opération consiste à introduire
 les ligaments, le testicule et le Balan de
 l'utérus, avec le dilateur, que l'on introduit
 jusqu'à dans la cavité du col, et la fait
 on introduit le Dilatateur mâle dans la
 cavité, y étant au col et ce dernier, puis
 l'on glisse le Dilatateur femelle sur tout
 y étant tout deux au col place d'habitude
 à l'égard l'extrémité du mâle se trouve
 dans la cavité de la femelle, après
 quoi on saisit les deux extrémités
 opposées, qu'on se sert l'un de l'autre
 afin de pousser l'un Dilatateur
 par l'autre. Cela fait on retire le mâle en
 laissant la femelle, sur lequel on glisse
 un gorgere, par lequel dans la suite, on
 retire le Dilatateur afin que le gorgere
 soit bien, dans la cavité de laquelle
 glisse le nouveau testicule, avec lequel
 on retire le calcul.

Cette méthode présente de grands inconvénients
 en ce qu'elle exige d'abord pour être faite
 un grand nombre d'instruments, qui font
 dilater le col, puis ensuite qu'on
 s'oblige de faire fréquemment suite de l'opération
 de l'urine, qui tient à la dilatation du col de
 la vessie et du canal un peu de l'urètre.

Seconda
 13^e Cordat

3^e Appareil latéralisé
 Il a été inventé dans le commencement
 du siècle dernier par le frère Jacques,
 qui consiste à dilater le col par
 l'insertion des parties latérales de

Raphe, le bulbe de l'urètre, puis le col
de la vessie et la glande prostatique, de telle
sorte que l'incision représente une sorte
de trapèze.

Il y a en outre la pratique en grand-
nombre de procédés instantés, d'aut-
re part toutes les parties se trouvent
divisées en un seul temps, dans les autres
au contraire on les divise en deux temps
isolés.

Ces derniers peuvent se rapporter à
1. l'incision de l'urètre, 2. l'incision de la prostate,
3. la division des ligaments et des
glandes 4. et 5. au lieu de les rapporter
ensemble, la section de la glande prostatique
et du col de la vessie, 6. l'incision de l'urètre
des testicules, 7. enfin l'incision des scrotums.

Le Cathéter est une espèce de sonde
présentant une courbure de 90 degrés, qui
doit se terminer inférieurement à
un angle droit et sept, indépendamment de
la plaque qu'il présente, qui à un
pau plus grand à l'extrémité supérieure et à la
manière dont ils se terminent. Il s'agit
apparemment de la même manière qu'une
sonde ordinaire.

2. L'opération se fera jusqu'à
ce qu'on ne verra point de sang
paraître, exact, pour pratiquer l'opération
des ligaments et de la prostate, qui est
le plus déprimé une pince enfoncée dans
l'écrou jusqu'à de l'ischion
en lui donnant l'étendue d'une pince

MS.
3
302
V.3

33^e Enfin, deux pinceaux, se prenant garde
de l'usage l'entendu, car il qu'on a vu
que ce soit l'écriture que l'on s'aperçoit
au ne saurait porter la distance trop
avant, parcequ'il arrive très fréquemment
qu'on se le porte ras aux os, qui
quand cela arrive ne peut pas porter
longue du doigt indigement dans la
cavité du Cathéter, sur lequel on a
la distance dedans.

3^e et 4^e P. Il y a un canal qui se fait
membre de l'apex de l'urètre, par le
le canal de l'urètre, le col de la vessie, et la
glande prostate, qui se font en divisant la
partie de dehors en dedans, puis dedans en
dehors; en examinant en général se qu'il
y a de l'apex de l'urètre par le canal prostate
autres, on peut dire que les premières sont
les plus affectées.

1^{re} 2^{de} 3^{de} 4^{de} 5^{de} 6^{de} 7^{de} 8^{de} 9^{de} 10^{de} 11^{de} 12^{de} 13^{de} 14^{de} 15^{de} 16^{de} 17^{de} 18^{de} 19^{de} 20^{de} 21^{de} 22^{de} 23^{de} 24^{de} 25^{de} 26^{de} 27^{de} 28^{de} 29^{de} 30^{de} 31^{de} 32^{de} 33^{de} 34^{de} 35^{de} 36^{de} 37^{de} 38^{de} 39^{de} 40^{de} 41^{de} 42^{de} 43^{de} 44^{de} 45^{de} 46^{de} 47^{de} 48^{de} 49^{de} 50^{de} 51^{de} 52^{de} 53^{de} 54^{de} 55^{de} 56^{de} 57^{de} 58^{de} 59^{de} 60^{de} 61^{de} 62^{de} 63^{de} 64^{de} 65^{de} 66^{de} 67^{de} 68^{de} 69^{de} 70^{de} 71^{de} 72^{de} 73^{de} 74^{de} 75^{de} 76^{de} 77^{de} 78^{de} 79^{de} 80^{de} 81^{de} 82^{de} 83^{de} 84^{de} 85^{de} 86^{de} 87^{de} 88^{de} 89^{de} 90^{de} 91^{de} 92^{de} 93^{de} 94^{de} 95^{de} 96^{de} 97^{de} 98^{de} 99^{de} 100^{de} 101^{de} 102^{de} 103^{de} 104^{de} 105^{de} 106^{de} 107^{de} 108^{de} 109^{de} 110^{de} 111^{de} 112^{de} 113^{de} 114^{de} 115^{de} 116^{de} 117^{de} 118^{de} 119^{de} 120^{de} 121^{de} 122^{de} 123^{de} 124^{de} 125^{de} 126^{de} 127^{de} 128^{de} 129^{de} 130^{de} 131^{de} 132^{de} 133^{de} 134^{de} 135^{de} 136^{de} 137^{de} 138^{de} 139^{de} 140^{de} 141^{de} 142^{de} 143^{de} 144^{de} 145^{de} 146^{de} 147^{de} 148^{de} 149^{de} 150^{de} 151^{de} 152^{de} 153^{de} 154^{de} 155^{de} 156^{de} 157^{de} 158^{de} 159^{de} 160^{de} 161^{de} 162^{de} 163^{de} 164^{de} 165^{de} 166^{de} 167^{de} 168^{de} 169^{de} 170^{de} 171^{de} 172^{de} 173^{de} 174^{de} 175^{de} 176^{de} 177^{de} 178^{de} 179^{de} 180^{de} 181^{de} 182^{de} 183^{de} 184^{de} 185^{de} 186^{de} 187^{de} 188^{de} 189^{de} 190^{de} 191^{de} 192^{de} 193^{de} 194^{de} 195^{de} 196^{de} 197^{de} 198^{de} 199^{de} 200^{de} 201^{de} 202^{de} 203^{de} 204^{de} 205^{de} 206^{de} 207^{de} 208^{de} 209^{de} 210^{de} 211^{de} 212^{de} 213^{de} 214^{de} 215^{de} 216^{de} 217^{de} 218^{de} 219^{de} 220^{de} 221^{de} 222^{de} 223^{de} 224^{de} 225^{de} 226^{de} 227^{de} 228^{de} 229^{de} 230^{de} 231^{de} 232^{de} 233^{de} 234^{de} 235^{de} 236^{de} 237^{de} 238^{de} 239^{de} 240^{de} 241^{de} 242^{de} 243^{de} 244^{de} 245^{de} 246^{de} 247^{de} 248^{de} 249^{de} 250^{de} 251^{de} 252^{de} 253^{de} 254^{de} 255^{de} 256^{de} 257^{de} 258^{de} 259^{de} 260^{de} 261^{de} 262^{de} 263^{de} 264^{de} 265^{de} 266^{de} 267^{de} 268^{de} 269^{de} 270^{de} 271^{de} 272^{de} 273^{de} 274^{de} 275^{de} 276^{de} 277^{de} 278^{de} 279^{de} 280^{de} 281^{de} 282^{de} 283^{de} 284^{de} 285^{de} 286^{de} 287^{de} 288^{de} 289^{de} 290^{de} 291^{de} 292^{de} 293^{de} 294^{de} 295^{de} 296^{de} 297^{de} 298^{de} 299^{de} 300^{de} 301^{de} 302^{de} 303^{de} 304^{de} 305^{de} 306^{de} 307^{de} 308^{de} 309^{de} 310^{de} 311^{de} 312^{de} 313^{de} 314^{de} 315^{de} 316^{de} 317^{de} 318^{de} 319^{de} 320^{de} 321^{de} 322^{de} 323^{de} 324^{de} 325^{de} 326^{de} 327^{de} 328^{de} 329^{de} 330^{de} 331^{de} 332^{de} 333^{de} 334^{de} 335^{de} 336^{de} 337^{de} 338^{de} 339^{de} 340^{de} 341^{de} 342^{de} 343^{de} 344^{de} 345^{de} 346^{de} 347^{de} 348^{de} 349^{de} 350^{de} 351^{de} 352^{de} 353^{de} 354^{de} 355^{de} 356^{de} 357^{de} 358^{de} 359^{de} 360^{de} 361^{de} 362^{de} 363^{de} 364^{de} 365^{de} 366^{de} 367^{de} 368^{de} 369^{de} 370^{de} 371^{de} 372^{de} 373^{de} 374^{de} 375^{de} 376^{de} 377^{de} 378^{de} 379^{de} 380^{de} 381^{de} 382^{de} 383^{de} 384^{de} 385^{de} 386^{de} 387^{de} 388^{de} 389^{de} 390^{de} 391^{de} 392^{de} 393^{de} 394^{de} 395^{de} 396^{de} 397^{de} 398^{de} 399^{de} 400^{de} 401^{de} 402^{de} 403^{de} 404^{de} 405^{de} 406^{de} 407^{de} 408^{de} 409^{de} 410^{de} 411^{de} 412^{de} 413^{de} 414^{de} 415^{de} 416^{de} 417^{de} 418^{de} 419^{de} 420^{de} 421^{de} 422^{de} 423^{de} 424^{de} 425^{de} 426^{de} 427^{de} 428^{de} 429^{de} 430^{de} 431^{de} 432^{de} 433^{de} 434^{de} 435^{de} 436^{de} 437^{de} 438^{de} 439^{de} 440^{de} 441^{de} 442^{de} 443^{de} 444^{de} 445^{de} 446^{de} 447^{de} 448^{de} 449^{de} 450^{de} 451^{de} 452^{de} 453^{de} 454^{de} 455^{de} 456^{de} 457^{de} 458^{de} 459^{de} 460^{de} 461^{de} 462^{de} 463^{de} 464^{de} 465^{de} 466^{de} 467^{de} 468^{de} 469^{de} 470^{de} 471^{de} 472^{de} 473^{de} 474^{de} 475^{de} 476^{de} 477^{de} 478^{de} 479^{de} 480^{de} 481^{de} 482^{de} 483^{de} 484^{de} 485^{de} 486^{de} 487^{de} 488^{de} 489^{de} 490^{de} 491^{de} 492^{de} 493^{de} 494^{de} 495^{de} 496^{de} 497^{de} 498^{de} 499^{de} 500^{de} 501^{de} 502^{de} 503^{de} 504^{de} 505^{de} 506^{de} 507^{de} 508^{de} 509^{de} 510^{de} 511^{de} 512^{de} 513^{de} 514^{de} 515^{de} 516^{de} 517^{de} 518^{de} 519^{de} 520^{de} 521^{de} 522^{de} 523^{de} 524^{de} 525^{de} 526^{de} 527^{de} 528^{de} 529^{de} 530^{de} 531^{de} 532^{de} 533^{de} 534^{de} 535^{de} 536^{de} 537^{de} 538^{de} 539^{de} 540^{de} 541^{de} 542^{de} 543^{de} 544^{de} 545^{de} 546^{de} 547^{de} 548^{de} 549^{de} 550^{de} 551^{de} 552^{de} 553^{de} 554^{de} 555^{de} 556^{de} 557^{de} 558^{de} 559^{de} 560^{de} 561^{de} 562^{de} 563^{de} 564^{de} 565^{de} 566^{de} 567^{de} 568^{de} 569^{de} 570^{de} 571^{de} 572^{de} 573^{de} 574^{de} 575^{de} 576^{de} 577^{de} 578^{de} 579^{de} 580^{de} 581^{de} 582^{de} 583^{de} 584^{de} 585^{de} 586^{de} 587^{de} 588^{de} 589^{de} 590^{de} 591^{de} 592^{de} 593^{de} 594^{de} 595^{de} 596^{de} 597^{de} 598^{de} 599^{de} 600^{de} 601^{de} 602^{de} 603^{de} 604^{de} 605^{de} 606^{de} 607^{de} 608^{de} 609^{de} 610^{de} 611^{de} 612^{de} 613^{de} 614^{de} 615^{de} 616^{de} 617^{de} 618^{de} 619^{de} 620^{de} 621^{de} 622^{de} 623^{de} 624^{de} 625^{de} 626^{de} 627^{de} 628^{de} 629^{de} 630^{de} 631^{de} 632^{de} 633^{de} 634^{de} 635^{de} 636^{de} 637^{de} 638^{de} 639^{de} 640^{de} 641^{de} 642^{de} 643^{de} 644^{de} 645^{de} 646^{de} 647^{de} 648^{de} 649^{de} 650^{de} 651^{de} 652^{de} 653^{de} 654^{de} 655^{de} 656^{de} 657^{de} 658^{de} 659^{de} 660^{de} 661^{de} 662^{de} 663^{de} 664^{de} 665^{de} 666^{de} 667^{de} 668^{de} 669^{de} 670^{de} 671^{de} 672^{de} 673^{de} 674^{de} 675^{de} 676^{de} 677^{de} 678^{de} 679^{de} 680^{de} 681^{de} 682^{de} 683^{de} 684^{de} 685^{de} 686^{de} 687^{de} 688^{de} 689^{de} 690^{de} 691^{de} 692^{de} 693^{de} 694^{de} 695^{de} 696^{de} 697^{de} 698^{de} 699^{de} 700^{de} 701^{de} 702^{de} 703^{de} 704^{de} 705^{de} 706^{de} 707^{de} 708^{de} 709^{de} 710^{de} 711^{de} 712^{de} 713^{de} 714^{de} 715^{de} 716^{de} 717^{de} 718^{de} 719^{de} 720^{de} 721^{de} 722^{de} 723^{de} 724^{de} 725^{de} 726^{de} 727^{de} 728^{de} 729^{de} 730^{de} 731^{de} 732^{de} 733^{de} 734^{de} 735^{de} 736^{de} 737^{de} 738^{de} 739^{de} 740^{de} 741^{de} 742^{de} 743^{de} 744^{de} 745^{de} 746^{de} 747^{de} 748^{de} 749^{de} 750^{de} 751^{de} 752^{de} 753^{de} 754^{de} 755^{de} 756^{de} 757^{de} 758^{de} 759^{de} 760^{de} 761^{de} 762^{de} 763^{de} 764^{de} 765^{de} 766^{de} 767^{de} 768^{de} 769^{de} 770^{de} 771^{de} 772^{de} 773^{de} 774^{de} 775^{de} 776^{de} 777^{de} 778^{de} 779^{de} 780^{de} 781^{de} 782^{de} 783^{de} 784^{de} 785^{de} 786^{de} 787^{de} 788^{de} 789^{de} 790^{de} 791^{de} 792^{de} 793^{de} 794^{de} 795^{de} 796^{de} 797^{de} 798^{de} 799^{de} 800^{de} 801^{de} 802^{de} 803^{de} 804^{de} 805^{de} 806^{de} 807^{de} 808^{de} 809^{de} 810^{de} 811^{de} 812^{de} 813^{de} 814^{de} 815^{de} 816^{de} 817^{de} 818^{de} 819^{de} 820^{de} 821^{de} 822^{de} 823^{de} 824^{de} 825^{de} 826^{de} 827^{de} 828^{de} 829^{de} 830^{de} 831^{de} 832^{de} 833^{de} 834^{de} 835^{de} 836^{de} 837^{de} 838^{de} 839^{de} 840^{de} 841^{de} 842^{de} 843^{de} 844^{de} 845^{de} 846^{de} 847^{de} 848^{de} 849^{de} 850^{de} 851^{de} 852^{de} 853^{de} 854^{de} 855^{de} 856^{de} 857^{de} 858^{de} 859^{de} 860^{de} 861^{de} 862^{de} 863^{de} 864^{de} 865^{de} 866^{de} 867^{de} 868^{de} 869^{de} 870^{de} 871^{de} 872^{de} 873^{de} 874^{de} 875^{de} 876^{de} 877^{de} 878^{de} 879^{de} 880^{de} 881^{de} 882^{de} 883^{de} 884^{de} 885^{de} 886^{de} 887^{de} 888^{de} 889^{de} 890^{de} 891^{de} 892^{de} 893^{de} 894^{de} 895^{de} 896^{de} 897^{de} 898^{de} 899^{de} 900^{de} 901^{de} 902^{de} 903^{de} 904^{de} 905^{de} 906^{de} 907^{de} 908^{de} 909^{de} 910^{de} 911^{de} 912^{de} 913^{de} 914^{de} 915^{de} 916^{de} 917^{de} 918^{de} 919^{de} 920^{de} 921^{de} 922^{de} 923^{de} 924^{de} 925^{de} 926^{de} 927^{de} 928^{de} 929^{de} 930^{de} 931^{de} 932^{de} 933^{de} 934^{de} 935^{de} 936^{de} 937^{de} 938^{de} 939^{de} 940^{de} 941^{de} 942^{de} 943^{de} 944^{de} 945^{de} 946^{de} 947^{de} 948^{de} 949^{de} 950^{de} 951^{de} 952^{de} 953^{de} 954^{de} 955^{de} 956^{de} 957^{de} 958^{de} 959^{de} 960^{de} 961^{de} 962^{de} 963^{de} 964^{de} 965^{de} 966^{de} 967^{de} 968^{de} 969^{de} 970^{de} 971^{de} 972^{de} 973^{de} 974^{de} 975^{de} 976^{de} 977^{de} 978^{de} 979^{de} 980^{de} 981^{de} 982^{de} 983^{de} 984^{de} 985^{de} 986^{de} 987^{de} 988^{de} 989^{de} 990^{de} 991^{de} 992^{de} 993^{de} 994^{de} 995^{de} 996^{de} 997^{de} 998^{de} 999^{de} 1000^{de} 1001^{de} 1002^{de} 1003^{de} 1004^{de} 1005^{de} 1006^{de} 1007^{de} 1008^{de} 1009^{de} 1010^{de} 1011^{de} 1012^{de} 1013^{de} 1014^{de} 1015^{de} 1016^{de} 1017^{de} 1018^{de} 1019^{de} 1020^{de} 1021^{de} 1022^{de} 1023^{de} 1024^{de} 1025^{de} 1026^{de} 1027^{de} 1028^{de} 1029^{de} 1030^{de} 1031^{de} 1032^{de} 1033^{de} 1034^{de} 1035^{de} 1036^{de} 1037^{de} 1038^{de} 1039^{de} 1040^{de} 1041^{de} 1042^{de} 1043^{de} 1044^{de} 1045^{de} 1046^{de} 1047^{de} 1048^{de} 1049^{de} 1050^{de} 1051^{de} 1052^{de} 1053^{de} 1054^{de} 1055^{de} 1056^{de} 1057^{de} 1058^{de} 1059^{de} 1060^{de} 1061^{de} 1062^{de} 1063^{de} 1064^{de} 1065^{de} 1066^{de} 1067^{de} 1068^{de} 1069^{de} 1070^{de} 1071^{de} 1072^{de} 1073^{de} 1074^{de} 1075^{de} 1076^{de} 1077^{de} 1078^{de} 1079^{de} 1080^{de} 1081^{de} 1082^{de} 1083^{de} 1084^{de} 1085^{de} 1086^{de} 1087^{de} 1088^{de} 1089^{de} 1090^{de} 1091^{de} 1092^{de} 1093^{de} 1094^{de} 1095

devisait, pareque d'alors ~~parce~~ 336
l'instrument glissait, prisenente qu'il ne
convoit point de parties qu'il n'entendait,
aussi souffre ces incertitudes qui lui
donnaient de faire faire qui se passait
Au frère Jacques d'écouter. Mais, qu'il fit 22. p. 1. de
un très grand nombre d'apostrophes
puisqu'il dit qu'il en a fait jusqu'à
nombre de 1600, lequel n'est que lui
avait les pratiquait approchant de la
même manière que le frère Jacques, qui
fut très honteux en l'écouter, mais pour
lequel on ne peut dire prudemment comme
qu'il le faisait, puisqu'il finait il adit -
ce qu'il disait, malgré qu'un très
grand nombre de personnes antichriste de
le savaient et le flattaient, attendant qu'il le
cachait pour le faire.
C'est à l'écouter. Chaudron praticien -
anglais, qui est le premier qui a été mis en place de
l'œuvre la main. Dans le fait c'est l'œuvre
qui la faisait de ne peut pas plus simple
pour cela il commençait par le pied
en l'écouter dans le canal de l'écouter, puis
puis incisait avec un bistouri en forme
de scapel qui se porte par l'écouter
l'écouter et les écoutes, l'écouter et l'écouter
l'écouter de l'écouter avec l'écouter de l'écouter
l'écouter puis incisait avec l'écouter même
l'écouter l'écouter l'écouter de la l'écouter
et l'écouter l'écouter.
L'écouter est celui qui vient ensuite, qui
l'écouter approchant de la même manière et l'écouter.

Seconde
14. floral

15.
3
302
V.3

338 qui ~~commenceait~~ qui commençait d'abord.
par diviser les legumens et les graines
pour en extraire, puis introduisait dans
le creux une grande cannelée au lieu d'un
cathéter, puis la saignée de la quelle il faisait
la division avec un couteau le cône de
la stérilité, puis la grande prostate.

Reprocde. Vient ensuite l'écot qui invente plusieurs
procédés pour diviser les parties de l'urètre
en 2. durs, mais qui fut la fin de l'urètre
à un seul qui est encore mis en usage
par quelques praticiens. Il inventa pour cela
un instrument qui présente en même temps
l'avantage de pénétrer dans les parties, de
serrer et d'opérer de. sur la base du
quel on porte un saut de manière de
Rondache, pour diviser les parties, après
qu'on a rempli une petite poche avec
les pierres. Reprocde a inventé d'augmenter
après grande incision, qui sont examinés
après l'opération.

Reprocde. Nicolai indiquait dans son procédé
que l'incision se fait par une petite
incision puis qu'on dilate les parties en
afin de faire l'abstraction des calculs.

Reprocde. Pallaci vantait qu'on divise les parties
appuyant comme Didron pour cela il
seguait d'une cannelée garnie d'un trépan
à la partie inférieure, après qu'on l'avait
mis instrument pour diviser la partie, et
instrument en forme de trépan et sans
d'autre celui qui donne bien à l'urètre

Quatrième l'instrument d'acier fait 48

usage pour son procédé
Broussat se servait lui d'un gorgatze procédé
dont l'instrument transmettait sur un seul point
diviser les parties et le point d'après
qu'on en le retirait, ayant glissé sur lui
le second, qu'il servait à conduire les
tenettes.

D'après le sergent d'armes gorgatze qui se procédait
était retournant en vaine d'un autre côté
en cas de l'autre, avec le quel il était
un lambeau demi lunaire. Il lui servait
dans la vue de ne point interrompre l'écriture
recteur, mais en voulant écrire l'un
ou l'autre à l'aide de l'autre l'autre.
à l'instrument de papier lui a été l'usage
par devant qui le fait passer d'une
vitesse à l'autre qui sert à le conduire avec
plus de facilité. Cet instrument est
commode.

Enfin l'instrument qui se trouve
seul est à dire qu'il est un peu plus
procédé qu'un de l'autre l'autre plus qu'un
un seul. D'après il inventa d'un autre
à l'instrument qui contenait une bulle d'air, après
qu'on fait l'écriture de quelcun point lui
d'après d'après présente l'une d'après dans
laquelle on glisse l'instrument pour passer
de l'un à l'autre, à l'aide de l'autre à l'aide
de l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre
par le même procédé pour le l'autre au

15.
3
02
1.3

2^e Esquisse. Il se pratique au moyen d'un
cathéter très court dans la cavité
de manière qu'il ne s'introduit dans le
canal de l'urètre, il forme une tumeur
considérable au péricône sur lequel on
dépense les parties au moyen d'un bistouri
le cathéter présente encore cela de part
qu'il présente Supérieurement une ouverture
dans le quel on passe le pincet d'argent de
main gauche pour pincer les membranes
Procède par les quels on divise la
partie de l'urètre en deux.

1^{re} place. Il y a deux ans, qui sont celui de
M. Moreau et du frère Côme.
M. Moreau dans le sein avait par
tout, d'une part d'écarter l'écarter du
péricône, mais au contraire de l'écarter, en
un fait il n'est pas dans l'un des autres, plus
personne il commençait par d'écarter
d'abord les téguments puis ensuite d'écarter
d'écarter l'écarter, il se servait d'un
lithotome très long, par lequel il dit
le canal de l'urètre et le portait tout de
suite dans le vésicule, il agrandissait l'écarter
des parties profondes, en faisant abaisser
à l'instrument la cavité du cathéter
ensuite depuis il y revenait et agrandissait
l'écarter en retirant l'instrument. Cette
incision représente deux triangles adossés
par leur sommet. Entre les deux triangles
du tissu cellulaire, on est parvenu l'écarter
du péricône. Il est bien d'écarter, quelle
un regard présent toujours la péricône.

proposition d'ailleurs solution est par 818
d'une grande importance.
Le procédé du frotte laine est employé: procédé
par l'instrument d'art au-dessus, qui est
un dittoir cache' entre deux laines;
au quel on peut donner de la laine
au degré d'étendue que l'on veut, au
moyen d'une bascule qui se trouve adaptée,
que l'on dirige d'après l'indication numérique.
C'est l'artillerie pour
les téguments et les grâces au crin
d'un pistolet, ainsi que le canal de l'entre-
tenu on y introduit le dittoir, et
avec lequel on peut tuer la pierre
pour examiner son volume, en même
temps qu'on ne craint pas de blesser
les parties, attachées, que l'on coupe
traverse dans les chairs, l'un étant assuré
à la place convenablement après qu'on
a donné le degré qui, au-dessus, est
fait on incise les parties en abaissant
la bascule, en même temps qu'on étire
l'instrument à soi, sans l'écarter, on
introduit les téguments et l'on fait
l'attraction de la pierre. Ce procédé
est celui qui est le plus employé de
nos jours et qui présente le moins
d'inconvénients.
Aux examens on se rapproche, mais cela

S.

02
1.3

opération sans un plus grand nombre d'aides et un autre instrument sert de guide au forgeret, avantage qui se présente aussi l'instrument du père comme d'autres sont d'autres. On admet que l'incision se faisait plus facilement qu'avec l'instrument du père comme et qu'il était moins exposé à être saisi d'hémorragie. Les autres sont faits tel que la queue de plus.

Ce procédé présente cependant des inconvénients. D'abord il faut se faire que le pinceau pousse vers la partie antérieure de la branche de l'instrument tranchant ayant une pointe très courte et très large, et pénétrant difficilement. Dans les parties, on se trouve à l'incision l'avantage de pousser l'instrument la pierre pour l'indiquer plus exactement le volume, avantage qui se trouve dans l'instrument du père comme, au point encore indigne comme inconvénients la pique de la pierre avec un pinceau qui n'est pas très pointu est contre il faut ouvrir plusieurs canaux dans, et malgré ses inconvénients, cet instrument peut être employé, surtout par ceux qui n'ont point l'habitude de pratiquer cette opération.

Le procédé latéralisé, ou méthode de Duboult.
Cette méthode consiste à faire une incision à la partie antérieure et gauche du bas du fémur de la fémur, cette incision doit

348. ~~Atte~~ alligue l'assise en devant et de l'air
en dedans, forme pratiquer cette opération
il se dressait d'un instrument figure ass-
triquant, sur la came de lequel est enfoncé
un ~~écrouillet~~, // plongeait cet instrument
entre la tuberculose de l'ischion et l'aine,
un ~~loup~~ fait peu plus en avant, puis
faisait pénétrer un caustique en son centre
et monté sur un manche dans la Vessie
au moyen de la crémolade d'un asom, par

Thomas pour exécuter cette ~~opération~~,
à imaginer un instrument figure sur
celui de l'air. comme il lui adaptait un
petit ~~forçet~~ qui ~~doit~~ ~~être~~ ~~lorsqu'on~~
~~retient~~ l'instrument, qui lui même est
terminé par une petite lame, en manière
de lances.

Cette ~~opération~~ est très ~~difficile~~ ~~parce~~
c'est que la Vessie doit être ~~de~~ ~~manière~~
qu'elle se ~~malade~~ ~~représent~~ ~~puisse~~ ~~contenir~~
long temps ~~l'urine~~ dans la Vessie, // ~~il~~ ~~doit~~
y faire des injections, alors on cause un
surtout ~~l'urine~~ ~~encore~~, et d'ailleurs // la
Vessie est ~~devenue~~ ~~peu~~ ~~elle~~ ~~même~~ ~~après~~
peut être ~~distendue~~, ensuite cette
opération ~~expose~~ ~~aux~~ ~~plus~~ ~~graves~~ ~~inconvénients~~
car on peut ~~représent~~ ~~pénétrer~~ dans la
Vessie, ~~et~~ ~~qui~~ ~~est~~ ~~arrivé~~ ~~dans~~ ~~la~~ ~~fois~~ ~~à~~
l'urètre, alors si on le ~~change~~ ~~quand~~ ~~elle~~
est ~~plaine~~, après forte ~~raison~~ ~~lorsqu'il~~
est dans un ~~état~~ ~~de~~ ~~faiblesse~~ ~~ou~~ ~~en~~ ~~ne~~
parvenant ~~peut~~ ~~dans~~ ~~la~~ ~~Vessie~~, on l'expose

de l'écarter, en s'attachant, les qui- 964
les gros Maillons, le Recteur et Pailliers.
Lors, même qu'on pousse dans la Mer, au
point intermédiaire les vessies séminales. On
peut encore ajouter à ces incisions,
que l'écarter du bas du de la Mer
expose presque les autres vessies aux fistules
urinales, existantes, ainsi et attentivement
abandonnés.

Secund.
17. floral

Manière d'extraire les pierres
dans la vessie

Cela se fait par un cilo de pince appelée
tenette, qu'on introduit dans la vessie
d'une manière, sans guide et assés guidé.
On rempli ce de bas. Lait avec le doigt
indicateur introduit dans la plaie, sur
lequel on se fait, l'écarter, fait avec la
gorgère, dans le quel on se fait également
l'écarter, de peu fait fait en les introduisant
tant dans la vessie après
avoir pratiqué l'incision.
Les pierres d'une grosseur assez considérable
parmi lesquelles il y a de très fortes
qui forment à l'écarter, avec les ciseaux
qu'on utilise.

On doit distinguer dans les tenettes
deux parties, la première qui sont composées
entièrement et compose intérieurement, présente
de petits apertures, pour, pénétrer dans
les vésicules, dispersées de telle manière.

345 ³⁴⁵ qui ont la forme de cuillères. Elles se réunissent
littéralement se réunissent, qu'elles ne se touchent
pas tout-à-fait, crainte de comprimer
entre elles les parois de la tige. Les branches
qui toutes sont simplement réunies avec
les pièces ordinaires, tantôt elles se réunissent
cette dernière forme est due au frottement
comme de cette forme il se résulte qu'un
léger écartement des branches en procure
un assez considérable entre les mors. Il est
comme aperçu intuitivement de ménager la part
dans l'attraction de la pierre, mais on
avantage un peu plus grand qu'un point
se l'imagine, car l'incision des angles entre
est toujours plus grande que l'interstice
2° L'union des deux branches, dans les
tenettes ordinaires, est assez éloignée de
extrémités des mors, à cet égard, elle
quadruple à corriger les tenettes, l'union des
branches est faite d'une manière que les
mors interviennent dans la tige. Elle est
à l'ouverture. Du côté de la tige, les branches
des tenettes sont parallèles aux mors.
quelque soit la forme des tenettes, les
mors sont devenus d'autres courbes, et
dernières de servir à saisir les éclats qui
abandonnent par le bas pour de la
Il est encore d'autres instruments, dont
on peut avoir besoin pour faire cette
attraction. C'est qu'on des tenettes avec
un ringlet pour faire des incrustations, les
de la tige, de la lignure inoffensive.

Les suites de cas qu'il se manifeste une
hémorragie, il faut arrêter des tourterelles
des aiguilles et en outre il est bien d'arrêter
le fluxotomie de devant avec que la
pièce soit en place.

De l'opération de la Caille

Suivant le frottement.

Il faut pour la pratique donner une
position convenable au malade, s'il en a une
matière continue dans le rectum avec des
larmes, puis il commence par introduire
un cathéter dans la Vessie, qui donne
à tenir à main, qui plus souvent
devient dirigé en devant, qu'il doit
tenir dans une position oblique, de
gauche à droite, afin de faire pénétrer
une peu le stylet dans l'urètre. Cela
fait le chirurgien s'agenouille devant le
malade sur la gauche, et, un peu de
côté gauche, puis fait l'incision du peritoine
est la dore d'après jusqu'à ce qu'il
soit libre dans l'urètre d'un peu de l'urètre
ou commençant à un point au début
de l'anus, qu'il prolonge jusqu'à l'apophyse
interne de l'ischion, avec un bistouri
tenu en manière d'une plume à écrire
après avoir tenu le frottement de la main
main gauche à l'incision faite des tourterelles
et de la vessie cellulaire, le chirurgien oblique
autrement le corps de l'urètre la cavité
du cathéter avec l'anneau du doigt
indicateur de la main gauche, qui

On apprend à tracer en pratique une incision
avec le bistouri qui se prolonge jusqu'à
celle de la vessie.

Une fois pratiquée, on introduit le
bistouri dans la poche. Dans la vessie
on le faisant glisser dans la cavité de
l'abdomen, y étant au coté de l'urètre,
pour ne plus laisser que l'expression, avec
lequel le chirurgien touche la pierre par
son conduit. Son volume, l'âge de l'homme
en degré d'apostrophe, est sensible à la
lance pour pratiquer l'incision, en conduisant
en abaissant la bourse et le testicule à son
en même temps qu'on a bien de l'appuyer
dans la symphyse du pubis pour lui
garantir un point de solidité, afin d'un
pas trop diviser de parties. Elle est divisée
on introduit le bistouri, en les glissant sur
le doigt indicateur de la main gauche
qu'on a avant placé à la partie inférieure
de la plaie, y étant parvenue, on en fait
six ou sept anneaux de chaque de deux ans
avec les on dirige les anneaux des pierres
dans les différents points de la vessie pour
poursuivre l'incision les calcule, les tenant le
chirurgien qu'il de la tenir les pierres par
leur. On en fait une en embrochant leur
ventre d'une main seulement tandis
qu'avec l'autre on l'applique. De dans, après
de leur faire sauter, en l'ordre du
premier genre, en même temps qu'il est
à son point de sauter les pierres, on les fait

de me d'écouter leur action, et les disingner
les mors dans le sens de la plume
On ne saurait se priver de tuer les asps. Les asps
sont pour faire l'entretien des calcaires
tous les cas qui en le font, ce qui est plus
facile.

On recommande la présence des calcaires dans
le fossé non seulement pour les tuer, mais
pour en recueillir leur nombre, mais
encore pour le fait d'indignation de la
Mer, ce qui survient de faire, pour
seulement pour cela, mais des vides de la
deuxième aggrandir l'incision qui n'est pas de
pâtissiers. On peut encore s'occuper des pierres
par le moyen de la bêche. On est souvent
dans le cas de s'occuper de la bêche de
tuer les courbes, parce qu'elles sont de vides
ou ne le peuvent pas. On attend la position
des pierres qui sont trop grandes pour être
surtout les grandes pierres.

Il faut ensuite venir de la saie
les pierres par une plus petite saie
et ensuite leur bêche, parce que sans
cela on ne peut pas les faire aussi bien,
aussi toutes les fois qu'on ne le peut pas,
faut-il qu'on le fasse avec attention.
Il faut faire ensuite que les calcaires
s'écartent, qui sont tous les asps, et
envisager, ou bien à ce qu'on ne trop de
avec les mors. Dans ce cas, les asps
sont plus difficile à enlever que quand
ils sont plusieurs, car, parce qu'ils sont
en plusieurs, plusieurs qu'on les fait petits
tandis qu'il faut porter dans les asps.

S.
02
3

Pour l'usage des pierres on y parvient - 638
par l'usage du casier, qui seige
à l'usage d'une forte machine,
parce qu'il faut des fois une quinzaine
de fois, qui étant seige qu'on introduit
plusieurs fois les bœufs dans la fosse
et de faire même des injections, ce
qui peut servir qu'on introduit aussi
ce pour cela que l'on fait des fois
pour l'appareil, qui seige également
des injections, ce qui pour l'usage au ne
soit pas quel partie par le.

S.

02
13

66 L'opération de la taille est que l'on coupe
parmiendrait un espace de la tige sur une bagne
la pierre, au moyen d'ingrédients dans la
pierre, mais le cat regardant par le même
aise qu'il se présente, malgré qu'il en fit
l'usage de 15 semaines, alors tâche de
la pierre au moyen de tinctures, mais il
à prouver quelle n'est pas l'opération de
une poche mais bien plutôt d'entraîner de
le col de la vessie, qui l'aient ébranlé et
tombé, on parvient à la tige, l'opération
dernière, c'est celle de l'urètre qui
est celui que l'on doit pratiquer, lequel
ne pouvant pas porter un instrument
lors dans la vessie, à l'instance de l'urètre
qui consiste à enlever la tige avec
cette tige, c'est-à-dire dans une gaine qui
se trouve échouée par la tige, c'est-à-dire
qu'on applique contre la pierre de la tige
qui y étant en lache la tige, on en
distingue la pierre, et l'on pratique l'opération
de la taille, qu'on recouvre avec une pierre
en tige, qu'on en fait de l'urètre
attache à la tige, on en fait pas tige, on
on parvient de l'urètre d'un tige
en tige, d'un linge jusqu'à la tige
qui se présente à l'urètre de la tige
est au même pratiqué par l'opération de
la tige en un seul temps, mais bien
en deux, ce qui arrive fig. Dans le cas
de l'urètre, de l'urètre d'urètre
que l'on peut exprimer et exprimer
fait en faisant la ligature du tige

Supposons l'opération terminée, il faut
surmonter les accidents, etc. par une évacuation
par la division. D. l'estomac du patient, ainsi
que celle transverse, qui sont dans les
cas acquiescés. Mais l'opération plus considérable
par les douleurs que les malades souffrent,
qui donne l'un ou l'autre des accidents qui
viennent au lieu, lorsqu'ils sont atteints
de longtemps prolongés.
1° Il peut se faire ensuite que l'infirmité de la
Division du rectum qui est une
par la plénitude de l'intestin rectum
ou bien par la maladresse du chirurgien
qui n'a pas pris assez de précautions pour éviter
au lieu, par conséquent, une complication de
la Division du rectum. Une certaine
quantité de matière qui ne doit point
faire suspendre l'opération du rectum,
après qu'il en y revient. La Division du
rectum peut être telle, quelle soit plus
profondément. De manière que les bords
extérieurs de la plaie, soient réunis
et en résulte une fistule qui peut
être incurable, tandis qu'il est placé
extérieurement, il est de tout.
Il est donc à employer dans ce cas
il est des praticiens qui disent qu'il
faut dire l'intestin rectum dans la
dans son étendue, une fois qu'il se
trouve en position, crainte de
fistules, d'autres au contraire disent qu'il
ne le faut point, parce qu'il se fait
que les cicatrices qui se font dans cela
il est faite de concilio ces deux
parties, c'est de faire que la Division

S.
102

838 est très haute; mais que dans cet endroit
elles sont incurables. Tandis qu'en pénétrant
disséquer en bas, puisqu'elles englobent en
guérissent sans difficulté.

2.° Quand à l'hémorragie qui peut survenir
par la division des artères supérieures, ou
la hémorragie, peut être arrêtée par
un secondica, - à savoir celle qui
arrive à l'instant même de l'opération
qui peut tellement être considérable
qu'elle fasse suspendre, qu'il faut
dans ce cas qu'on enfonce la ligature
sur le champ du vaisseau. La 3.° est
celle au contraire qui arrive à une distance
plus ou moins éloignée d'insensiblement,
par l'ouverture de certains vaisseaux,
que quelle on ne peut s'attendre,
c'est ce qui fait qu'il convient d'avoir
de temps à autre les ligatures de l'abdomen
pour s'assurer s'ils sont remplis de sang,
et de suspendre leur cause. C'est dans
ces cas au malin que les ligatures au-dessus
seront suffisantes de sang, il ne se fait
pas même un écoulement de sang par
les vaisseaux, qui peuvent être d'un
certain calibre, vu que le sang pénètre
dans la partie tant de haut et de bas
plus, que l'on remarque en examinant
la région hypogastrique, que l'on trouve
un peu plus considérable par la distension
de la vessie, causée par la présence de
l'urine, qu'elle contient.

Les moyens à employer dans ces cas,

deux de deuant estre au sang, en ~~le~~
faisant des injections d'un liq[ui]de dans
la plaie, qui entrainera avec lui
le sang & les coagula qui peuvent
travailler, ce qui est très utile à
faire, attendu que les coagula peuvent
devenir le moyen de guérison. Au point
encore dans le cas où le pus sort, qui
il y aurait point de coagula ~~par~~
dans la plaie, de la même manière de guérison
à l'usage qui sont bien préférables
à celles qui ont fait usage ancien.
Parce que la structure des plaies
au point de la suture également de la
ligature de la plaie de la plaie.
Le permettant; Si ne le permettant
pas, il ne faudrait avoir recours
qu'à la compression, qui se fait au
moment, un bandage ou un
dans la plaie, qui lui permet jusqu'à
suffire, qui se trouvent attachés par
le milieu au moyen d'une suture
et sont dans la plaie de la plaie
au point de la suture, qui se trouvent
entre le bandage et la plaie
ou avec une compression à la plaie
les ligatures latérales, après quoi on
fait un cat.

L'opération finit, il y a des opérations
qui ont été appliquées au point de la
la plaie que l'opération est finie et qui
est inutile, parce qu'il n'y a pas de

S.
102

~~De~~ De plaine humide dans tout et de
exaltée dans une position qui conduit
qui est de l'écriture plaine les joints
lucides et les, que l'on s'attend qu'un
d'un d'rap d'un d'un d'un d'un d'un
les gars, parce que cette position fait
rapprocher les bords de la plaie ce qui
en favorise la réunion par la suite
qui survient, qui est fait en peu
temps, puisque des le jour même on
gère avec l'urine en fait plus grande
plaie, tandis que d'autre fait cela
marche qu'on voit de la suite, ce qui
fait que l'urine en fait de la suite
qu'une partie par le bords de l'urine
tandis qu'on voit traverser la plaie
est l'inflammation devient considérable
ce qui fait qu'elle se communique aux
parties environnantes, de la qu'elle se
en suite de accidents, car des d'urine
de l'urine enflammée enflammée la plaie
l'urine enflammée du péritoine, de la qu'elle
est produite une péritonite considérable
de la qu'elle en cause est l'urine
qui est au point de la qu'elle en cause
de la qu'elle en cause est l'urine
capacité de l'abdomen, mais de plus.
Lorsque il en cause est l'urine
de l'urine dans l'abdomen, dans
les parties environnantes. De la qu'elle il
peut survenir des d'urine, très considérable
ainsi que des fistules, qui peuvent causer

La mort des malades.

346.

50. Des convulsions pendant l'urémie. 346.
chez les enfants, par la présence des convulsions
héréditaires ou causales intestinales, qui peuvent
dans certains cas, s'opérer avec une sielle
sont portées à un trop haut degré
40. Une fièvre très forte peut compliquer
l'urémie, on lui a vu un caractère
particulier, qui dans ce cas est du
ressort de la médecine.

50. L'impuissance peut être le résultat
qui arrive très souvent fréquemment qu'une impuissance
la voyait arriver anciennement d'une
le grand appareil, on lui faisait la
division de la glande prostatique et du
vérumontanum par le milieu, tandis
qu'autrefois on ne faisait plus que
l'appareil latéral, qui est le plus
qui dans les parties latérales.

60. Discontinuation, qui est une complication
qui se manifeste et disparaît
à petit. Tandis que l'autrefois continue
et on a pu en faire plus
immédiat.

70. Enfin il est des autres accidents
qui peuvent survenir consécutivement, calculs
qui sont des fistules urinaires par
l'infiltation de l'urine dans le tissu
cellulaire qui a produit des dégéné-
rations, puis enfin des calculs qui
s'accumulent dans l'urètre
sur lesquels jusqu'à l'urine se précipite

S.
202

Donner des explications tant
hypothétiques, qu'il explique par la
de petite - calcul, ou bien la sur-
dité ou sur-mettre cette expression de
l'homme. Il y a par d'autres moyens
pour le médecin que de faire une
incision dans l'urètre ou de le tordre
et de les extraire.

De l'opération de la taille chez la femme

1.^o De la sous-pubienne
L'opération de la taille chez la femme
se pratique de même que chez l'homme
parce qu'il paraît qu'elle est moins
exposée à être atteinte de la pierre
que lui.

Il y a deux manières de pratiquer
l'opération de la taille chez la femme,
elle par le bas par le bas de la flexion, qui
à l'abri de pratiquer par le vagin, qui
entre en dessous et la tubérosité de
l'ischion, qui se rapproche de l'opercule
latérale chez l'homme, qui est elle qui
paraît avoir été la première connue,
2.^o par le col de la vessie.

1.^o L'opération de la taille par le bas
de la femme a été faite par plusieurs petits
nombre de fois, attente à quelle elle présente
pas grand avantage et qu'elle entraîne
il plus en résultat des inconvénients.

parce que l'urine passant de la Vessie 358
dans le Vagin, et par les incisions des
Listes Vaginales, qu'on ne peut
faire qu'avec une très difficilement.
Il est cependant établi que c'est
qu'il faut la pratique un plus
grand nombre d'opérations, qui sont en
établissement avec elle. Malgré quelle
a été pratiquée un petit nombre de
fois, il est arrivé, cependant, qu'on la
fait, également dans un cas où la
pièce provenait dans le Vagin de la
partie antérieure.

2° Cette par le col de la Vessie, qui
se fait de deux manières, par la
dilatation du col de la Vessie, puis
ensuite par une incision. 1° Cette par-
dilatation se fait en commençant par
introduire une Dilatation dans l'urètre,
sur laquelle on glisse une Dilatation que
l'on pousse dans la Vessie, puis on
dilate le col. 2° C'est le quel on introduit
le dilatateur jusqu'à atteindre la cavité,
qu'on ne peut tirer que quand ils sont
petits et non considérables, aussi cela
fait on ne peut quand ils sont plus gros.
Les deux, Dilatation de la Vessie,
et quelle est l'urine fréquemment
de l'urètre. C'est par là
Dilatation qu'on opère l'urètre qui
est plus restreint par les incisions.

339 Cette par incision, peut être pratiquée de
trois manières différentes au dessus de l'arc
de l'urètre, deux des parties latérales, &
en fin postérieure. 1^{re} quand à cette par
le dessous du canal de l'urètre, paraît être
le procié, le plus ancien qui se fait au
doyenné de l'urètre de l'urètre 2^e par
les parties latérales, on coupe au dessus
le canal de l'urètre. 3^e par l'urètre même
moyen de différents instruments, tels que
celui de l'urètre, qui par la force de la
rapprache l'urètre, duquel sort une
laine tranchante, ou un de ces outils
celui de l'urètre qui divise le canal
de l'urètre de l'urètre, puis celui de l'urètre
qui se rapproche l'urètre. 3^e Enfin
par dessous le canal de l'urètre. Le procié
ne peut être fait en trois grande
nombre de fois, Mr. Dubouché est celui
qui le premier le fit connaître, qui
dit cependant ne pas l'urètre par le
racante l'urètre suggère par le fils
d'un chirurgien en conversation avec lui
disant qu'il ne s'en le fait pas, &
en ayant précédemment le canal de
l'urètre, du dessous le l'urètre
de l'urètre Mr. Dubouché ne le fit en
par son des petites filles, qui à l'urètre
puis son une femme âgée, mais qui
d'ailleurs, attendu que la pierre
avait un trop gros volume. 4^e Le procié
au moyen d'un l'urètre. 5^e Le procié
conduit, & de l'urètre.

369
Parmi ces trois sortes de preuves
qui peuvent passer pour être valides, il n'y
a que la dernière qui soit véritablement
admissible, en faisant abstraction de
tous les autres arguments
qui concernent les parties de l'édifice
de dedans, au lieu de dedans indubitable
ce sont ces derniers qui conviennent les
mieux.

De l'appareil suspubien.

Au dessus de l'ouverture à l'expiration par
laquelle on pratique une pratique
ouverture par la voie de l'abdomen
est de la pierre pour extraire de la pierre
les pierres qui passent y être contenues
cette pierre est en plusieurs, car
elle se remplit de sang, qui fait
conduire à la pierre, et en même temps
qu'il ne peut extraire une pierre
très, grosse, le grand appareil à un
quelque chose de cette, l'expiration
la respiration par qui ne se l'écouler
pas, la saignée, car nous l'avons dit.
Elle se fait avec succès, qu'elle
très bien faite, attendu qu'elle
n'est pas elle véritablement point,
au contraire, même chez les enfants
que chez les personnes avancées en âge
parce qu'ils ne sont point détachés
aussi facilement l'expiration chez eux
attache quelques parties au plus d'adhérence
entre elles. Au lieu de plus tard, l'expiration
attendu qu'elle peut être l'expiration
l'expiration, est de l'expiration de

S.
369

36) Plus loin dans le tissu alvéolaire, qui peut être suivit de la formation d'empyème, de l'importance de l'obstacle, qui permet le contact d'un grand nombre de viscères qui pourraient être suivis d'une péritonite considérable.

Malgré tous ces inconvénients, l'est-elle
de ces où elle croient, - telle que
on ne peut pas, extraire les calculs
par l'analyse finis, elle l'a été de diff
manières, mais qui ont été les mêmes
par la fin même, qui la fait
presque toujours pour les hommes,
attendu que les autres méthodes sont
des inconvénients chez elle et que de plus
elles sont très difficiles à faire.

elles sont très difficiles à faire. L'écrou à la tête de l'épave, au-dessus
et flurial de l'épave, on a vu plusieurs fois
grosse pierre ne peut point faire
la pierre dans cette position, qu'il en
fatigait que pour la fissurer.
Alors, d'une autre pierre, on a vu
tôt le canal de l'épave avec son
petit bandage à l'extérieur de l'épave
qui, quand même la machine s'écroule
dans le moment de l'opération
à laquelle j'étais présent, il n'est pas
possible de faire l'épave de la
pierre, pour extraire la pierre.

Maître, comme
le grand d'un frère d'âme et qui s'est
à grandeur de la même manière, à l'âme

plus de 99 ans modifications. Il faut 362
jours, parvenu, d'abord commencer
par faire une incision au fémur, au
moyen d'un bistouri que dirige le
tégument, le tisse cutané sous-jacent,
puis ensuite le cul de la vessie pour
d'arriver à l'urine chez l'homme
car chez la femme cela est indispensable
attendu que le canal de l'urètre est
assez large chez elle pour permettre
l'issue de l'urine. Je dis pour permettre
l'issue de l'urine, parce que sans cela
si l'air ne pouvait pas issue avant
que l'opérateur, elle prendrait l'infiltre
et être la cause de l'écoulement
aussi est ce que l'opérateur a prévu.
Cela fait, on introduit dans la vessie
une sonde canulée, munit d'un doigt,
qu'on a soin d'en pas faire dépasser
pour ne pas blesser, qui est attaché
les parois de la vessie, au commencement
et continue; y étant au cul de la vessie
la paroi, à la partie antérieure pour
indiquer à l'opérateur l'endroit où il
a coupé, puis lui pratique la division
des ligaments au moyen d'un bistouri en
tenant jusqu'à la partie supérieure
et antérieure en prenant garde de
ne pas blesser la paroi. faite
on détache le péritoine des parois
à l'annexe et le ramenant par le
haut du doigt qui en fait pénétrer

S.

362

388 Dans l'incision, qui doit être faite
précisément sur la ligne médiane
étant un ~~fait~~ pénétrer latéralement
dans le parois de l'isthme, sur lequel
on aggrandit l'incision avec un bistouri
ou un couteau à la main, qui n'est
en l'indiquant d'abord de la symphyse
après avoir été la pyramide osseuse,
crainte de la briser si l'on l'élève,
cela fait l'incision n'est pas
assez considérable en profondeur
pour être avec qu'on en alevé
la pierre et les parois abdominales, qui
permet qu'on l'agrandisse, après qu'on
a lotté, et enlevant les ténues et
l'on fait l'extirpation de la pierre.
La pierre extraite on introduit un
bistouri dans la plaie pour donner issue
à l'urine au dehors et empêcher qu'elle
ne s'écoule. Dans la tige cellulaire
du bladder, qu'on a tiré au dehors de
99 jours, parce qu'il s'opposait à
ce que les bords de la plaie ne se
réunissent. Pendant tout le temps
il y a également une tige de quinquina
à l'isthme que l'on a introduit par
le canal de l'urètre pour donner
issue à l'urine et plus facilement et la
forage en 99 jours sorte à passer par la
pierre les incisions qui ont été
faites se réunissent.

Des Pièces dans Notre 3^e 1/2

Il en est de même pour le canal & fluvial
comme pour les écluses, où les pièces
peuvent y séjourner, sans aucun écoulement
permanente, qui peuvent venir des écluses
ou de la Vierge, qui y grandissent & font
peuvent augmenter de volume. Elles peuvent
être jamais des calculs considérables qui
peuvent se engager, à raison du grand
calibre de l'écluse. Elles peuvent occuper
différentes points de ce canal. Les uns
peuvent être logés au col de la Vierge
les autres au ^{de l'écluse} ~~de l'écluse~~, les autres enfin
près de la loge.

On peut reconnaître une présence
dans l'écluse, d'abord par les symptômes
de douleur que les malades éprouvent
dans le lieu où elles se trouvent, par la
rétenction de l'urine dans la vessie, par
le tout au moyen des doigts palpant
les parties, puis enfin par la Colicébrine
toutes les fois qu'elles se trouvent dans l'écluse
le col de la Vierge, qu'on ne peut pas les
amener en avant, sans les faire sortir
au dehors, et les faire sortir
de la vessie. Dans la vessie qu'on
pratique d'abord une incision pour
les extraire, en coupant les ligaments
les gâchettes, les muscles, la glanée

S.

02
13

363 proutate et le col, de la pierre par ce qu'on
le faitant on s'empêcherait à se pteuer
l'incorporation que pour l'appétition de la
taille, qui serait auins facile à faire
attendu qu'on n'est pas dans une si direc
par un guide.

On ne peut pour ramener la pierre
en descent, dans le canal de l'urètre,
toutes les fois qu'elle se trouve dans
la partie qui correspond au col et au
périnée, tandis qu'on le peut quand
elle n'y est pas. Lorsqu'on lui restait
une et qu'on ne peut pas il y a d'autre
partie à prendre que de faire une
incision sur elle, en coupant les téguments
les grasset et le canal de l'urètre, après
on l'extraire facilement, toutes les fois
qu'elle correspond au col ou de la pierre,
l'opération se termine sans danger. On
pourrait encore tenter de les extraire dans
la pratique si il était possible, on pourrait
de la même manière dans la quelle elle
traverse une petite pince, qu'on puisse
quand la pierre se rapproche qu'on
l'écartant et la poussant avec la pierre,
qu'on une main forte qu'elle la pousse, si
elle la tient bien, on la retirant à tout
un même temps que la canule, fait
qu'on peut l'extraire, qu'on si on n'y
parvient pas, on arrive à la pince
de l'autre, si l'on n'y parvient y parvenant
un peu loin et l'autre moyen, etc.

lin. Quelque tâche de les pousser 366
on pourrait, pour en favoriser l'écoulement,
faire faire usage de saignée de saignée
de graine de lin, puis de saignée. Si
l'on pratiquait une incision, il faudrait
avoir soin pour que la plaie ne
s'engorge pas, d'introduire une
bande de gomme élastique dans la
fessie pendant qu'on pousse, pour donner
une lumière.

De la fièvre entre le prépuce
et le gland.

Il y a un foyer dans lequel on
entre en deux parties, par l'infirmité
de l'urine entre eux, qui arrivent
surtout chez ceux qui ont un saignement, par suite
parce que l'urine se introduit plus
facilement et qu'elle y dépose des grains
solides, de manière à former une couche
grosse. Pour toute la surface du gland
en même temps que l'urine coule
en sort.

On lui reconnaît par un sentiment de gêne
de gêne qui provient de l'écoulement, par
l'écoulement en volume. De la partie
qui se trouve un peu distendue, qui
donne au tact une sensation de
corps résistant. On lui reconnaît
par l'introduction d'un stilet entre
le prépuce et le gland.

Il y a d'autres moyens pour
y remédier que pratiquer l'opération

S.

202

867 Du pécéphymose puis ensuite à enlever
le calcul qui est formé dans la partie
Lecroyde
24 floral

Dérangement de fonctions Des voies Primaires

Elles peuvent avoir lieu dans
les reins, les urètres, la vessie et le canal
de l'urètre, et que fig. la présence d'un
calcul dans une de ces parties, le pécéphymose
de la vessie, ce qui fait qu'elle ne peut
appartenir à une de ces parties en question.
1^o L'urine peut être changée dans sa
quantité et dans sa qualité, qui peut
présenter le caractère puriforme, sanguin
qui peut tenir à une mode de sécrétion
particulière, comme la grêle, puis à une
exaltation sanguine pour la sécrétion. Ce
dérangement de la sécrétion des urines
peut tenir à une affection essentielle
des reins, ou bien être causé par un
causé naissant que dans un très-petit
nombre de cas, car dans le diabète,
la 2^e au contraire peut provenir d'un
très-grand nombre de causes, que nous
ne traiterons point, car appartenant
à la médecine des autres nous dirons
uniquement du diabète.

Du Diabète.

On donne ce nom à une ^{d'une} exaltation
grande quantité d'urine. Pendant
pendant quelques temps et j'est même
longtemps, ce qui la fait distinguer
d'une augmentation momentanée de la sécrétion
des urines, on vient en comparaison avec

l'autre, telle que celle fig. qui a été
à la suite de Maladies, que l'on désigne
sans aucun doute. Le diabète est
caractérisé non seulement par la
sécrétion d'une très grande quantité
d'urine, mais encore par la douceur
de cette-ci, qui se rapproche de l'état
sucre, aussi est-elle qui lui a fait
donner le nom de diabète sucré. Cette
maladie est très rare puisqu'il est
rare qu'on en voye qui guérissent.
Même aussi fréquente dans tous
les pays, c'est aussi qu'on la voit souvent
en Espagne, en Italie, tandis qu'elle est
rare en France.

On reconnoît cette maladie à
l'évacuation d'une très grande quantité
d'urine, quelques Maladies qui ont pour
effets rendent qui assure qu'elle
Maladie fait des progrès d'ailleurs
ainsi que son grand sucre; d'autre part
qu'il y a une grande quantité de sucre
qui les Maladies tantôt cause le diabète
à la perte d'appétit, à la mollesse des
membres par la surabondance du sucre, qui
ne peut servir cependant à rien, et qui
est par là même, attendu qu'on la remarque
encore dans d'autres maladies.

On a proposé divers moyens pour
poursuivre l'enquête des Maladies
examinant les uns ont prescrit
aux Malades l'usage des liquides

Continuer

S.

202

369 en grande quantité, mais au usage
pas en faire usage, attendu qu'il
ne fournit qu'une quantité
insuffisante et fournit plus de mal
que de bien. Il en est de même pour
les Bains. D'autres de substances
absorbantes, afin que les urines ne
soient point séchées en aussi grande
quantité, car le syrop de coing.

De l'Incontinence de l'Urine dans la Vieillesse.

On donne aussi ce nom à
l'impossibilité ou les individus sont
de garder pendant un certain
temps les urines dans la vessie, de
manière qu'ils les expulsent sans
qu'ils le veulent.

Cause. Elle vient que dépend
que de l'irritabilité trop grande
de la vessie, par la présence quel-
l'urine fait ses sens par la, de telle
sorte que sa sensibilité organique
se trouve plus augmentée que dans
l'état naturel, tandis que l'animal
reste comme elle doit être.

On peut dire d'après cela qu'elle
est opposée à la contraction, ou l'urine
est retenue dans la vessie, ce qui est rare.

870
chez certaines personnes qui ont un
calcul dans la vessie qui leur donne
des envies fréquents d'uriner, par un
continuel pincement, de la même manière
que l'obstacle pour elle qui a le
gonocorrhée. Cette irritabilité très grande,
se remarque encore chez les enfants,
qui comme lui s'ont urinant sans
qu'ils y consentent dans quelques cas, qu'il
est bon de ne point céder à l'envie
l'urination de l'urine volontaire, car
cela se remarque chez eux qui sont
pâles de se lever dans certains
moments de la nuit, au de l'urine
crist, pendant les frissons, qu'ils ont - *traitement*
obstacle pour les désobstacles

Il est des incontinences qui peuvent se voir de
dissipation par de petites précautions, & l'obstacle
est ainsi qu'il faut avoir dans
pas faire à l'urine les enfants le soir
c'est par, en leur endormant de
l'urine, et les faisant uriner avant
qu'ils se couchent et grand usage
couché, de les réveiller, pendant
la nuit pour leur faire uriner,
qui a été souvent suffire, pour
la guérison une précaution de
faire usage de l'urine, en urinant
de l'urine, afin de comprimer la

37) La verge, qui causerait un obstacle
est que chez les adultes, attendu qu'
99^{es} il en résulte le gonflement de la
verge, qui peut être étranglée. Au
contraire pour la péripne, d'après
un peu de l'émulsion aux enfants le
lait, d'après quinze très petite
quantité de poudre de sucre de
Cantaloupe, plus la sève, que les
urines produisent une sensation plus
forte pour le passage de l'urine et qu'il
se coagulent sans pour uriner.

De la Rétention d'Urine.

C'est comme ainsi une accumulation
de l'urine dans la vessie, en plus grande
quantité que de nature dans laquelle
il se fait 99^{es} points d'accumulation.
Il est donc de ne pas la confondre
avec la suppression, parce que dans ce
cas de l'urine n'est pas sécrétée, que
l'on pourrait appeler un obstacle
mécanique lorsqu'il y a un obstacle
dans les urètres qui peut seulement
résister que dans un seul.

Cause

La rétention peut dépendre d'un
obstacle dans l'un ou l'autre des conduits
qu'elle traverse, c'est ainsi qu'il peut
résider dans les urètres de la vessie,
et dans le canal de l'urètre.

1^{re} De ceux des urètres et des vésicules.
La Rétention d'urine est un point

aucun lien par différentes causes 372
plus ordinaires sont la prise d'un
calent, qui y a détendu des reins
qui interrompent entièrement le cours de
liquides, ou bien enlève encore
passer au moyen d'une rainure qui
s'ouvre sous une petite fente.

On la reconnaît dans ces cas à la figure
suppression d'urine, à la douleur que
le malade éprouve le long des
Ventre, qui ont communément d'abord
dans un point, puis s'étend plus
lentement que dans un seul; à la non
existence de l'urine en attendant le
malade, par ce qui s'est passé
avant; voir la sortie d'urine
grasse, la tinte colorée en rouge
du sang; qu'on petite quantité.

On a peu de moyen de guérir
en guérissant les Malades, quoiqu'on
a souvent reproduit différents usages
de différentes sortes, est l'administration
de liquides à l'intérieur, pour faciliter
la sortie du calcul, mais cela ne
peut que faire augmenter le malade
puisque ne laissant point, alors les
urines augmentent en volume, et on
même des douleurs. On a aussi proposé
de pratiquer une incision au psoas
de la l'urine pour pousser le calcul
vers aux reins, mais communément

893 le faire, puisqu'on s'en est
incertain de la saillance, puisque
même on le saurait de quelque façon
pour le faire, puisqu'il pourrait le
faire que le saut fut très près de
la Vierge, qu'on en peut saurir
l'écrit, puis en fait c'est que son
apparence donnerait lieu à une
exagération très abondante de l'écrit
dans le bas ventre et la Peste, de la
quelle il pourrait résulter de graves
accidents.

2^e. Dans la Peste

La collection de l'écrit dans la Peste,
qui d'abord n'est simple et commune
~~est~~ à dire n'est en petite quantité,
puis ensuite n'est considérable au
point que la Peste peut en faire
un, qui s'en fait qu'on en fait
ont donné des noms différents d'après
les degrés qu'elle peut présenter, et
de la discorde pour amener sa
simple situation. De la situation
pour les difficultés extrêmes de l'écrit
au point qu'on ne peut en faire
qu'une à quatre, puis en fait
une seule pour amener sa
suppression complète.

Pensez que l'écrit n'est pas une grande quantité
de l'écrit, que l'un peut en faire

a deux espèces 1^{re} a l'impossibilité 374
de la contraction de la vessie, 2^{de}
une obstacle mécanique.

Cette rétention peut être complète,
c'est à dire les malades ne peuvent
pas du tout uriner, puis incomplète,
c'est à dire uriner encore un peu, et
que des sautes ont désigné sous le
nom de crises de la vessie parfaite et imparfaite,
ce qui est en raison des causes qui
les produisent, N^o 1. une pression exercée
dans le col de la vessie par le prostate
par une tumeur, tandis que des brides
seulement dans le même canal ne
peut causer que l'incomplète, qui se
fait cependant par confusion
avec le rétroissement de la vessie, accident
par le trop grand écartement
Ayant vu la vessie augmentée de volume
considérablement de volume de petite
qu'elle est elle devient très grosse
ce qui fait qu'elle change de
rapport avec les parties environnantes,
la présence de l'urine dans la vessie,
persiste pas seulement, mais se
fait encore sentir dans les urines,
qui ont même une odeur
considérable au point d'être sentie
à une certaine distance.

S.

102

Le 373
Le 373
26/10/1811

La même manière que tout se conduit
la rétention, les obstacles n'empêchent
pas seulement de la douleur dans la
région hypogastrique, mais encore un
trouble dans toute l'économie, il se fait
une sécrétion urinaire, qui se fait
tantôt qu'on a des idées, ou parce que
l'urine n'est pas l'évacuée par les reins,
de manière que les urines se trouvent encore
dans les vaisseaux, ou parce qu'étant
mais ne pouvant être évacuée, il s'en
fait alors une absorption, qui est transmise
au diaphragme. Il survient aussi une
inflammation des parois de la vessie; d'où
la distention de la vessie, qui se trouve
dans quelques cas, se fait qu'il y a une
inflammation dans le tissu cellulaire de la vessie,
et qu'elle se sépare dans sa cavité,
c'est-à-dire qu'il y a une inflammation
qui ne peut se faire qu'avec
l'inflammation qu'on a appelée du
diaphragme, qui se trouve dans la vessie
et se sépare de la vessie, parce que l'urine
est un corps bitumineux qui cause par
les qualités la gangrène des parties adjacentes.
L'autre est qu'il se fait un déplacement
qu'on appelle urinaire, dans lequel
il y a des urines, de quelle
nature qu'il se fait. La rupture au
lieu de la vessie se fait au parois

Vala l'urine à l'air q^{est} au malade 396
l'urine, qui dans cette circonstance
est sujet de mêmes inconvénients.

On reconnaît la rétention d'urine à
l'impossibilité ou difficulté qu'a le
malade d'uriner, à un sentiment de
pésanteur dans la région hypogastrique,
à la distension du paroi de la vessie
au travers des quels on sent une
tumeur, qui si l'on y vient à appuyer
dessus cause un sentiment d'urine,
Suite par la présence d'un obstacle
mécanique, ou la présence d'un calcul
ou autre corps &c.

Les moyens qui consistent pour ^{traiter}
à remédier de bonnet ^{à l'urine} à l'urine
l'obstacle qui peut s'opposer au
cour de l'urine et à introduire une
sonde dans le canal de l'urètre pour
donner issue à l'urine, d. l'urine se
puncture de la vessie.

Il convient toujours d'enlever la
cause qui produit la rétention la plus
possible, par ce qu'en faisant la rétention
disparaître, quand à l'introduction
de la sonde il faut également la faire
ce qui ne se fait que par ordinairement,
quand à la puncture de la vessie, on
ne doit la faire qu'à la dernière extrémité,

La vessie est enflammée chez les 338
vieilles, pour laquelle on
prend, ~~apparemment~~ de moyens pour
y remédier. 4.^e au point d'arrêter 40 paquets
de draps de linceul, l'urine grandement
il l'urine, de même que s'il a l'urine
chez eux pour l'urine de
matières fécales. On peut
remédier qu'à peu près l'urine
de la vessie dans la vessie, qu'on
laisse sécher pendant 24 heures,
parce qu'elle est à l'urine
l'urine et qu'on prend pendant les
paquets de la vessie qui avaient été
distendus récemment un peu trop
en urines. Il est inutile pendant
tout ce temps de laisser la vessie
ouverte, il ne faut que la vessie
de temps à autre, pour que les urines se coulent
ne s'accumulent pas en trop grande
quantité, après quoi on l'ôte. 5.^e pour 50 paquets
la distension forcée de la vessie par les urines (distension
de la vessie) manière qu'on la laisse forcée
pour l'urine relativement aux urines
à guérir au remède par l'urine de la
vessie dans la vessie 6.^e pour la paralyse
de la vessie, qui n'est pas susceptible
particulièrement, mais bien d'une manière
générale avec les autres parties de
dans le cas d'apoplexie, de la suspension

S.

202

399 Don Permeau, soit par un frottement
par une pince de son infante dans le
par la section de la moelle épinière
au-dessus de la 12^e vertèbre cervicale, ou
bien par la compression continue de
du Permeau, par une chute, ou par
un coup porté sur la colonne épinière.
Cela ne bien qu'après que la tête est
en un point de la colonne de la tête,
et que les vertèbres de la tête arrivent
recroisés il y a pas d'autres mesures pour
y remédier que d'introduire une bande
de gomme élastique dans la fessière, que
l'on y laisse séjourner, puis de l'attacher
des points résistants, pour ramener les
vertèbres fessières de cet organe à son
état naturel. On m'a même vu qu'on
fait pour redonner la même position
membres inférieurs qui sont étendus
dépoussés avec elle le plus ordinairement.

Retention. Les causes obliques qui empêchent
d'urine de produire la rétention d'urine dans la
vésicule par causes obliques sont très multipliées, qui peuvent
être classées dans 2 de la vessie, ou bien plus
au-dessus, les quels peuvent être classés en
immobiles, qui est de même pour son cotillon
canal de l'urètre. D'abord les examens
dans la vessie, 1^o à son col, 2^o à son
dans l'urètre.

10 Les ~~causes~~ internes qui sont libres dans la ~~888~~ ⁸⁸⁸ ~~cause~~
Vessie peuvent être formés ailleurs dans la
Vessie, au lieu de l'urètre de l'urètre
Les ~~seuls~~ sont l'urètre de l'urètre, les ~~autres~~
des hydatides, des calculs, les ~~autres~~
des tumeurs de l'urètre, et font en g^l. Causer
pour maxime une ~~urètre~~ ^{urètre} ~~urètre~~
égard à l'usage de l'urètre ne il en
rapporte plusieurs exemples, en g^l ~~urètre~~
au premier abord.

Au ne peut reconnaître la présence de
de ces corps étrangers que par la
rapport que l'urètre fait à l'urètre, puis
par l'urètre d'un ~~urètre~~ ^{urètre} ~~urètre~~
Vessie, l'urètre de l'urètre dit il à l'urètre.
g^l ~~urètre~~ ^{urètre} ~~urètre~~ de l'urètre, au ~~urètre~~
et il à l'urètre et l'urètre, il à l'urètre
également. Des hydatides, qu'il est difficile
de reconnaître par l'urètre de l'urètre
Vessie, excepté les calculs.

Au a pas trop de l'urètre ^{urètre} ~~urètre~~
g^l ~~urètre~~ ^{urètre} ~~urètre~~, quand on ~~urètre~~ ^{urètre} ~~urètre~~
hydatides, l'urètre ceux qui il ~~urètre~~
l'urètre g^l ~~urètre~~ ^{urètre} ~~urètre~~ en l'urètre
à l'urètre de l'urètre, l'urètre ~~urètre~~
g^l ~~urètre~~ ^{urètre} ~~urètre~~ et qu'il ~~urètre~~
l'urètre ~~urètre~~ ^{urètre} ~~urètre~~ g^l ~~urètre~~ ^{urètre} ~~urètre~~
g^l ~~urètre~~ ^{urètre} ~~urètre~~ de l'urètre ~~urètre~~
l'urètre de la ~~urètre~~ ^{urètre} ~~urètre~~ ~~urètre~~

S.

202

2889 Avant de faire sans pour
cela interrompre les parois de la vessie
les autres parties, mais il n'en est pas pu
venir à bout.

Intérieur Les causes extérieures libres ne sont pas
libres très multipliées, il n'y en a guère que deux
sortes, qui est la présence de la tête de
l'enfant, dans le Péritoine inférieur ou
Caudex, souvent où il y passe par l'accouchement
puis ensuite la présence d'une fausse la-
graine, dans le cas de rupture de la
Matrice, qui comprime bien et haut
le canal de l'urètre.

Liquide Il est facile dans ce cas d'informer
traitement les caudex. Il en est de même pour le
traitement, car il ne s'agit que de les

~~traiter~~ enlever.

Les causes internes sont en
intérieur petit nombre comme la présence d'un
fistule polype dans la vessie qui agit tant d'
progrès qu'il tient le canal presque
le col de l'urètre, où il empêche l'écoulement
de l'urine y passe. On peut guérir
et même d'un autre genre de fistule
Certains l'atrophie, qui pour cela exigent
que l'on pratique l'opération de la
tête avant, après quoi on se ferait
ce qui présente des difficultés à
faire, qui la rendant être une fois
pas l'usage d'un ou d'un autre genre
de traitement.

2^o Les causes qui peuvent produire la rétention d'urine dans la vessie par 9^o Double ablaie au col de la vessie peuvent être col. Inla interne col. la présence d'un corps étranger et de hydatides, de calculs. On les reconnaît par la présence d'une sonde introduite dans la vessie, puis par la difficulté d'uriner. On ne peut y remédier qu'en les retirant dans la vessie, enlèvement de l'obstacle par le procédé de Hunter. Il n'y a pas de cause ^{mécaniques} pouvant agir sur la glande de la vessie, à cause de la présence de la glande prostate qui ^{second} fait une résistance, en empêchant l'écoulement.

Il y a par exemple beaucoup de la glande de cette glande qui peuvent le produire, lesquelles sont très multipliées, qui sont

1^o son inflammation, qui est très rare, quoiqu'elle a bien produit toujours une augmentation du volume de la glande. Les causes qui y donnent lieu sont pour l'urine, l'usage de l'équitation quand on y est resté habituellement qui peut encore survenir spontanément, On a aussi vu que des vices survenant la déterminer, telle que la rétention de la galle, des dartres de la gaine de l'urètre, elle fait toujours des progrès très rapides, est accompagnée de symptômes généraux, mais qui n'ont

S.

02
3

383 aucun influence sur le diagnostic de
la chlamydia.
signes Au point de vue comme l'inflammation
de la glande prostatée, les symptômes
sont d'indignité à en dire, qui est
accompagnée de douleur au périmètre
assez vives, avec sentiment de brûlure,
restriction au col de la vessie, depuis
les chlamydes éprouvent des tumeurs
et provoquent parfois l'écoulement du corps.
Dans l'intérieur du rectum, ce qui est
déterminé par le gonflement de la
glande prostatée. Quoiqu'il en soit, on a vu
doute sur cette inflammation, on a vu qu'on
pourrait la reconnaître en palpant le
périmètre mais supposait-on le toucher
le plus maigre possible on ne pourrait
pénétrer la tumeur, perçue à l'extrémité
placée derrière le pubis, mais il n'y
a pas de peine à traverser le rectum
si donc on introduit un doigt, on
peut sentir cette glande tuméfiée,
l'indureté saillante dans cet indurité. Il
faut noter aussi l'indignité un ligament au
quel il prend beaucoup d'importance
est la forme des matières fécales,
mais comme ces matières passent par
une ouverture étroite, elles prennent
une forme régulière qu'elles ne perdent
pas dans l'intérieur de la vessie
que les matières sont rendues solides.
Indépendamment de cela, le chlamyde.

est encore de ggrs utilités, mais par 384.
lui on ne peut pas déterminer si
c'est une tumeur de la glande prostaticque,
ou celle de la Vessie, mais étant
parvenue à un point qui a précédé
on peut en acquiescer la constitution par
enfermer.

Après avoir pué au premier abord traitant
surtout, on donne des Boissons abondantes,
parce qu'on augmenterait la sécrétion des
Urines. Tout le commencement antiseptique
de la lésion se par les anti-phlogistiques,
en luttant comme nous savons de
le dire des Boissons avec le Corps
à l'usage des saignées générales et locales
des laxatifs, et pour transporter
le sang du Stomac au rectum.
obligé de lui faire, mettre dans la
bouche des saignées légèrement acides,
si cette infusion ne s'en pas partant,
il faut le déterminer à intervenir une
saignée dans la Vessie en le servant de
préférence d'une de substance métallique.
Les praticiens recommandent l'infusion
d'une substance plus recueillie que les
autres et que la dose soit même large
il faut aussi qu'elle ait un certain
volume mais ggrs le cathétérisme
est extrême. L'efficacité en est tout
il peut plus prouver de pratiquer
la saignée des Vessies avec du Sublimé

385 Cependant quand on a l'habitude de
l'indocilité on peut se permettre de se servir
des obstacles. Supposons que l'un soit
parvenu à l'indocilité, alors il est plus avantageux
de le laisser se gouverner, malgré qu'il
soit en suzerain l'indocilité, mais d'une autre
côté on résiste à la rébellion qui est plus
dangereuse que l'indocilité de la g. l'indocilité
prévalait.

l'indocilité de la g. l'indocilité peut
être comprise de différentes manières, 1^{re} par
résolution et en qui est le plus commun, 2^{de}
par supériorité qui est aussi assez fréquente
et cette supériorité existe tantôt à la supériorité
de la g. l'indocilité dans le titre ecclésiastique
environnant c'est le siège de cette supériorité
qui fait qu'un évêque qu'il peut se
présenter au pape un député, dont on
recommande l'importance, 1^{re} la g. l'indocilité
dans la Basse il peut prouver la même
parce qu'on ne peut pas lui donner la même
C'est la supériorité, à son siège dans
l'intérieur de cette g. l'indocilité et le député
peut servir dans l'ordre ecclésiastique
Basse lorsqu'il sert dans l'ordre
l'importance s'est faite au moment où
il était point, en introduisant une
cathédrale et est rare que cette importance
soit faite à l'indocilité. Lorsqu'un évêque
dans le petit député, au lieu d'être

depuis par la suite, de lors on peut
 être certain que le pus provient d'un
 dépôt de la glande prostate, c'est-à-dire
 d'une introduction de virus fœtal
 mais il faut avoir l'attention de
 ne pas le pousser dans l'urètre
 du dépôt, et même dans ce cas on
 pourrait s'empêcher de l'urètre
 faisant des ingestaions, etc. etc. et d'ailleurs
 beaucoup de soignées.

De l'écoulement Argandineux de
 la glande prostate.

La première qui peut avoir lieu est
 un écoulement Argandineux d'après les
 causes qui le produisent font par
 conséquent, l'écoulement Argandineux
 comme, l'écoulement Argandineux
 moins de la glande prostate qu'il n'y
 a d'écoulement Argandineux qui supprime le
 col de la vessie. Elle peut ensuite aller
 le siège de calculs, lesquels se remarquent
 très rarement, d'autant moins sont-ils
 par l'urine, ce qui suppose une lésion
 aux organes urinaires telle qu'une
 lésion de la tige, aussi les
 calculs sont-ils les mêmes caractères
 que les urinaires, des autres se forment
 spontanément par la cristallisation d'un
 fluide, de cette opinion fait l'origine
 ils l'ont vu, qu'un atome grossier, se

15.
 3
 502
 1.3

587 ces ne sont pas des plus graves que la tumeur
épongeuse, d'autres sont plus volumineuses.
34. La glande prostate est susceptible
9. De l'engorgement chronique, ce qui est très-
engorgement chronique chez les vieillards, car il survient
chronique. une rétention d'urine chez un vieillard
qui n'est pas précédée de la faiblesse
de la vessie, on peut dire qu'elle est d'origine
libre en plusieurs Maladies Vénériennes
Dans l'état Vieillesse on ne peut guère
reconnaître la différence qui se trouve
un engorgement chronique de la glande
prostate, d'après son état d'induration
ou acquise ou le type de cette tumeur
cette tumeur; on ne peut la faire cesser
cette tumeur que par une opération
de rendre les urines, l'augmentation de
l'urine, puis par la tumeur d'un plus
engorgement de la glande prostate, qui est
grande quantité qu'elle continue et la
tumeur est d'un plus grande quantité de
sang.

Seconde - Toutes les affections de la glande prostate
général ne produisent pas la rétention d'urine
en général plus elles sont près de
celle de la vessie plus on a de la rétention
à introduire une sonde dans la vessie
On ne connaît guère de moyen
pour remédier à la rétention d'urine

que l'introduction du ~~glans~~ ^{prostat} 388
laquelle peut suffire dans les organes
Mérieux et dans les autres affections
parce qu'elle entretient le canal de l'urètre
dans son diamètre naturel et qu'elle
donne issue à l'urine. On a proposé
de mettre la grande prostate à découvert
et de l'exciser sur elle une incision
de la même manière que dans l'opération
de la taille mais on a point encore
osé le faire.

3.° ^{3.° dans} L'ulcère qui traverse le canal de l'urètre
par la simple impulsion que lui ^{l'urètre}
communiquent les urines, car le canal
de l'urètre est insensible peut dans certains
cas dilater le canal de l'urètre jusqu'à
l'obstacle qu'il y trouve, par les efforts
qu'il fait pour le franchir par le canal
qu'il se crée lui-même pour le franchir
quels que soient les obstacles qui s'y opposent.

Les obstacles qui se suppriment à leur
l'urine coule dans le canal de l'urètre
sont également internes, externes, les

Par conséquent il se trouve dans le ^{externes et}
canal de l'urètre de la femme à cause ^{internes}
de son peu d'étendue chez elle, ce qui
est arrivé 99 fois. Mais que l'introduction
de corps étrangers dans le canal de l'urètre
des enfants. L'inflammation du canal de l'urètre
est arrivée 99 fois après les accouchements.

S.
02
3

389 rare & compressive, & it is a point large,
desempeles sans les corps extérieurs.
Pendant que l'on regarde l'homme & les autres
de plus en plus multipliés ce sont pour
eux des choses, tant qu'on peut les appeler
à la verge, pour les intéresser les
également, elles ressemblent à celles de
la femme.

Les causes internes adhérentes des
 intestins, 1^o la paratyphloïse, qui agit en étendant
 par son développement le diamètre
 du lumen, parce qu'il étend le diamètre
 de l'utérus pour la quel on a vu
 porter à faire que le l'utérus une
 compression de la manière qui se report
 en un instant, et une compression
 une tumeur; Vénérables au fémur, au
 hydre, au l'utérus; la dilatation
 des corps étrangers, maladie envenimée
 comme, indiquée par d'écouls, et l'écouls
 pour les qu'elle agit en un instant
 qu'entraîne une tumeur dans l'utérus
 Les causes qui peuvent exister dans
 le canal de l'utérus sont très multipliées
 qui sont 1^o l'écouls de la membrane
 muqueuse du canal de l'utérus, griselle
 de tissu spongieux qui se trouve au
 dehors, qui est une des causes de l'écouls
 à raison de cela; celle de la membrane
 inflammée érysipélateuse, celle du tissu
 cellulaire, plogémeuse, et érysipélateuse

est ce qui constitue la blénoagie 390
chez la femme, et la gonorrhée chez l'homme.
Il se que la gonorrhée la plus douloureuse est la
et l'écoulement des matières sont précédés
avec le pucier qu'elle attire toujours
ce qui n'est point, puisqu'elle peut être causée
être produite par d'autres causes telles
que par l'abus de coït longtemps prolongé,
sans même cela qu'elle soit excusée
par une érosion, par l'usage de la
pierre longtemps continuée, par la
répulsion de certaines affections aigües,
celle de la gale, des dartres etc. par
une cause syphilitique; puis enfin
comme elle s'étend peut être
l'écoulement.

Dans ce dernier cas, elle est réellement
une épidémie vénérienne, puisqu'elle
se présente toujours qui s'accompagne peut
être de des symptômes vénériels et
puis que si on voit une femme qui
ait la gonorrhée il peut se faire que
par le pucier qui est en contact
avec le canal de l'urètre, il se crée
sympotiquement des bubons des
engorgements et des ulcérations vénériennes.
Elle est toujours qu'un symptôme
vénérien, mais plus simple que les
autres, qui demande plutôt un
traitement général, mais bien local.

S.

02
3

391 attendu qu'il ne se fait nullement
qu'un écoulement de matière muqueuse
laquelle peut cependant produire des
symptômes vénériens quoiqu'elle soit portée
à un haut degré.

Second
propre La gonorrhée consiste dans un
écoulement plus ou moins abondant
de fluide blanchâtre, purulent,
qui n'est que l'écoulement du canal urétral
proprement dit. Son siège principal est dans
la fosse naviculaire, qu'on regarde
tout le conduit de l'urètre affecté,
d'un ulcère risette des difficultés
d'uriner. Elle est remarquée par son
siège dans la fosse naviculaire. On
il faut bien remarquer que le fluide
vénérien a été absorbé et transporté
par bien il faut admettre que l'écoulement
du canal de l'urètre, se propage de
son extrémité dans toute l'étendue
mais quelle prend plus d'intensité
dans le canal de l'urètre.

Pour que la chancrologie
soit bien il faut que les organes
génitaux soient dans un état d'écoulement.
On pense que tant que l'écoulement, si
l'écoulement ne peut être au point
des contractions cette maladie, au point
qu'on voit la manière dont elle se contracte
il faut qu'elle soit vénérienne.

subtile au au moins perceptible par 992
un contact fugace. De déterminer les
symptômes qui nous allons déterminer.

Cette alloladie se déclare un
temps plus au moins long après
le contact, q^{est} est le même jour
ou le surlendemain, mais le plus ordi-
nairement de quatre au cinq jours
et q^{est} même de huit et dix, en général
l'époque n'est pas bien déterminée.

On ressent un picotement à quoi-
sue de un secouement d'une matière
étouffée en petite quantité, d'une
causée, grêle, bientôt après le
picotement se change en douleur qui
augmente surtout dans l'évacuation
de l'urine, qui se pousse d'autant
le conduit jusqu'à l'urine. Cette
douleur fait naître un besoin fréquent
d'uriner, lorsque même l'urine ne
contient que qqes gouttes d'urine et
entre la vessie à une grande tension
à l'écoulement qui est toujours très
douloureux, parce que le canal de
l'urètre est tendu; c'est ce qui fait que
la vessie se courbe en bas et si
l'érection est plus fréquente, il peut
en résulter une déchirure du balastr
mais cela est rare, le plus communément
elle se courbe en bas, et c'est à cette

396 gonorrhée que l'on a donné le nom
de chaude pisse ordée, en un mot
que les douleurs augmentent, l'écoulement
devient un peu plus abondant, et augmente
encore grand l'ingestion commence
à se distinguer le fluide qui s'écoule
des le commencement est liquide et
grisâtre, lequel devient bientôt grisâtre
et se coagule en linges il est extrêmement
rare, qu'il se détermine des dyssenteries
générales.

Marche de la Maladie. Après
que les premiers que l'on éprouve
sont plus douloureux que les autres,
et plus durables, mais elle varie
suivant les individus, les temps de
douleurs très fortes et l'écoulement
abondant ne se fait qu'au bout de 3
jours, lorsque les douleurs diminuent
l'expectation de l'urine devient moins
plus facile, puis le fluide de l'urine
qui était d'abord blancâtre, acquiert
une certaine consistance, s'écoule
fin de la Maladie et annonce la
guérison très prochaine.

Cette Maladie peut prendre
un caractère chronique et durer
un temps plus ou moins long, les
douleurs sont très diminuées, il y a

que l'écoulement qui partit, les quilles
une prise plus exacte et plus sûre
elle se termine à peu près le trente
un que tant que l'on

[illegible]

S.

02
.3

396 D'orge au delà l'innocence. Comme le
testicule est très susceptible de l'orgasme
dans cette maladie qui alors persiste
plus dans l'utérus, presque les douleurs
et l'écoulement sont cessés, mais ont
l'édorgement du testicule qui se
prolonge et qu'il est d'un long
dure, qu'il peut affecter d'infirmité
terminaison. C'est pour prévenir les
tristes qu'il faut recommander aux
personnes atteintes de la chancrologie
de porter des suspensifs.

2^o La Gonorrhée peut devenir
chronique, alors que ce cas les
douleurs persistent plus, il y a que
l'écoulement qui persiste.
Pour suspendre l'écoulement
il faut employer l'infusion d'orge
à l'état d'orge, pour cet effet, on peut
employer de l'orge en tant qu'il y a
un peu de douleur de l'écoulement
blanche, d'une dissolution de l'écoulement
Cuir les différents préparations de l'orge
une forte décoction de kinkina ou
pourrait ajouter quelques grains de l'écoulement
de l'écoulement l'écoulement fréquente de
l'écoulement, et q. s. malgré l'usage
de tous ces moyens elle ne change pas
de caractère, alors on est obligé
d'administrer un traitement d'écoulement.

3^e. Ulcération de l'intérieur de 397
l'utérus pendant longtemps au point
que la matière sanguine du canal de
l'utérus étoit formée par ces ulcères,
mais il est bien prouvé maintenant
que dans la gonorrhée il n'y a qu'une
inflammation de la membrane sanguine.
Cependant il peut se faire si elle a
été très intense, qu'il se forme,
dans le trou de l'orifice des brides dans
l'intérieur du canal. Ces brides
ne sont dangereuses qu'en ce qu'elles
ne donnent lieu à une cicatrice de
nature qu'il pourroit être le siège de
cancer, de tumeur sanguineuse,
comme physiologiste anglais rapporte
sans raison admet des brides de
l'utérus à sa conception, sans
cesser d'être dangereuses.

4^e. De l'inflammation phlegmonieuse
Les causes qui y donnent lieu, sont
à la suite de la chute, de chute sur
le périnée le frottement de l'organe
ou est due à des affections organiques
telles que les nodosités, les brides etc.
Cette inflammation donne lieu à une rétention
d'urine complète, qui peut être suivie
par suppuration et être dépréciée qui
en résulte tendant à devenir douloureuse.

398 Dans l'utérus du lieu & son intérieur.
Il n'y a pas moyen remède infaillible
qu'on s'en appuierait et quelle cause la
rétention d'urine, d'autre partie à
prendre que d'introduire une sonde
dans la vessie; qu'on a un double but
de suppression à ce que le pus ne s'écoule
pas et s'empêche d'écouler dans le lieu
à l'infirmité de l'urine; ce qui
cause une desdites urines très-faibles
puis ensuite pour procurer la sortie
des urines, des lors la sonde doit s'écouler
dans la vessie, ce qui n'est pas possible
si l'écoulement n'est et l'autre est
surveiller de bien près l'ouverture
et de par cette conduite n'est que
ce qui tendent à l'urine à l'écoulement
quand à ces ouvertures que l'urine
à l'urine à l'écoulement, et fait en fait
l'ouverture des ouvertures, parce qu'il
peut arriver que la sonde ne soit
pas intacte.

§ 6 Des Maladies. Les ouvertures
dans de petits corps. Pour un membre
qui fait la suite d'un autre de
l'utérus et donne lieu à une autre
d'urine. Les ouvertures se trouvent
à la suite de la vessie, d'une
et se trouvent par le bas de la
vessie, et il n'est pas possible qu'il

simples brides, dont trois brées 399
elles s'asservissent lentement, d'abord
l'urine est rendue avec un peu
de difficulté, qui va toujours en
augmentant, au point que la
rétention finit par devenir
complète, en commençant par
d'abord sur le trajet de l'urètre
on voit des inégalités et même
cathétérisme, qui est très
difficile, on ne reconnaît la
présence de la maladie tant
abandonnée à ses progrès, est
alors qu'il faut se former des
fistules urinaires. Il n'est possible
de le dissiper et de rétablir le
diamètre du canal de l'urètre que
par l'introduction d'une sonde de
gomme élastique, dans le canal de
l'urètre
introduction de la sonde dans le canal de l'urètre

second
à l'urètre

la sonde.
sans que qu'on n'ait pu l'introduire
à l'urètre, on trouve qu'il y a
difficulté à la faire, à raison de
l'élargissement du canal de l'urètre
ce qui fait qu'on est obligé d'arrêter
l'usage de la sonde, qui
ne franchit pas l'obstacle, mais
qui au contraire elle ne le franchit pas

420 en les laissant simplement dans le
canal de l'urètre jusqu'à l'obstacle,
facilite la pénétration de la sonde le
lendemain. Si malgré cela on ne
pourrait parvenir à l'introduction, il
faudrait alors avoir recours à la
puncture de la vessie par le canal de
l'urètre, pour donner issue à l'urine.
Il est des praticiens qui ont voulu
suppléer, en ouvrant le canal de
l'urètre avec l'aiguille de l'obstacle, afin
de faire pénétrer une sonde, mais
ce moyen n'est guère employé, par
ce qu'il n'est pas facile de faire l'urine
et qu'il n'est pas sûr, pour cela,
que le corps résiste, ce qui fait qu'il
peut diminuer à côté, sans pouvoir
faire la ponction.

Il est, cependant, malgré les diffé-
rends, grande à introduire une
sonde de gomme élastique dans
l'urètre, par les obstacles qu'on
rencontre, qu'on ne parvient pas
à le faire, en prenant de la patience
et de la précaution. De la manière que
nous venons de dire, sans pour cela faire de
fausse route.
La sonde introduite dans la
vessie, elle donne issue aux urines
continue dans la vessie, mais

7^e C. cela n'est fait par, il faut encore #01
y laisser quelques années pendant que
l'usage, pour que les bords du canal
parviennent à l'état d'affaissement et de destruction.
Les attelles du canal de Lurebra, C'est
pour cette fin qu'on a commencé à faire
usage de bûches, qui étaient toutes
avec des écorces de différentes
différentes, suivant celle que l'on
préférait, mais l'on s'est aperçu
que l'on n'en avait pas tant, pour tant
ce qui est bien prouvé, que quand
les praticiens s'accordent, puis qu'ils
sageaient que par la pression qu'ils
exercent sur les parois du canal,
aussi sont-elles abandonnées pour
ne faire plus usage que des bûches
de chêne et de hêtre, qui présentent
encore le désavantage de ne pouvoir
venir avec et qu'on s'est obligé
de les acheter de la commune de Lurebra
les plus qu'on pouvait trouver
qui ont été et ont détruit les
sables de pierre et de chaux, si on ne
le peut pas et qu'on ne peut pas
faire entrer ces pierres dans
l'eau, qui après avoir été
un peu de temps en l'eau et de
les remplacer par celles de chêne
et de hêtre, qui l'on a commencé de

402. ~~289~~ je j'aurais pu me préoccuper l'insuccès
qu'il paraissait éprouver

Le difficile d'introduire une sonde
dans le canal de l'urètre, au point
acéglais dans ces dernières tinges, insensibles
à l'extrême, les brides et obstacles des
parois du l'urètre au moyen de l'usage
de la potasse caustique, qui s'est
réussit, dans une cité plusieurs années
qui pour cela la servait de l'opérateur
informelle, quel point dans le canal
moyen au moyen d'un petit stilet pour
donner gaines laquille sous l'empereur
dans le commencement de l'opération

Des Abscesses Urinaires.

On donne ce nom à une collection
d'urine contenue dans une partie qui se
trouve dans la cavité de l'abdomen et
qui fait trois espèces distinctes. 1^{re}
1^{re} Les Collections urinaires, 2^{de} Les infiltrations
indurées.

1^{re} Les collections urinaires ont lieu
Collection dans la tige cellulaire sous-jacente à l'urètre
urinaires et à la vessie, par le moyen de leur
rupture, - qui par la suite se répare
les des anévrysmes, sont caractérisés, qui
arrivent également pendant l'une des
cause force de recueillir. Ces collections peuvent
être curées, mais pas, d'opérations

De dans autres affections.

403.

Les reins reconnaissent par la présence d'une tumeur plus ou moins considérable enflant le canal de l'urètre ainsi l'asthme, qui augmente grand desquelles l'urine, et diminue au contraire après qu'ils ont uriné, que l'on peut faire disparaître par une légère compression exercée sur elle.

On ne peut y remédier qu'en traitant la prostate d'une bande introduite dans le canal de l'urètre et la vessie, qui par l'indurée issue à l'urine continue dans la vessie et l'empêche de passer par l'urètre.

2. Les obus urinaires ont également l'air d'une tige ou au milieu de l'urètre et de la vessie, qui sont déterminées par la présence de l'urine dans la tige cellulaire, qui a produit une sorte d'apoplexie, qui peut être combattue d'un peu.

On les enlève par leur caractère rapide, qui en peu de temps fait le degré, à raison de la tumeur de l'urine, qui peut être déterminée à raison de ce qu'il peut se présenter la gaine de l'urètre, on a en suite

S.

202

État acquiescé, sur les difficultés
durées, puis l'abaissement urinaire qui
s'écoule dans le canal de l'urètre
et les urines.

En ne peut faire d'autre chose que
d'introduire une sonde dans l'urètre,
pour l'urine issue d'ailleurs, à l'urine qui
s'écoule encore dans la partie affectée.

Legende
2° prolapsus puis d'insister l'urètre dilaté fait
infiltration 5° l'urine au lieu de produire une collection
periculis, au lieu, peut s'infiltrer dans
la tumeur cellulaire et produire des

infiltrations urinaires, qui peut acquiescer
en volume plus ou moins considérable
qui s'écoule bien attendu qu'il n'y a pas
au point de la rupture, qui est le point
cause et en telle que la mort en soit le
résultat. Ces infiltrations ont lieu
particulièrement au bas fond de la vessie,
qui est très exigu et pas rare de le
voir ailleurs, dont les infiltrations
qui en résultent peuvent se propager au
bassin sans s'écouler, à cause de la laxité
de la tumeur cellulaire dans cette cavité
et même jusqu'à l'écoulement, qui peuvent
durer bien à la suite, si on ne s'en
aperçoit, à cause de l'écoulement
de l'urine dans la partie.

On les reconnaît par la distension 405
des parties, qui le sont plus ou moins, - Signes
qui sont un peu variables, qui donnent
un sentiment de fluctuation par la pression
alternative des parties, à la différence
au les malades ont été pour la plupart
qui aussitôt qu'ils ont eu la vessie et
même l'urètre, car il peut se faire aussi
que cela arrive par là. Les malades
se sentent trouvez soulagés par la
sortie d'une certaine quantité d'urine
hors de la vessie, qui quand même on
ne les reconnaît pas, la présence
de petite escarre qui se forment
souvent, qui peut mettre un peu de
temps à guérir beaucoup d'étendue;
spécialement pour celle des bourses.

Aut que l'infiltration inarête toujours continuellement
car qu'il y ait présence de gangrène,
la présence d'une gangrène n'a pas
sur le champ et introduire une
cande dans la vessie par l'urètre,
pour donner une urétrine, pour
la guérison et le sphacèle qui peut en
résulter, qui arrive d'autant plus
promptement que l'urine s'écoule dans
la vessie même de la peau, si l'on
ne parvient point à l'urètre il faut

pratique Des Scarifications molles
parties affectées, pour donner issue
à l'urine, que l'on fait en nombre plus
ou moins considérables, en se pratiquant
sur tout une sur le lieu de la verge
auxquelles on donne une étendue assez
grande. On applique ensuite des
escars Des Dissolutions De Kinkina
pour prévenir agglomération la mortification
des parties.

Des fistules Ventrals
Au darme est une adé^{de}pendance
qui met l'urine par l'orifice de l'urètre, l'autre
au contraire dans des points des
Vivres primaires c'est la Raine, l'urètre,
la Vessie & l'urètre; les quels donnent
passage à une certaine quantité d'urine
qui l'on distingue par rapport à leur
siège en ventrals & Ventrals.
Causa Elles peuvent succéder, à la rupture
du canal de l'urètre et de la Vessie,
puis à leur division, comme dans
l'opération de la taille, à la suite
d'un accouchement.

Les Ventrals existent presque toujours
près la racine de la verge, à la
partie inférieure, des Ventrals au
perine, se prenant et sont pas rare

De la main à la partie antérieure (An 1707)
partant. Partant de la rupture de la
Vessie; lesquelles sont jointes de
limites précises quand à leur étendue
et à l'induit au elles atteignent,
en effet il est qui passent à travers
l'organe des Ventrals, de manière que
l'on se méprendrait facilement à croire,
l'on étoit persuadé de leur possibilité,
présentant des figures d'hommes,
un caillot qui étoit de couleur
serotum, d'autres aux Lèvres, à l'anus,
et même la partie inférieure de la
poitrine etc. quand toutes ces choses
elles vont qu'on s'en qui par la
rupture, en un temps que celle
de la vessie, par la même de la
tête de la vessie, contre eux, lesquels
présentent une ouverture un peu plus
grande que les autres fistules, par où
peuvent y passer le bout du doigt.
On distingue les fistules urinales, lignes
des vessies, en ce qu'elles se remplissent
passage à l'urine que dans les moments
en les malades urinent tandis
que par celles-ci il en sort continuellement,
on ne peut se méprendre sur ces
deux espèces de fistules, en ce qu'on en

[illegible]

1.^o Pour guérir les fistules du canal
De l'urètre il faut non seulement détruire
les obstacles qui peuvent se trouver dans
ce conduit, mais encore empêcher

Le contact de l'urine sur l'organe ^{propre}
intérieur, sans cela elle ne
guérirait pas. Au patient au premier
dét, en faisant des boîtes étrangères qui
pourrait se brouiller avec les urines
convenablement. Au deuxième par l'usage
de sangria au docteur ou par l'usage
du lait, parce que par elles on donne
au même temps issue à l'urine qui
peut se trouver dans la vessie, & par
le service de la gaine élastique elle
plus grande possible, parce qu'elle
s'accommodent mieux aux résistances
auxquelles les personnes peuvent se
livrer et qu'elle sont moins
susceptibles de blessure. Je dis les plus
grande possible, afin d'empêcher l'urine
de pénétrer par le contact des parties de
la sonde et l'écarter, qui dans ce cas
irait également dans les fistules.
Je finis par ce que les sondes
peuvent également causer par les
fistules de l'urine, parce qu'elles empêchent
pas l'urine de se présenter à la
surface intérieure de la vessie par l'usage
donné par l'urètre et la sonde,
d'ailleurs la sonde dans ce cas ne
est pas d'une grande utilité.

410

puisquel'on a tant de tendresse
 pour les pauvres fétuleux que pour elles,
 qui se trouvent en outre d'une manière
 en ce qu'il faut les laisser continuellement
 au repos, on leur a ordonné de se coucher
 sur le dos, pour donner issue à l'écoulement
 sans empêcher il ne se fasse que l'écoulement
 soit libre et que l'écoulement de la trachée
 aussi bien que pour elles. Mais on ne peut
 cela que toutes les fistules du bas du
 de la Vessie sont presque incurables,
 tandis que celles de la paroi antérieure
 et supérieures guérissent. Il est des cas
 cependant où l'on se peut guérir
 quelques années, sur les fistules, mais alors
 ce ne peut être que par le moyen
 d'une compression, faite méthodiquement
 que l'on peut parvenir à faire guérir
 l'écoulement affecté par la fistule
 de la Vessie. Il n'est pas ainsi pour
 les fistules, on ne peut pas guérir
 plus les guérir pendant de la présence
 de matière fécale dans la Rectum.
 Après avoir essayé par tous les moyens
 parvenus à guérir les fistules Vaginales
 par une compression continue, sans succès
 on les saute, afin d'empêcher l'écoulement

de l'urine par et l'empêchement #111
infiltration urinaire dans le tissu,
ou même que l'on place une bande
dans la fesse, pour donner passage
à ces fluides.

Il arrive même comme nous l'avons
dit faire usage des bandes guêdes
bulgares, parce que par ces dernières
l'urine ne pouvant pas être évacuée
on est obligé de la laisser et ramasser
autant de fois qu'on le voudra l'enlever
urine, l'air n'entraîne pas dans
tous les endroits qu'il faudrait faire,
si l'on le laissait, nous devons
seulement que si l'on désire le faire
il faudrait même de la partie de l'opération
celles de gammes et astiques que les
emplois, qui ne présentent pas
autant d'inconvénients. Les bandes au
bougie introduites, il conviendrait de
les fixer, ce qu'on fait avec profit
de cet au sur la verge de l'homme
pour le faire cela est plus difficile
au les attache à un bandage sur
qui se fait le tour du corps au bout
pour empêcher qu'elle ne soit tordue
ou bien qu'elle entre dans la vessie.
Il conviendrait aussi comme l'on s'aide

412 L'homme avec un petit Amica, les
de la tenue parfaite, l'airant, me
les cas l'airant, puis de la tenue parfaite
de l'homme, puis de la tenue parfaite
qui se font par la tenue à la
extrémité, pour les remplacer par
d'autres. Ces cas reviennent à l'extrémité
de la tenue.

De la sanction de la tenue
Elle consiste comme l'on sait à pratiquer
une posture artificielle aux joints
de la tenue, pour donner à la tenue
toutes les qualités qu'on en veut pour
autre effet.

Cette opération se pratique rarement,
surtout par les praticiens habitués à
la tenue, par conséquent par les
à faire pénétrer dans la tenue
la tenue, ce qui se pratique, c'est qu'on
pratique la tenue, ayant l'air de
pratique en la tenue, qu'on pratique,
encore dans les premiers temps de la
pratique, les premiers temps de la
qu'on en l'airant parfaite, dans la
derniers temps de son existence, en ce qui
parvenue toujours à faire pénétrer
les joints, malgré cela il ne faut
cependant pas l'airant en place.

faire, car il aime mieux faire la #13
punctum, que de faire une fausse
coute, car elle est une opération
trop simple; pour la répéter, car,
tandis que de cette dernière il peut
en faire des centaines d'autres
grandes, est est un reproche que
font les élèves de Ducant, sur ses
pratiques.

La section de la vessie se pratique
dans trois lieux différents, au dessus
du pubis, au périnée, puis au travers
le Rectum. C'est celui qui se pratique
pour la première fois celle au dessus
du pubis. De celle au travers le
périnée, et celle par le Rectum.
Celle au dessus du pubis est celle qui se
pratique le plus ordinairement, elle est
plus facile à faire, et qu'elle présente
moins d'inconvénients. Le effet de la section
par le périnée au point le plus bas
divise la vessie, puis ensuite est qu'on
peut interposer des vaisseaux au-dessus
considérables. De quels qu'ils soient
passent devant le périnée au travers le
Rectum on ne divise pas à la fois
de cette partie, mais on n'est pas
impuissant qu'on divise un autre organe.

414 ~~fluo~~ elle au contraire au dessus du ~~pubis~~
au ~~niveau~~ seulement que la ligne ~~pubique~~
le tiers inférieur puis la fesse.

Deuxième. Celle au dessus du ~~pubis~~ est tellement
précisée, qu'elle dit incontestablement la position
de la vessie par dessus le ~~pubis~~, au lieu
à la manière du ~~franc~~ cames. Celle par
le rectum, peut être remplacée chez la
femme en faisant pénétrer l'index
au travers la vagine.

Il y a une grande différence entre ces
deux manières d'opérer pour le but que
l'on se propose, puisqu'il est dans tous
les cas d'écoulement d'urine à l'urine, mais
il n'est pas de même grandement
utile, en effet. Elle au dessus du
pubis est rarement utile de ~~prostate~~
tandis qu'il n'en est pas de même
pour les autres, puisqu'il n'est pas
extraordinaire d'en avoir une, supérieure
celle que l'on fait au ~~perine~~. Supposons
faites, on introduit dans l'urine et
l'autre manière une sonde de gomme
élastique dans la vessie, pour en avoir
issue à l'urine. Lorsqu'on le fait, que
l'on laisse jusqu'à ce que l'urine
que l'on peut se passer un ~~placé~~ que
les obstacles de canal de l'urètre

avant détruite. au place même 415
Sonde dans la fosse, pour une seulement
d'usage issue à l'urine, mais encore
pour empêcher que la plume ne
ferme et que l'écoulement des urines
correspondant à celle de la fosse au
dessous le fluide ne puisse plus
sortir.

1^{re}. La protection de la fosse au dessous de la fosse
du Public, on trouve le service à la fosse
insuffisante assurément de par d'urine,
qui la protègent d'ailleurs dans
ce cas-ci on a trouvé à dire, mais
qui ne protège pas d'écoulement.
qu'on le voit la raison de la grande
quantité d'urine qu'on a à dire.
Il faudrait si on voulait la faire,
le service d'un tiers quart plus
long que pour la protection au dessus
du Public, que l'on plongerait dans
la fosse, en la faisant traverser de
parties qui se trouvent entre la
fosse et la totalité de l'écoulement,
précisément à son milieu dans une
direction horizontale. Et au point
au centre le puits et l'air l'air
la cause, ce qui donne issue à l'urine,

S.
22

416 que l'on retire. entretient qu'un remplac
par une bande. Car l'on a le goût trop
attristé 7. Pour celle qui traverse le rectum
l'homme il consistait de se servir d'une bande
d'un tiers quart ouche, que l'on port
sur le doigt dans le rectum, crainte
de le blesser précisément l'opération
que forme la vessie au travers du
quel se doit parvenir au p. plonge
après on donne issue à l'urine
au seau par le cas si de suite
En effet 8. celle au dessus des pubis de
le pubis pratique maintenant avec un tiers quart
ouche au lieu de doigt, avec le fait
affilié, en la passant également sur
la ligne médiane. Dont la cambrure
et le tiers quart à ce qui est
et qu'on espère de ceindre qu'après
la cambrure pour empêcher l'urine
de passer puis une oreille sur
sur le p. plonge. Mais petite ancre
à l'extrémité également de la cambrure
pour la maintenir fixe au p. plonge
de l'homme et empêcher qu'elle ne
tombe dans le p. plonge. L'on s'est
avant avoir imaginé pour
empêcher le contact pénible de
l'extrémité de la bande sur les

par voie de la fesse, d'y suppler avec #17
bande d'argent, qu'on lui introduisit
dans son rectum à la place de
proctique, aussitôt de qu'on avait tiré
la canule, mais il est entré de
que ce g. praticien n'ait pas pensé
d'y placer plutôt une bande
gaine étanche, qu'il s'agit d'appliquer
à tant d'autre cas. Et bien qu'il
évite le fait par son succès, et
petit, en lequel se fait une
enflammation de la lésion et empêcha
qu'ils ne se blessent. Il faut aussi
la précaution de les attirer au bout
de qu'on jure, pour empêcher
au bout de la charge de la lésion
piquée, on peut le faire au bout
de qu'on jure sans crainte, parce
les autres auteurs, des législateurs
de la fesse, la contestent en un
véritable canal.
L'usage
furent après de la fesse, de la g. praticien
le malade doit être placé dans une
position convenable. Etant le chirurgien
regarde la lèvre blanche avec le doigt
indicateur de la main gauche, qui

418 L'ayant traversé, il y plonge le
bras gauche qu'il tient de la main
gauche, au levant de la main
gauche, ce qui de ce côté soit l'autre
part, L'au la quelle il appuie
doigt indiquant, à une distance
d'une de la pointe, afin qu'il
confiance au autre point par la
partie opposée de la tête à celle
où l'on le fait entrer. Il faut avoir
soin de tenir le bras dans la partie
de lui faire par contour une ligne
courbe, par ce sans cela il produirait
l'effet d'un bras droit droit et
croit interesser les parties du bas
ventre, outre que la tête; And
à cet effet on le fait pénétrer
qui a un demi-pouce au-dessus de
l'abdomen. Il faut entrer avec un stylet
le pinceau, par la même issue à
l'extrémité, après quoi on place une
sac de digues et de ligatures afin
d'être le temps convenable après
avoir atté la cavité.

De L'introduction de la #19
Sonde dans la Vessie.

Elle est faite pour servir à l'exploration
pour reconnaître une pierre dans
la vessie, ou un corps étranger dans
l'urètre; faire passer l'urine
dans le cas de rétention. Suivant
pour détourner cette dernière de
passer par des conduits qui ne lui
sont pas naturels.

Les sondes avec lesquelles on produit
ces trois effets, sont distinguées en
trois espèces, en algalia, en cathéters
et en sondes de gomme élastique.

Les cathéters servent dans l'opération
de la taille. comme nous l'avons
les algalia à reconnaître une pierre
dans la vessie et à faire passer
l'urine. Les sondes de gomme
élastique peuvent bien servir à
même chose, mais servent plus
particulièrement à faire passer l'urine
à l'urètre et à l'écoulement dans l'urètre
et la vessie pour détruire des obstacles
de celui-là.

parce que de cette manière les parties # 21
sont desquelles on doit insérer le
périnée, pour éviter d'avoir aggraver
un bruyant bruit.

Le chirurgien pour s'en servir doit
être adroite, chez la femme, tandis
que chez l'homme il faut qu'il soit
à gauche, parce que de cette manière
il s'opère plus facilement.

On s'opère les fistules de plusieurs manières
et d'autre sorte, on dit que l'opération
est la même. Dans celles-là, il est très
facile de le faire, parce qu'on voit
l'ouverture de l'urètre. Mais il y en a
par de même chez les personnes,
parce qu'on ne voyant pas l'ouverture
on le trouve par la suite de l'urètre.
De la suite, on y a qu'un seul point
à prendre, le lieu est par là
l'urètre en parant ces, c'est de place
le point entre l'urètre et le
clitoris urinaire. La pousse de la
main tournée devant de la symphyse,
parce qu'il mesure avec l'opérateur qui
s'opère entre les deux parties, on
pourrait encore introduire la main
en tournant, mais cela est difficile,

S.
02
3

422 Si malgré toutes les précautions sur
ce point, il paraît qu'il y a
quelque femme de diable, malgré sa
grande expérience à se laisser
les parties sont à d'émouvoir.

Pour l'un & l'autre des deux
les personnes de l'un & l'autre sont
ambigu sur le bord de l'émotion.
Chez l'homme le chirurgien enroulé
les humeurs pures fait l'introduction de la sonde
en lui faisant parcourir une espèce
de demi-cercle de sa main et l'émotion
avant tout, à l'induire de l'émotion
en l'un & l'autre des deux, car de
l'un & l'autre des deux, car de
Cela de l'un & l'autre, l'émotion de l'un & l'autre
Vergé de la personne avec l'émotion
grosse, de l'un & l'autre de l'émotion et de
l'émotion, avec les quels il abaisse le
pigeon, tandis que de l'un & l'autre et de
l'émotion et de l'émotion du moment le
glorieux et l'émotion il prend de l'émotion
l'émotion. La sonde de l'émotion et l'émotion
au l'émotion, l'émotion et l'émotion, l'émotion
l'émotion manière que la sonde l'émotion
sur la sonde, tandis que l'un
autres doigts se trouvent sous la
conviction. Pour le l'émotion, l'émotion
ainsi l'émotion l'émotion l'émotion
à l'émotion dans l'émotion, en l'émotion

traverse quelle. Letrouve dans une #23
direction horizontale et que l'axe
est amenée sous le pubis. Après
parcourir toute ce canal jusqu'à
leur col comme elle ne peut pas
tant d'être entrées dans l'utérus,
on les retire de l'axe et la Voie
pour leur enlèvement de bascule,
ce qui le fait entrer. Si on
ne le peut pas tant d'une part ou
l'autre par que tentatives d'y faire
pénétrer, si enfin on ne le peut
pas, on introduit le doigt indigéner
de la main gauche dans le rectum,
après l'avoir enduit de Cérat, pour
venir si on en fait l'essai pas l'autre
en appuyant sur son fond rectum.
C'est le faire qu'il n'y a pas
d'obstacle dans l'utérus, qui empêchent
l'opérateur au libre objet de la
tumeur dans la Vessie, il faut leur
servir dans ce cas toujours d'une
grande diamètre. Celles gros,
parce qu'on leur a plus de facilité.
Malgré que l'on dise qu'il est plus
facile d'enlever les perannes
vivantes que les mortes, à raison

424 des Biscia que forme la membrane
mucqueuse, parait trop grande
lacrée, épaveant cela présente encore
un peu de difficulté, d'abord ce
ce par les malades portent aussitôt
les mains à la tumeur, ensuite qu'il
entre dans un état spasmodique par
l'impression de la tumeur sur la membrane
mucqueuse, puis ensuite qu'il y a le
froncement des parties par la contraction
des muscles de la région génitale.

Second 10^e prairial. Au point résider dans une tumeur
différente. Les obstacles qui peuvent
s'opposer à l'écoulement de la tumeur
obstacles une tumeur dans la tumeur, 1^{re} tumeur
qui peut résider de la tumeur car la présence d'une
tumeur corporelle étrangère, tumeur de la tumeur
prostatite, suite de l'affection
organique 2^e dans les obstacles qui
peuvent se trouver dans l'écoulement de
la tumeur, ingénieur plus il est
proches de la tumeur plus il est
à de difficultés à introduire la tumeur
qui si l'on vient à introduire la tumeur
à l'écoulement la faire pénétrer dans
la tumeur, au point de la tumeur
de la tumeur et occasionner des
infiltrations d'urine. Les obstacles

renverser et à ce si grand nombre
qu'on a le difficile à poursuivre
faire entre eux une grande distance
Hessie, puisq'après avoir franchi
un obstacle on entrevoit un autre
ce qui est q'q' au nombre de trois
au quatre.

Au moment dans ce cas faire ^{commun}
entre la grande dans la partie ^{le d'ordre}
de petite - incommode en Prile, l'india, ^{en parties}
q'q' en forçant un peu, fait de
circonstances on l'un ne peut nullement
y parvenir, alors dans ce cas est
il est fait par un autre de l'entente
à l'entente la partie il aime mieux
le conseil à un collège qu'on
soit y parvient plus facilement
à l'entente qu'il sera, mais
manière de se prendre q'q' on
y parvient en soulèvement à l'entente
dans un cas, tandis que l'autre
tient la grande, combien commencent
l'entente dit en introduisant la
du q'q' dans le Recteur
on fait pas l'entente de
l'entente l'entente une grande dans

424 La vessie, doit longg^t de remettre
à le faire une autre incision ^{attendant}
qu'il est arrivé qu'on ^{opère} ~~opère~~ ^{opère}
l'abent, il en est de même dans
le cas de la rétention produite par
l'infarction de la glande prostaticque, que l'on
parvient dans certains cas à dissiper
par des saignées, les accès phlogistiques
si malgré tout cela l'infarction
persiste pas, il faut en venir à la
puncture de la vessie.

Dans le cas où la rétention est
produite par la présence d'un polype
dans la vessie, qui à son siège produit
souvent des qui s'étendent à la prostate
des sensations acut^{es} pressent l'empêchement
de sonder, à fin de pouvoir
franchir l'obstacle, et que l'on fait d'abord
sur un docteur collègue à qui cela
a réussi, mais en général leur
emploi est regretté, car on
peut faire avec des succès toutes
au bien elle permet la vessie à
cylindrique la partie opposée.
Après la sonde introduite dans la vessie
il faut la faire au p^{er} point au moyen
d'un petit ruban de coton qu'on

attache à la verge au bini. meurt 25
atitanda dattin. An duit tottein
de temps à acetre pui la d'ouffellu
pui s'istite pui s'ampiech' qui
en si fice des grossies.

Des Affections Des Organes
P'citant p' les parties destinées à la fonction
la reproduction de l'espèce.
Elles se trouvent au premier vent
d'ail. divisées comme l'ou p'uple
tantio facilment en celles de l'homme
pui s'istite en celles de l'animal.

Maladies Des organes
P'citant de l'homme.

Elles peuvent être rapportées comme
unse l'ou se fait jusqu'à l'ou p'uple
les autres organes à trois espèces
1^o du vice de conformation 2^o
en vice organique, 3^o enfin en
vice de dérangement de fonctions.
Des vices de conformation.

Ces vices peuvent être rapportés à
chaque partie en particulier qui
composent les organes de la génération
1^o D'abord de ceux des testicules
1^o Ces organes peuvent d'abord enraguer

426 Dans la poche que forme le scrotum
manque qui est destinée à la continuation des
des testicules seulement, au lieu d'en deux,
et s'il y en a un manque d'apparence
de leur existence pas même, c'est
qu'ils n'ont pas encore descendu
de l'abdomen qui les amène jusqu'à
une certaine époque.

Cette descente des testicules peut
être retardée jusqu'à un âge très
avancé, comme cela se remarque
dans certains pays, qui ne se fait
qu'une fois vers la puberté. D'après
cela il faut être très circonspect
sur leur existence, qui peut
faire à une distance p. un. éloignée
de la vie. Il est arrivé à de telles
qu'on imagine tout, au point de faire
impossible pour un homme, ce qui
fait qu'on a appliqué un bandage
qui fait la présence de l'anneau
à être évité, ce qui se fait d'habitude
en affection, concubine, au point
de nécessité qu'on se fait l'opération.
Il est des cas où il faut se faire
qu'on trouve trois testicules, mais
cela est rare. On peut en laisser
impossible pour un homme, d'être d'un homme
v. Les testicules peuvent exister.

atrophie, comme cela se remarque chez ^{l'atrophie}
les personnes qui ne font pas usage de semen-
ce de plaisir vénérien, ni de tout organe.

peu tourmentés par des passions.
Il pourroit se faire cependant qu'un
esprit, comme Plg. chez les personnes
qui les ont naturellement petit, que
faisant bien leur fonction, l'écrit
est que chez les personnes où cela
arrive, les testicules sont toujours
précédés d'un peu de gonflement.

2.° De l'écou de la verge. ^{Difurcation}

1.° Il peut se faire qu'elle soit mal ^{de la verge}
conformée, ou cela arrive chez certains
enfants, qui ont comme difurquée.

2.° que le canal de l'urètre ^{ouverture}
n'est pas ouvert au lieu où il se trouve
le gland, ou au milieu de la verge, ^{ouverture}

de manière à ce qu'il ne s'écoule
rien, ou bien se rend à l'écou de
gland malgré, c'est ce qu'on appelle
hyperspécies. Plus cette ouverture
est éloignée de l'écou de la verge,

de la verge, plus les personnes sans
travaux génitaux, sont pourvus
les uns, car elle le fait aussi bien,
mais pour la sortie de la semence.

S.
22

428 Denis Laetius Ducet.

Ces ne peut pas y remédier tant
les foies que l'usage est à une
distance éloignée de l'extrémité de la
Verge, attendu qu'il supposant qu'on
fasse une incision à la verge, qu'on
y place une tumeur, pour la supprimer à
que les parties se réunissent, elle se y
trop de tumeur à se faire, on ne
peut se opposer de sorte que les
personnes sont livrés à l'impuissance.

3.° Le fémur de la verge qui est trop
secoué assez long chez les jeunes sujets et qui
10° paraît petit jusqu'à l'âge de l'adulte,
s'écartant peut dans certains cas être élargi,
du fémur de la manière qu'il y en a chez la
femme dans l'acte du coït, s'il s'agit
avec un peu trop de force, mais qui
ne l'est jamais autant que chez elle.
Tous les cas il peut être le siège de
plusieurs petites excroissances, mais
qui se dissipent très promptement.

Par conséquent 4.° Il peut se faire que en même lieu
l'écoulement de l'urine soit trop court de manière à ne pas
permettre facilement le rapprochement
du prépuce sur la verge, Tous ces cas il
n'y a pas d'autres parties à pincer
quand le prépuce après petite
ciseaux, en prenant toute la verge

lorsque cela arrive de la campagne jusqu'à 429
près le priapisme par lequel s'écoule
il pourrait se faire qu'il résulte
de petits lumbago, que l'impureté
prend ce pour des excroissances douloureuses
de la Maladie Vénérienne.

§. Du Phymosis.
C'est une tumeur ainsi en état dans
laquel le prépuce recouvre le gland
plus qu'il n'est dans l'état naturel. Cette
circonstance n'arrive que dans quelques
enfants, de manière qu'à plus
le gland proportionnellement au prépuce (cause
ou d'ailleurs) qu'il doit acquiescer
plus de volume qu'il en a besoin.
est bon d'observer que dans ce cas on
ne peut d'aucun gland, attendu qu'il
se trouve trop étroit, laissent paraître
précis. Le phymosis dans ce cas est
comme naturel, pour le distinguer
de l'acécité, qui peut arriver par
suite de l'effluve du gland, et de prépuce,
par une infiltration douloureuse
du prépuce, puis ensuite par un
ulcère Vénérien, ce qui fait que toutes
de fois qu'on a occasion d'un phymosis
à guérir. De dire de prendre garde
que cela n'arrive.

S.

22
3

430
signes du remuant le p^{re}cepte à l'imp^{er}ie
on voit les p^{re}ceptes de d^{ic}tion
glorie, par la raison que nous avons
de nous, puis q^uest d'une p^{re}cepte
callins que forme la p^{re}cepte qui ent^{er}
le glorie, qui est ord^{er} l'ent^{er} de callins
V^{er}ic^{er}ic^{er}. Il faut s^{er} faire que l'ent^{er}
embrasse l'ent^{er} le glorie, que l'ent^{er}
ne p^{re}cepte pas p^{re}cepte l'ent^{er}
de l'ent^{er}, c'est que l'ent^{er} p^{re}cepte
l'ent^{er} entre eux et cause une
infatigable dans p^{re}cepte et de l'ent^{er}
on peut encore dire dans p^{re}cepte, c'est
si la p^{re}cepte qui le p^{re}cepte, l'ent^{er}
à l'ent^{er} V^{er}ic^{er}ic^{er} avec trop de force,
que la p^{re}cepte p^{re}cepte p^{re}cepte à l'ent^{er}
instant de l'ent^{er} le glorie et p^{re}cepte
un p^{re}cepte p^{re}cepte p^{re}cepte
l'ent^{er} qui p^{re}cepte.

traitement Il faut pas p^{re}cepte faire d'ent^{er}
toutes les p^{re}cepte q^uest de l'ent^{er}
ent^{er} celles-ci, p^{re}cepte la p^{re}cepte
que l'ent^{er} p^{re}cepte à l'ent^{er}
disparaitre par l'ent^{er} de l'ent^{er}
adventant, c'est de l'ent^{er} de l'ent^{er}
p^{re}cepte l'ent^{er} toutes les p^{re}cepte
la p^{re}cepte est trop long, q^uest de l'ent^{er}
la p^{re}cepte que par la p^{re}cepte l'ent^{er}

circumcision, puis ensuite quand il 431
en fut pas par l'opération du phylactère
entièrement dit.

Circumcision

La Circumcision tire son nom d'une
secte religieuse arabe, était anciennement
de campagne une partie du prépuce. Elle
consiste également à enlever, et trancher
au moyen d'un instrument une partie
du prépuce, mais qui dans ce cas
n'est bien que quand il a une longueur
trop considérable. Sans cela, on ne
ferait pas, attendu que l'on mettrait
à une la vulgare une gaine qui
recouvre le gland et que l'on lui ferait
perdre la mode de sensibilité dont
elle est douée par son contact prolongé
avec l'air. Elle se fait en saisissant
de la main gauche la partie du
prépuce située sous la verge, que l'on
tira seulement un peu pour l'élever
justant extrême, la glaire doit être
indéfectible, tenue ainsi, on se fait
de l'autre la division avec l'instrument
des ciseaux, on him encore une petite
étape faite au recouvre la partie du
ling, on him d'un peu de chaque,
après quoi la réunion se fait un peu
de temps, ce qui tient sous d'autre au

S.

23

432 manqua de graisse. Dans le tissu cell.
ce qui fait que les parties ne supportent
pas. Sans ce qui conserve le phagocytose
maine. Il est dit, il ne s'agit que de rendre
le phagocytose le plus pur, qu'il faut pas faire entrer
de cause d'autre que de l'usage, ni de
la cause d'autre de la différence qui se
résultent, ce qui fait qu'il faut que
ce soit en fait. De cette division il en
résulte q'ff. des lambeaux qui sont en pro-
gres, que l'un est obligé de l'écarter, et
qu'il faut qu'il arrive à la suite de l'écarter
l'écarter, que l'un soit dans le tissu
parce qu'il est susceptible de diminuer
l'écarter.

On voit par cela de différents
moyens, mais lesquels sont nécessaires
pour l'écarter. Seulement que l'un
peut se servir d'un band. On peut
d'un band, en introduisant la ser-
re de la pince et le band, après qu'on
a fait glisser le band de l'autre de
ce band. Seulement, pour qu'il ne
soit pas, on l'allonge à l'extrémité d'un
ou place une petite bande. On peut
introduire entre la pince et le band,
qui n'est pas au-dessus de la pince avec
avoir été introduit. On peut le faire

également avec des Osseaux, ~~Plutôt facile~~ H. 33

de ~~saupar~~ ~~dis~~ ~~trappes~~ ~~legements~~,
parce que de cette manière il en résulte
la décomposition des corps corrompus; pour
éviter cela il ne s'agit que d'une pas
trappes à soit, ~~lesquels~~ ~~se~~ ~~diviser~~

Il faut pour le faire, que les Halade
soient placés dans une situation favorable,
après qu'on aura tenu la verge
par la partie inférieure, on pousse
en suite le prépuce, de chaque côté
l'indroit où l'on veut diviser, ensuite
de ~~on~~ ~~introduit~~ ~~l'instrument~~ ~~entre~~ ~~les~~.
parties après avoir été enduit de
huile d'olive, on a vu le ~~supérieur~~
fait, il y a des lambeaux ~~enlever~~
un ~~besoin~~, après qu'on en placera
la plaie de la charpie ~~et~~ ~~de~~ ~~linge~~ que
l'on ~~soutient~~ avec ~~un~~ ~~petit~~ ~~bandage~~.

Co. Du Paraphimosis.

Le 20
12 Prairial

État dans lequel les personnes qui
sont, ou pensent plus ramener en devant
en devant la prépuce sur le gland, à cause
de son rétrécissement de manière que
la verge se ~~étrangle~~, serrée par
lui, de la même sorte qu'il ~~est~~ ~~est~~
est par l'indroit où il ~~est~~, H. 34

Quelques

travaux ~~lancés~~
des causes qui, y donnent lieu tout
comme nous l'avons ~~beaucoup~~ ~~appelé~~

434 au sécrète dans le mouvement du sang
dans les parties qu'il se trouve par état
de dessus le gland etc.

signes

À cet égard qu'il y a un état
du canal de l'urètre acquiesçant
à une rétention d'urine, par l'indignation
la fesse et son impossibilité par la
de l'écoulement de suite des douleurs
très considérables dans la partie ce qui
fait que la verge se gonfle et va jusqu'à
peu de mesure d'écoulement de l'urine
par la suite de l'attention.

Traitement

Le premier but que l'on doit se
proposer pour y remédier, est d'arrêter
le sang sur le gland, au y parvient
en saisissant la verge entre les doigts
médians et indiginaux de chaque main
qui se tient à terre pour empêcher, fâche
que de l'autre on puisse faire saigner
le gland avec les ongles, on peut tâcher
ces tentatives dans un troisième jour, de
l'épave de quilles on peut faire prendre
des baies adoucissant la verge et
ne faut pas si l'on ne peut parvenir
au but, qu'on se procure quelque remède
plus sûr, par lequel se faisant
refroidir qu'augmenter l'état inflammatoire
et en conséquence celui du gangrène
on doit dans pareille posture en tenir

au débordement.

Au le pratique avec un siphon H²S
coulent, au point étroit, que l'on
introduit dans le siphon, puis débordement
de l'eau en dedans, au lieu si l'on en
a point, on peut également servir
de l'eau de l'extérieur, mais alors on le fait
de l'extérieur en dedans.

Si l'on ne le peut pas faire autrement,
que la gomme survenue, on est obligé
d'obliger le malade à enlever le gomme
de gomme et d'autrefois de pratiquer
l'amputation de la verge.

Des Affections organiques.

Elles sont très nombreuses et.
D'ailleurs parmi celles qui existent, nous
en avons déjà parlé en traitant des
maladies de l'urètre. Il y a bien encore
les affections vénériennes, mais nous
n'en parlerons pas non plus, attendu
qu'il faut s'en occuper dans d'autres
longs états et que cela exige une
étude séparée.

Comme différents tumeurs amputent
les organes génitaux, nous parlerons
succinctement de leur maladies.

particulier
et de la peau au le scrotum n'est d'affection
général susceptible à d'autres maladies des parties
qui celle qui recouvre toute la

S.

22

436 Surface du corps. Elle est fig. d'inspiration
de la contraction très fortement sur
l'impression du froid, ce qui correspond
à la chair de faiblesse, en d'autres termes
à être attaquée de cancer, surtout
chez les petites ramassées, ce qui
se fait même comme cancer des
Rancunes, lequel peut faire le
progrès en peu de temps. A l'effort
d'attention, à diminuer très la force
le contact de la chaleur, indépendamment
de la lassitude chez les vieillards, on
peut d'être tellement grand qu'il a
faute un peu en extrême, comme
le rapport de la force, ce qui est
infinitement rare à la vérité, quelque
on est obligé de faire usage d'un
affectueux suspendre.
Du tissu cell. 1.° de tissu cellulaire. Les affections
d'usage. sont également rares. rare. Hypo-
tisme. état inflammatoire; d'usage
ce qui constitue l'hydropneumonie
qui n'arrive que peu d'usage
de la séreuse, comme dans toutes
les autres parties du corps: le poumon
disque ainsi que par la présence
de l'air dans ce tissu, que l'air
pourrait le développer spontanément,
ce qui n'est pas, mais d'un peu

communication. De même que cela a 437
lieu pour l'hydrocèle, au lieu seulement
dans le cas de gonorrhée, au il se développe
des garrs.

Il y a de l'écoulement dans ces ^{infiltration} ^{de l'écoulement}
Maladies réellement que l'infiltration ^{des} ^{permeables}
qui peut être essentielle au symptôme
Ceci dernière n'est qu'un effet d'un
sympôme sans aucunement des autres
parties du corps. Au à d'autres choses
à faire pour soulager la Maladie, que
de pratiquer de petites saignées,
sur le torse, ce qui donne issue au
sang.

Hydrocèle par infiltration peut être ^{secondaire}
dans les deux ages de la vie chez les
enfants puis chez les Pectus. Chez l'enfant
les premiers par suite de l'impression
de contact de l'urine ^{sur la} ^{bouche}
chez les deuxièmes par suite de parties.
Au la reconnaître par le volume de la
distension et la présence que présente
les bords.

Pour remède il faut d'abord traiter
avoir soin de ne pas la confondre
avec celle de la tubercule vaginale qui
est fait, que par épanchement qui dans
ce cas est ^{transmise} au ^{guérit} l'enfant
en le tenant plus ^{propre} qu'il ne
soit, en l'écoulement le ^{liquide}

458 humides très humides, puis ensuite on
les empêche d'uriner. S'ils ont été
à l'ordure sur les humides. Ce n'est que
l'impression de fluides aromatisés,
car du vin avec de l'eau de rose
qui aura fait infusion 99 ne plante
qui aura été prise 99 ne plante.
guérir les stigmates, sur les Rosiers

Maladies 3. On ne pouvait point encore les
de la tunique affectées de la tunique fibreuse. De l'urine
libre et ce qui tient dans l'autre à regard
Arcturites n'avaient pas encore pu
se jouer d'une humide d'urine

De la tunique vaginale. Elle est
de celles de la tunique vaginale. Elle est
de la tunique vaginale. Elle est
de la tunique vaginale. Elle est

De la tunique vaginale. Elle est
de la tunique vaginale. Elle est
de la tunique vaginale. Elle est
de la tunique vaginale. Elle est

De la tunique vaginale. Elle est
de la tunique vaginale. Elle est
de la tunique vaginale. Elle est
de la tunique vaginale. Elle est

439
l'ingestion d'effluvia irritante dans l'anus
interieur, comme cela a lieu pour celles
que l'on fait dans l'intention de guérir
l'hydrocele. Elle peut aussi survenir
spontanément. Ce qui prouve que cette
inflammation peut avoir lieu, c'est que l'on
trouve qd. l'on a vu adonner des bris
dans l'anus interieur puis ensuite qu'on
remarque à la suite de cette, de suite,
un gonflement du testicule.

C'est donc à la tunique vaginale
qu'il faut aussi rapporter des petits
concréments qu'on trouve dans son
interieur. Des petites concrétions blanches
semblables à celles d'estivation,
qui qd. se sont que cartilagineuses.
Ces concrétions peuvent être la cause
d'hydrocele de la tunique vaginale, en
général cette tunique participe à toutes
les maladies dont les membranes
séruses sont susceptibles.
De l'hydrocele.

Elle est une maladie qui est
susceptible d'affecter les personnes âgées
les âges de la vie, qui forment une tumeur
plus ou moins considérable de forme
blanche résultant d'une accumulation d'un
effluvia dans la tunique vaginale.
C'est donc une maladie qui se confond avec
un épanchement qui survient chez les

Chap

1140

enfants, par l'accumulation égale
 d'un fluide - dans cette petite
 mais qui en diffère, en ce qu'elle
 descendue car, c'est par communication
 avec la cavité des animaux, qui
 peut se faire comme l'un d'eux
 jusqu'à un certain point de la
 avec l'hydruel. Encore on s'aperçoit
 qu'il n'est pas bien prouvé, qui peut
 seulement résulter de la présence d'un
 hydatide, qui lui fait servir au
 développement, par un développement dans
 l'utérus cellulaire. Puis enfin à la
 hydropisie d'un sac herniaire descendu
 dans la bourse, par suite de l'écoulement
 de l'urine - gignale, de la même
 manière que cela peut arriver l'un
 ou l'autre cas.

Cette hydropisie de la tunique
 vaginale, peut porter sur toute
 l'étendue de la tunique, symptôme
 et essentiel. La cause est celle qui
 l'un par l'affection d'organes éloignés
 tels que du foie, de la rate, des
 testicules même, à la 2e. par affection
 organique propre de la membrane
 La 3e. sans altération d'aucun organe
 par suite seulement de la mal
 mais bien par le simple défaut
 de rapport entre l'absorption et

Exhaustive

441

On ne peut guérir cette dyspepsie
 qu'en rétablissant ses deux dernières
 fonctions, que dans leur état antérieur.
 Cela ne peut se faire par une seule
 lin que pour l'écoulement, c'est-à-dire
 la symptématique et la sympathique.
 Il faut donc guérir l'affection de
 l'organe malade.

Leçon du
 14^e floréal.

Leon Du
14 Floral

Hydroneur se développe ordt. avec l'utérus, elle une des hydrogènes qui est la plus longue à se former, & se trouve dans l'Hydrocephale. Cela tient à l'insensibilité de l'ovaire à ce que le fluide s'accumule que plutôt à petit, puis ensuite que la tunique vaginale se retire & se contracte. Quand le fluide est accumulé en grande quantité le testicule change de rapport, il ne se voit plus dans le cas où la partie postérieure & intérieure de la tunique vaginale où il se trouve fixé à la tunique vaginale. Il n'est cependant pas rare que la chose ne soit en sens inverse mais cela est très rare; Cette circonstance est essentielle à remarquer, & à qui on parvient par le toucher à faire la ponction. La tunique donne le plus g^d nombre des cas, se fait en bas, en haut & en avant.

Le contact de ces fluides me le testent.

442 ne détermine son atrophie, mais ne
pourrait pas considérer autrement
que c'est elle qui a produit l'hydrocèle
ou ne la considère pas telle. Parfois
il a augmenté de volume, dans une
cette autre squirop. Cette tumeur qui
un peu plus qui la porte, puis
certaine peut comprimer l'urètre.

Elle se présente dans une forme
oblongue, sans changement de volume
à la peau, parfois un peu durissant
à la peau, chez les enfants l'hydrocèle est un peu
plus longue q. que chez les personnes
avancées en âge, ce qui tient sans doute
à ce que la ligne du cordon n'est pas
encore oblitérée. L'hydrocèle est plus
recurrente chez les enfants, mais
la peau est tendue, blanche, et n'est
pas recouverte de poils, ce qui fait
qu'on peut voir, au travers de la tumeur
une chandelle, tandis qu'on a
pas les mêmes avantages chez les personnes
avancées que de plus la tumeur est
plus épaisse.

On distingue l'hydrocèle du Sarcocèle
en ce que le Sarcocèle est plus dur
dans le dernier que dans le premier et
moins considérable que l'un ou l'autre
cette tumeur à celui du cordon qui
certaine. Habitude y contribue beaucoup.

On peut soulager les malades de deux f. 4.3
manières, satisfaitement, puis radicalement. Traitement
de la première en faisant une ponction
avec un troiquart dans la tumeur
pour donner issue au fluide, lequel
renouvelle autant de fois qu'il
est nécessaire, toutes les fois qu'il
le présente à la cure radicale, qu'il
appréhendait à cause des douleurs qui
pouvaient résulter de l'ingestion qu'il
faisait après. Mais il est à observer
que la ponction de l'hydropneumothorax
peut être suivie de l'hydrothorax ou de
l'air plus de fluide à se renouveler.
99^{off} ces ponctions sont même
en ce qui concerne les malades, mais cela
est infiniment rare, lequel on peut
expliquer par la cause de la ponction
qui détermine l'impulsion du troiquart
estée assez forte pour provoquer
l'inflammation qui a été de toute suite
de l'adhésion des parois de la membrane.
Cependant malgré son
efficacité on est 99^{off} enclin à
la faire, c'est 1.^o quand le malade
le veut, 2.^o que le chirurgien croit
pouvoir le faire avec assez de
viellards, 3.^o que l'hydropneumothorax est déterminé

4444 peu l'affection du testicule y a-t-il
aucun des dangers à prévoir.
La Cise Radicale s'obtient en
détachant l'adhérence des parois de
la tunique vaginale au point où elle
se rencontre avec le canal de l'urètre
plus ou moins haut, si elle est élevée
cause qui provient de l'apoplexie, ou
d'un état particulier du testicule,
puis ensuite l'excision au point
du malade, mais encore peut-on le
faire, car l'état ancien de la malade
ne fait rien, jusqu'à la première
opération était sur un jeune homme
de 25 ans approchant qui m'a rapporté
pas de grand il l'a vu et qui a
rien guéri.

Il y a plusieurs méthodes pour
guérir les Malades de l'Hydrocele
la première l'excision. On se sert
à mettre la tunique vaginale
à découvert, puis de suite d'en faire
l'excision au moyen du bistouri
ou du ciseaux, de l'excision du testicule
et l'on se sert que ce n'est pas
indifféremment que l'on veut faire
l'excision. On attend le moment
qui est le plus favorable pour l'opérer.
2^e En détachant une excision
sur la tunique vaginale, de

manière d'inflammer et faire 1445
contracter des adhérences à des vaisseaux,
on parvenoit à cela, en appliquant
une trousse de pierre pesante
sur le testicule, qui produisoit tout
cet effet en peu de jours.

3^e. En provoquant une excitation
suspensive dans le péricrète à la manière
de halea, au moyen de la potasse
caustique, qui y forme une escarre,
qui n'est qu'une modification de la
dernière, qui lève le kiste dans le
à l'excitation et d'après l'un à l'autre
l'effet des scarifications la membrane, fait
qu'elle contracte des adhérences.

On peut encore guérir l'hydrocèle par le caustique
en excitant également la membrane, mais
il faut que dans tous les cas il y ait une
superficie de frottement.

4^e. En pratiquant tout simplement une
incision sur la membrane péricrétée
la méthode par incision, qui n'est
autre que d'une incision, après
qu'on a placé de la charpie sur la
testicule, qui par sa seule incision
suffit pour guérir, au moyen de
l'excitation qu'elle procure.

5^e. Par la seule présence d'un
caustique dans le capite, sans pénétrer

446 La remploit la poche formée par
la tunique vaginale, comme autrefois
avec la charge. Ces corps sont
une tute, une mielle, qui lui infuse
quintessence, sans être supportée
par elle. C'est praeceat qui les ramène
indigne, elle obtient au pectus praeceat
Et en posant une tute, elle traverse
la tunique, praeceat tute l'unique
se de tute, qui ne fut rappellé
cette que par praeceat, qui praeceat
mit praeceat praeceat, se qui praeceat
cela l'aurait fait appeller praeceat
praeceat. Il a été praeceat praeceat, et
praeceat in lui se est praeceat praeceat
tute, et la tute l'aurait fait car il
tute, il praeceat tute la tute
de la tute maniere que praeceat
praeceat, avec une tute praeceat
le fluide praeceat, il praeceat
praeceat dans la tute praeceat
Toute dans la tute vaginale
praeceat tute la tute, de
maniere a praeceat de praeceat
faites il praeceat le praeceat
praeceat en tute par la tute
qui se praeceat il la tute, tute
quel praeceat une tute au tute
Il a encore une tute praeceat
qui fut faite et est une tute

que cette latente ne soit pas un 447
en excitation, par lequel présente une
suppuration de la tumeur, c'est à dire
la dernière posture avec un petit
bistouri, par lequel avec le bistouri
le fluide se sépare facilement et
sans cause des accidents.

70. Elle laissant à la main de
obtenir le sang de la canule dans
la tunique vaginale pendant 99
jours, afin de déterminer ce. Dans
les autres une excitation de la membrane.
71. Enfin par l'usage de, qui consiste
à introduire au moyen d'une seringue
un fluide quelconque dans la tunique
vaginale, car de l'eau bulbe pourrait
suffire, pourvu qu'elle ait un degré
un peu plus fort au plus fort que
celui qu'elle a, c'est à dire chaude un
peu. Cette opération est due à
praticien anglais, nommé Mours,
non pas celui qui a écrit sur la
chirurgie, car c'est lui qui le rapporte,
on dit que c'est un chirurgien de
son nom qui en est l'inventeur.
On peut aussi pour cela de différents
liquides, car l'eau de vin, l'alcool, le
vin, la dissolution de plantes aromatiques
ou de résine, également, mais nous venons de
le dire, tout cela est inutile, car pour

448 que le but que l'on se propose de faire
pour importer le régime dans une
territoire. Cependant, maintenant, on est
reprenant dans l'habitude que de ne plus
le servir que de vin. On ne s'agit
presque la totalité de la terrique l'agne
avec que l'on laisse l'agneur des
au trois minutes, le temps convenable
suffisant pour déterminer une certaine
passible au malade, car aussitôt qu'il
a l'ing et qu'il ne peut fort on croit
le fluide; on ne laisse pas le temps
qui conviendrait pour qu'il arrive, si
au bout du temps que nous venons de
dire il ne pas l'ing, alors on doit
l'ingestion, ce qui est obligé de faire
dans un très fort.
C'est cette méthode est la seule méthode
en France maintenant au usage basé
qui anglo-taire au elle l'état l'usage
elle ne l'est presque plus, ce qui l'est
disent ils aux accidents qui survient
ce qu'on ne peut pas dire ici elle
tient sans doute à ce qu'il faut dire
qui ont fait usage pour ingestion
de l'état très irritants, avec l'alcali
qui son effet est très fort, et l'état
capable de les provoquer, tandis qu'
par le vin quand l'ingestion est faite
car il conviendrait au de les remédier

450 Du vin chaud, des compresses, puis
un bandage suspensif pour soutenir
ces dernières.

Il s'agit maintenant que l'on opere,
le chirurgien commence d'abord à
l'assurer de l'endroit où existe le
testicule, pour savoir s'il ne serait pas
au-dessus de la tumeur, comme
pas, l'interrompre étant reconnu, le
chirurgien saisit de la main gauche
la tumeur qu'il comprime en haut
pour faire venir au-dessus de
liquide afin d'approcher, dans le
quel se plonge le trois-quart de
droite, qu'il en doit pas enfoncer
trop avant crainte d'blesser le
testicule, ni trop superficiellement,
parce que comme les parties se
resserrent au point le fluide doit
être en il pourrait se faire que
l'injection pénétrât un peu dans
le tissu cellulaire et déterminât des
inflammations considérables de la quelle
pourrait résulter des dépôts et des
concréments, ce qui est très
le trois-quart introduit, on retire
le piston, ce qui donne issue au
fluide par la canule qui était
de remplacé par du vin au moyen
de la seringue, que l'on introduit

danale camela, quel'un l'a dit 431
que nous avons dit, après qu'on
a vu dans une, en exprimant les
chances, a priori, au point de
dessus des compresses, trappes, ou
dans le Vain, qui lui turent par
le passage, que l'on humecte de
trappe à l'autre, jusqu'à ce qu'on
diffère de l'écoulement. Tant
qu'on elle parvenue à certain point,
on touche de la dissipation par le
moyen de cataplasmes, quel'un ont
étalée, pour au contraire l'usage
jusqu'à ce qu'elle soit dissipée, se
qui est 99th, un peu de temps à
l'autre, puis qu'on remarque de
persuader lui être qu'il faut
d'un, d'un et même trois jours,
et si elle ne fait pas, on ne lui
fait venir qu'une apparence, se
qui est 99th, elle se remue.
Si l'on craignoit qu'il y eût une
infiltration dans le tissu,
qui se seroit infiltré au moment
de l'ingestion, le parti à prendre
pour éviter les suites fâcheuses
qui pourroient en résulter, telle
que la ggrane, il faut l'arrêter

[illegible]

la faire p. réservoir, tels que la p. 183

de testicules, de dureté, par inégalité
de surface. Elle peut être cause de la
formation d'un hydropcel, car toutes
les fois qu'on a occasion de la p. 183
sur le cadavre, il y a toujours une
certaine quantité de sécrétion
dans la tunique vaginale.

Si l'on veut débarrasser les
testicules, il faudrait à ce qu'on
semble comme un état passager
sur de cette tunique, fonder la
tunique vaginale, avec dans l'opé-
ration, après quoi on coupe
les vais, ce qui permet alors de
reconnaître si la chose est réelle
q. si elle l'est, elle sera au moment
de l'opération, tandis qu'elle
reste par, alors qu'elle sera
sur le corps de l'hydropcel par
indivision en remplissant la membrane
vaginale avec de la charpie et l'ayant
qu'elle qu'elle se trouve entre les dernières

1. Le testicule peut aussi lui-même qu'il faut
devenir la source de graves affections du testicule
d'abord il peut augmenter considérablement la p. 183
de volume par la présence de la sécrétion
dans son tissu, ce qui est

212

est pas aussi rare dans la pratique journalière qu'on le croiroit au premier abord, chez les personnes qui s'occupent dans l'incubation, et qui sont d'ailleurs tant d'avis de l'écarter, la tache chez elles qui n'est pas fréquemment fait usage, (ce la revient à l'augmentation de la tache)

Signes

Le testicule plus considérable que l'autre pris à ce que nous venons de dire.

Causes

La chose reconnue, il n'y a pas d'autre moyen que de recourir au traitement qui aura aussi usage du traitement d'un jour de nouveau, parce que l'écarter de lui qui s'occupent de testicules, suffit pour le faire expulser et guérir.

Causes

Le testicule peut ensuite acquiescer un volume très considérable par son état inflé, qui s'empêche d'être guéri ainsi y même, ce qu'on ne peut guère espérer que par la bonté de la tache. Deut être d'avis les Hautes qui s'occupent à la forme, qui ont vu quelle s'en cause avec d'ambivalence, qui se communique jusqu'à la Région lombaire, par le moyen des Hautes et n'est spécifique.

Causes

Les causes qui y donnent lieu sont les vents, les chutes, les passions de

testicul, une excitation de la membrane ^{SS}
Vaginale qui si communiquera ^{SS}
une cause sympathique, telle qu'une
inflamm de la membrane muqueuse du
cervix de l'utérus comme adhérence
occasion de la d'écoulement de la sécrétion
La suppression d'une gonorrhée, se qui
constitue alors se qui est appelée la
chaude pisse tombée dans les courbes,
tant comme si le fluide purulent au
lieu de sortir par l'urètre se sécrète
dans le testicul, se qui n'est point,
ce qui n'arrive que comme effet
consécutif, se qui prouve que n'est
point le fluide qui y est, c'est qu'il
n'arrive jamais qu'une gonorrhée
soit plus haute période, mais bien
reste la fin, pisse excrétée qui est
tombée, à la suite d'un écoulement
dans le régime est par l'usage de
liqueurs alcoolisées, du côté.

On remarque trois symptômes
du testicul, par son augmentation
de volume, en peu de jours, 99.
à acquiescence le volume du point,
par la sautillante très épaisse la
d'écoulement des pannes, puis par
quel à précéder.

456 Il s'agit de premier traitement de
cette inflammation d'un caractère local, ^{et}
Cependant puisque sans cela on ne peut pas
aussi bien la guérir. Et c'est la
guérison d'un côté, d'un autre
partir par le testicule, alors les
moyens à employer sont de se servir
des résolutifs, ^{de se servir} pour lacher de l'écoulement
l'inflammation, en même temps qu'on peut
procéder une saignée locale. Répéter
l'écoulement de la suppuration de
fléaulement d'écoulement sanguin, du
canal de l'urètre, le sang qui
coule, tant de la lésion d'une
saignée qu'un place aussitôt dans l'eau
pour y déterminer une excitation
qui soit suffisante et ne soit pas trop
puissante pendant ce temps l'on se
malade à la diète, et lui faire
prendre des boissons rafraîchissantes
La terminaison la plus ordinaire
de cette inflammation est de se terminer
par résolution; ensuite il peut
faire qu'il devienne chronique, qui
dans ce cas on ne peut qu'y faire
saignée, qui quand elle a lieu
marque l'écoulement que pour les parties

qui se trouve au devant de lui, par ⁴⁵
suppression, de manière à dégrader
en de petits squêtes, au lieu d'un
seul. De sorte à exiger qu'on en
fasse l'ouverture, pour donner issue
au fluide purulent, qui s'est accumulé
après quoi le testicule est dégrader
qu'il est en un petit noyau.

Des fois il est arrivé qu'après
avoir vu le testicule, une fois que la
membrane albuginée a été fendue,
que le testicule du testicule s'est
présenté sous la forme de petites
tumeurs purulentes, qui ont fait perdre
le tissu au testicule, et qui ont
détruit cet organe, en seignant
tant en dedans par les petites tumeurs,
ou en dehors par les petites tumeurs.

Il en est arrivé à remarquer qu'il s'agit
très fréquemment de petites végétations
fungueuses, qui sont très difficiles
à détruire, qui résistent même à
l'emploi parfait des caustiques.

De Sarcocel.

Etat dans lequel le testicule est en ^{second}
résistant la tumeur ayant augmenté
de volume, qui résiste d'une manière
très forte au toucher, l'ouvreur,

H. S. D. ~~rapports~~ ~~agrandis~~ de Volume et de souplesse
 De l'acquirier avec ce pour l'usage des
 irritants, une grande plus grande possible
 Il est probable qu'un a souffert de
 Maladie, une affection des parties
 environnantes le testicule, sur du testicule,
 une réaction en fait qu'une réaction
 comment il peut acquiesce le Volume qu'
 décrit Dierkes dans les opérations, en
 parlant de Malabaut. Lequel acquiesce
 soit en portant un Volume approchant
 de 1000 ou traite plus en l'opérant
 en largeur, qui n'est pas plus
 et s'élargit pas qu'une réaction
 Maladie lui aient commencé à l'acquirier
 D'autres auteurs en supposent une
 réaction - ou - des exemples mais qui
 notent pas cette considération.
 C'est donc d'autre au d'abord de
 l'inspection, après la destruction de
 la Maladie, ou après la mort de
 individus, qu'il s'agit qu'un s'agit
 tandis qu'il faut espérer par
 suite de la Maladie son acquirier
 ou qui prouve en fait que
 chose est faite, est que la douleur
 que provient le Cancer du testicule
 n'est pas bien sentie qu'un est
 par suite à l'acquirier par l'application
 des résolutifs et des caustiques.
 Le Cancer développe l'acquirier
 petit à petit un Volume plus considérable.

de manière à prévenir au Valisme H 59
de point et point même d'assortir
était souvent il déterminé descripte
lymphatiques, est ainsi qu'il arrive
99. que les glandes lymphatiques
de l'abdomen, de la tête, du cœur et
spermatique déchargent - or qu'on
reconnait la lésion des parties
en les faisant et par leur aspect
autres
était une caractéristique sans nul il
ce déterminé une inflammation locale,
qui donne lieu à une petite
suppuration lorsque celle-ci est de
petits abscesses ulcéreux, à qui
succèdent des ulcères de même nature
La Puerie au pueriel d'après tout, l'absence
peut, d'après la suite d'insuffisance
de l'application de l'usage instant
mal administré, par une cause
une chute, une pression portée
sur eux de la même manière que
cela a lieu pour celui des mamelles
chez la femme, par la fièvre
varicelle, la rétroversion de certaines
affections cutanées, de l'ecthyma,
d'autres fois spontanément, aussi
peut-il dans ce cas, avoir lieu
agard à ce qui précède pour en
reconnaître le pueriel.

signes 460

Avec le recouvrement non seulement
par son volume la pesanteur, mais
encore par l'étendue, plus considérable
de son diamètre d'avant en arrière
qu'en haut en bas, à l'usage de la
poitrine qui a pressé l'air et l'humidité
de toute la Maladie.
Crainant qu'il faut pour guérir le Cancer
apostolique figurer à son cancer, digne
t-il de l'action d'une puissance capable
au point touché de le guérir par son
cancer pour le recouvrement de la réparation
d'une affection de l'organe extérieurement,
sans chercher de la réparation et en
comparant la cause, ainsi qu'il se
fait dans les autres, les symptômes de la
pression d'un virus. Mais dans
la cause, le cancer apostolique
obstacle à l'action de la puissance
ne pas le guérir, il ne peut pas
être, à prendre ce qui de l'usage
ce qu'on doit faire le plus possible
afin d'éviter l'effacement de la glande
symptomatique. Les parties voisines ne
sont guérie, car ainsi il faut bien faire
attention à l'usage qu'on s'approprie, car
sans cela l'opération ne réussit
pas si on la fait avec elle existante.
pourrait se faire ensuite que la

Maladie fut tellement étendue qu'elle
dans les parties voisines qu'on ne
pût plus qu'on ne. Qu'il exista une
Diathèse cancéreuse comme nous
Lazear dit ailleurs, mais comme
d'après ce que nous avons dit elle
ne paraît point résulter de l'abortion
du fluide cancéreux, on peut très
bien apprécier, ce qui conduit à cette
opinion, ce sont encore deux exemples
cités tout nouvellement par un chirurgien
de Montpellier, qui dit qu'il a vu opérer
deux personnes qui portaient chacune
un cancer, l'un à la cuisse, l'autre
au ^{bas} pied, pour lesquels il fit
l'empyction de laque de la jambe
du côté où existait le cancer, -
malgré qu'il fut considérable, que
la Diathèse cancéreuse cessait bien
qu'il y avait déjà un peu d'écoulement
des glandes lymphatiques des aines,
cependant l'opération fut - ^{de la} ~~réussie~~ ^{réussie}
sans succès de succès.

Cette opération par laquelle on
étranche les testicules a été nommée
castration, en faisant cependant
abstraction de celle qu'on fait sur
certaines personnes pour les priver
entièrement de la faculté reproductive
comme le faitait et le fait encore.

462 Les grands dans certaines cautes, pour
satisfaire à leur plaisir
Elle se pratique de deux manières,
par excision ou par amputation,
La première se fait en divisant le labret
en suite de qu'il au l'édifice
d'assez de temps, après qu'il en
l'ulcère, la et au contraire l'opérer
compréhant dans une incision toute
la peau et les parties qui descendent
le testicule qui se trouvent affectés
qu'il les ulcères avec le testicule
pour la pratique elle nécessite par
de préparation particulières, on peut
seulement dire que l'on fait prendre
dans le cas de douleur de dessein
au malade, et qu'on le maintient
le régime au, on peut aladiéter
Le malade doit donc être
placé commodément comme dans
certaines cautes opératoires, pour
cela on le place sur le dos de
son lit, on lui donne table, on
lui met une éponge qui y étant en lui
écarter les cuisses, pour qu'il puisse
facilement, le chirurgien doit être
placé sur le dos du malade, de la
main à la droite du malade,
Les instruments qui conviennent
pour cela, sont une pince, une

Laide Camalee, une pince à dissection 463
Des aig. viles ou des fils pour faire la
ligature des artères de la tige,
Des compresses, puis un bandage
convenable pour les artères.
L'opération de la castration se fait de la même
manière en différents temps, // 1^o on débale l'opération
qui se pratique avec le bistouri, qui
a été faite depuis l'abaissement
jusqu'à la partie inférieure des
bourses, que les bourses font enfonçant
d'abord un petit à l'aiguille de l'opération.
Dont on donne une des extrémités
à tenir à un aide, tandis que l'on
tient l'autre de la main gauche, pour
après de la droite, en ayant fait
la division en plusieurs de ces
internes, que l'on coupe extérieurement, de
la tige épigastrique qui se trouve
et qu'on pourrait diviser en deux
cousures une hernie; l'opération
étant faite, Des praticiens
la continuent au-dessus de la
laide camalee pour conduire la
bourse sous le scrotum, les autres
simplement saisissant un des bords
de la tige qui n'est d'être faite,
tandis qu'un aide prend l'autre et
l'on l'agrandit ainsi en le serrant
également du bistouri.

464 L'incision faite, il en est qui font
tout de suite la Dissection du Cordon,
d'autres avec une telle celle de la tumeur,
mais il faut mieux faire du cordon
en premier lieu, parce qu'il est fait,
c'est-à-dire l'artere spermaticque d'une
les autres parties pour faire la
ligature, parce qu'il est fait à
grande Hémorragie qui survient on
s'attend par la dissection, après la
séparation du testicule.

Comme la dissection de ce cordon
ou de la tumeur qui en résulte est
toujours très dangereuse, c'est-à-dire
sans doute à la présence d'un
qui se trouvent par point avant de le
faire, l'incision doit se faire en deux
se trouvant dans le cordon.
Quand à la ligature de l'artere
les uns la font tout de suite après
la dissection du cordon et après avoir
divisé ce dernier d'autre ne la font
que quand la tumeur est enlevée
il faut mieux la faire avant qu'après,
parce que dans ce cas souvent le
cordon se rétracte et on ne le peut
plus. En supposant qu'il est fait, il
ne faudrait pas couper tout le cordon,

mais seulement l'artere et les nerfs 465
parce que l'estomac s'opprime
restant intact en presence qu'il en est
retraint. Il faut pour éviter les
difficultés des malades, dissiper
le plus vite possible le tétanos, en
donnant le caustique interne, comme une
canule d'or, pour empêcher l'écoulement
de sang et dans lesquels entrent
malades, par l'irritation de la gorge,
qui empêcherait l'expectation.
Dans un grand nombre de cas, le second est
arrivé à l'émbranchement de la ligature 13^e praticien
et la compression la ligature est
à deux sortes, immédiate et médiate.
La première est préférable à celle-ci,
car elle donne la dernière avec
saisir par l'artere avec le fil tout
entier et quelle peut se défaire de
compression peut aussi se faire de
deux manières différentes, avec une
petite plaque de métal, ou avec une
apoc de la charpie sur laquelle on
applique un bandage, mais il faut
avoir soin de revenir à la ligature
comme étant plus sûre, que l'autre
faite ou lâche la compression qu'on
ne peut avoir fait au dehors, pour

466 main si le sang ne sortira point.

Le sang arrêté, au rapproche
des bords de la plaie, devient
grêle, on applique de la charpie,
après qu'il se forme une croûte
une suppurative, qui diminue la
plaie la cicatrice desuite et la malade
est guérie, ce qui a lieu en grande
tendance si il n'y a pas d'engorgement
aux glandes lymphatiques.

Effet d'une Des parties qui
composent le cordon partielles.
Des parties. Les Nerves sont susceptibles
d'être dilatés, ce qui constitue ce qu'on
appelle l'écoulement, qui était partiel.
appliqués à cette Des Nerves, l'écoulement
que cette Des Cordons est d'écoulement
dans le même état, mais comme
cette maladie est la même il est
impossible de faire cette division.
Elles sont plus fréquentes du côté
gauche que du côté droit, ce qui
sans doute, à ce que le testicule est
plus éloigné de l'anus de ce côté.

Cause. On ne connaît pas trop les causes
elles tiennent souvent à une obstacle qui
arrête le sang, à une obstacle qui

l'apoplexie à son libre trajet du cœur 467
du sang dans les veines du Cordon.

Quelques fois les causes qui y donnent lieu
l'ont, il y a toujours une dilatation
considérable des veines du
Cordon, qui le sont plus les uns

que les autres, ce qui tient à ce que
pendant la vie la circulation
est approchant établie dans son
ordre ordinaire, lesquelles présentent
des nodosités qui y percent et sont
augmentées de Volume.

La variation résulte de la circulation continue
calante dans les veines du Cordon
il importe donc pour la vie
de la favoriser, pour cela on fait
porter aux mères sur le ventre
après l'écoulement des loches, afin qu'elle
se fasse mieux.

2.° Le tissu cellulaire qui entoure l'existence du
dans la composition. Du cord on peut dire qu'il est
aussi très lâche de qu'il est cellulaire,
lesquelles sont toutes ces veines
D'abord il peut se faire qu'il y
trouve augmenté de Volume, par la
pression de la cage, et cela arrive
chez les personnes qui sont qui ne
sont point inquiétées par
l'augmentation de Volume du Cordon.

99th cette tumeur q^{ue} ressemblant au
 grand leucocœre en q^{ue} sorte de
 stéatome, mais rarement pur et celui
 de squames que l'on peut confondre
 avec une autre affection de ce tissu
 cor. 11^e d'un hydrocèle du cœur. On
 supposant qu'on parvienne à la racine
 et fait l'abaissement à la matrice,
 et ce qu'on voit par pratiquer une
 opération, savoir si peu de chose,
 puis que le collaire est fait qu'on
 tendant pour une simple tumeur
 hydrocèle. Ce même tissu cellulaire peut
 du cœur ensuite être le siège d'une épaisse
 au de petite tumeur, contenant une
 plus ou moins grande quantité de
 lécovité, qu'on ne doit pas trop s'en
 appartenir au lieu de ce tissu
 des hydatides, qui peuvent être distingués
 de celui de la tumeur flaqueuse
 à être distingués l'un de l'autre
 du cœur.
 Caudex On ignore entièrement à quoi
 elle est due.

Lignes On ne peut la reconnaître que
 par le stéatome de stéatome
 que donne le liquide en lui imprimant
 un mouvement en sus opposé à l'axe
 puis à l'augmentation de volume

du cordon lui-même. Il n'y a
pas de doute que la faiblesse
de la cavité avec une accumulation
de graisse, ou bien pour une hypérémie
de la tunique vaginale, soit la
cause, au moins une affection
propre à la cavité.

Il est impossible de dire si l'on doit
se contenter d'un traitement local
ou si l'on doit se contenter d'un
traitement général. La tunique vaginale, en
fait, est une membrane qui se contracte
et se relâche, et il est difficile à
traiter.

Quand on a l'écoulement de la tunique
vaginale, on ne peut pas
dire que ce n'est qu'une
hypérémie, et il est inutile de
traiter. Il est inutile de
traiter, et il est inutile de
traiter.

Affection de la Vierge.

1. Les corps caverneux sont susceptibles d'une
dilatation excessive, et il est difficile de
traiter. De la même manière, les
corps caverneux sont susceptibles d'une
dilatation excessive, et il est difficile de
traiter.

470 Indignée par elle-même. On la recommande
à la dilution, qui se fait par
le suint, on pourroit aussi en suggérer
partie que cette affection, mais
on ne recommande pas d'autres personnes
si la chose étoit elle, il faudroit
la laisser à la nature et non
pratiquer pour cela tout de suite
l'amputation de la verge, pour éviter
une rupture à tout dit, par la
grande quantité de sang qui se
trouve, puis qu'elle peut se faire que
les os de la verge soient siens et
d'autant plus qu'elle ne gêne pas les
excrétions de l'urine etc, et qu'on
suppose que la verge se guérira
il sera temps de la faire à nouveau

Maladies 20. quand aux affections de l'urètre
de l'urètre nous en parlerons par après
vous savez les hommes occupés de tout
qui traitent de celles des femmes
De celles 30. de l'os est susceptible de
d'england différentes maladies, mais celles
cette de la membrane muqueuse
mais nous n'en parlerons, d'après
ce que nous avons dit ailleurs, en
ce qu'il s'agit presque toutes d'une
affection vénérienne.

4^o Le tissu cellulaire, il est ^{très} grossier. On trouve
esquissé à de ^{cellules} ~~cellules~~ ^{particulières} cellulaires
en ^{effet} ~~effet~~ ^{il n'est pas possible de}
grain, il est ^{grossier} ~~grossier~~ ^{très} ~~très~~ ^{grossier}
urinaire.

30 La pseudotuberculose est caractérisée
 comme tuberculose des autres parties
 du corps exposée à différents cancéreux
 affections, c'est-à-dire, nous le verrons
 au lieu d'être. Elle est effrayante
 entre les deux de cancer, qui se
 développe par un seul
 petit bouton, un peu un petit
 ulcère, qui par la même
 irritation qu'il a fait acquiesce
 en peu de temps le de progrès,
 puis envahit toutes les parties qui
 envahissent la gorge, et même se
 propage aux parties supérieures,
 et par là cause la mort si un remède
 n'est pas le progrès.

Il n'y a d'autres parties d'arrêter
dans ce cas que de faire l'imputation
sur la charge, qu'il faut faire septuies
ou sur l'impasail cas, pour éviter
l'inconvenant des glaces hypothétiques
sympotiquement, de la même manière

492 qu'elle a l'un pour beaucoup de
botique. &

Elle peut encore être nécessaire pour
d'autres affections, telles que pour
des degres de faiblesse de cœur,
qui y auroient une continuation très
forte, pour toute de leur infirmité
criminelles.

quelque soit la cause qui le nécessite,
il n'y a pas une continuation à faire
comme dans l'impetation des autres
parties, et que des membranes, et affec-
tions dans ces derniers, au lieu d'être
une source de pain ou de raison des
volumes du sang, pour le remplir
de nouveau, tandis qu'ici on a
de la Merge parce que les parties
qui entrent dans la composition se
retrouvent considérablement, surtout
les corps caverneux, ce qui tient
à l'excitation du sang qui la
contient en grande quantité,
qui l'absorption permet ainsi que
si on ne la faisait pas elle former
ou de la lésion d'un état
fibreux qui se prêterait à l'excitation
de l'urine.

47 Hivres des fibres indissolubles pour tirer
les astères, puis, l'étant ôté, introduit
une bande de gomme élastique dans
l'autre pour donner une glorie,
pour empêcher qu'il ne tombe bouché
par les téguments que la suture
sur le moyen, sur lesquels on place
de la charpie, de petites carapaces,
qu'on lui suture par un bandage
approprié à la partie. La suppuration
de suite s'établit et l'on se conduit comme
il convient.

Affections des organes génitaux de la femme.

Il y a tout le plus nombreuses que
celles des parties génitales des hommes
mais il y a cette différence entre elles,
que plusieurs d'elles sont du ressort
de la médecine, au lieu que pour
ce dernier toutes appartiennent à la
chirurgie.

Affections des membranes Membres les examinant sous le triple caractère, c'est à dire l'écoulement conformation, organique et dérangement des fonctions.

Vieillesse de Conformation. 475

Il est très rare qu'on trouve
et auxquelles on ne peut attribuer
un remède lorsqu'elles ont lieu, qui
sont

1^o Défaut de longueur du Mamelon.

On trouve ainsi un état dans lequel
le mamelon ne pousse et ne pousse
que fort peu développé avec, chez
certaines femmes, que l'enfant pousse
le sein et pousse sans succès
qui lui a été répété dans son sein.

Cela arrive particulièrement chez
les jeunes femmes, qui étant mariées
de très jeunes, n'ont pas pu prendre
le développement que la nature leur
aurait donné, si elle ne s'était
marquée au début et joint de la tête
de la génération, plus en suite quelques
idées de platisme. Ces femmes ne les
arrivent pas encore par le
l'esprit, ce qui arrête le développement
au développement, au développement des
mamelles.

Si l'enfant que la mère veut allaiter
ne peut pas saisir le mamelon il
peut-être de faire qu'un plus fort, plus
agréable, plus utile pour

476 sds plus linguistiquement, et commande
la formation de derrière de petits chambrons
à effluents, fait avec de l'ébène, ou
d'ivoire, qui s'adaptent à l'organe,
fait et qd que les enfants en tant
au moyen de l'attraction qu'ils font
en qd que sorte, fait qu'ils s'allongent
et que par suite l'organe pousse
passer. Si malgré tout cela le
chambron ne se développe pas, il y
a d'autre partie à prendre, que
dire à la mère qu'elle se fasse
redonne à un pas vers le chambron
2.° Nombre excessif de l'organe
des aménorrhées des femmes.

Nous dirons aussi, qu'il arrive qd
que des hommes ont des aménorrhées
aussi considérables que des femmes,
qui malgré tout que chez eux qui
ont été débarrassés, produisent l'effet
qd est par la présence de la gomme,
qui à la fin de la vieillesse, par
donner du lait. Au contraire
en général, quelques hommes la
mère n'ont le pendant aux seins
virgines comme les autres hommes
qu'ils s'approchent de du catat
des femmes et qu'ils se touchent.

les saies de celles-ci qu'à une répétition
Mais il est la faire quelcôtine +77
femmes n'ont qu'une seule enaille
pour deux, qui dans ces cas se couvrent
pas toujours la position qui lui est
opposée. Presque toujours dans les
un est trois, quatre, et même cinq
Dans le 1^{er} cas il y en a deux de
chaque côté, puis autre au milieu
Dans le 2^d cas se trouvent trois au
dessus de l'autre, Dans le 3^d cas
sont de chaque côté et des cinquante
au milieu de quatre Dans ces cas
la femme se rapproche en y que
reste de la femme des animaux
se qui est très rare maintenant
tandis qu'autrefois, dans les
anciennes ces chez les grecs, cela
était plus fréquent, se qui se peut
dire en disant que cela venait
de l'imagination des femmes
qui allaient adorer la Déesse de
la stérilité, pour leur santé pendant
ce temps de la grossesse, qui alors
étaient revêtues d'une statue
statue, qui alors imprimait une sorte
particulière aux enfants qui naissent
comme cela, de la même manière que

478 cela, à l'âge de l'enfance, les enfants en France
qu'apprennent le français en France
au monde, pour les qu'on jamaïs
trop attribuer et expliquer comment
cela arrive, ce qui nous fait dire,
arriver qu'un peu trop tard
en ridiculisant les imaginations d'enfance,
incohérentes, sans même cela, l'enfant
trop nous y donne, mais qu'il faut
l'enfant en 39 ne soit un enfant, en
ce point, si on attend, l'enfant
à ce point de transformation d'organes
Maladie organique des
ossements.

Nous nous y arrêtons, car longtemps,
même, les ossements dont ils sont
composés ne sont que des ossements
d'autre maladie que celle des autres
parties du corps, déjà examinée.
10. La peau peut être l'organe
Maladie aiguë, comme les maladies
Vénériennes, les parties de la peau
aussi, les parties de la peau
commencent à arriver chez certains
enfants qui naissent avec la Maladie
Vénérienne, dont les parties de la peau
dans ce cas les ossements se trouvent
être les parties qui se trouvent
premièrement atteintes, qui dans les

480 par leuo d'orelé en a fait ingester
79 ff pour un cancer des Hamelles,
qui n'est pas douloureux par lui-même
Il faut le faire quel singulier, au
plutôt que d'ingester 79 développés par
une cause quelconque, qui paraît à
le terminer par l'opération, fait qu'il
y a un sentiment de fluctuation,
qui dans certains cas est difficile à
sentir, qui paraît à le faire paraître
au docteur, donnant 79 ff. L'un à
plusieurs points orifice scélérats, C'est
bien, ils n'ont pas d'autre sentiment
que celui qui est applicable aux autres
parties du corps.

Lois de 1791 est à remarquer comme l'organe
21^{re} partie générale est de l'ingestion de
Hamelles, dans celles-ci ne traitent
affectées que causentivement qu'à
première, ce qui se remarque par
dans l'épave de la liberté de
Il doit en 90 le titre par de la grande
ingestion de Hamelles, par suite de la loi
Hamelles d'ingestion, ce qui se remarque par
chez les personnes à douloureux, ce qui
à expliquer par la présence d'un

Dans cet organe que l'on a désigné 481
sous le nom Pail, qui dans ce cas
est accompagné du défaut de l'articulation
delaite.

Les ~~effets~~ de ces lésions sont prola-
mugation. D'abord dans les vaisseaux
sécrétoires, de la glande mammaire en elle
qui cause une irritation. Dans cette
partie. Pour nous il nous paraît
plus raisonnable de penser
qu'elle ne résulte que d'une lésion
même de l'organe.

Les Cancers qui se donnent lieu. Cancers
sans impulsion. Ils se trouvent chez les
mauvaises accouchées. La grossesse
laît échapper qui d'ailleurs généralement
dans ce cas chez celles qui ne veulent
pas donner à l'enfant à l'enfant,
l'usage de ce lait que leur ne pas
en faire indiquer paraît se être
aussi une cause ce qui ne les
fait encore plus s'empêcher, si
que j'ai il y a 22 ans occasion
de traiter une dame du danger
celle la tête de l'eff. and de cet
organe chez une femme qui ne
l'est effectivement qu'elle avait un
plusieurs fois dans la nuit sans

482 Mari 99 jours après être
arrivés à la capitale.

Signa. On la reconnaît par l'ingratitude
du plume du sien qui présente
une despiègue de vanda, qui est
accompagnée de d'ailleurs. C'est d'ailleurs
qui est le troisième pas de la solution
mais d'ailleurs pas pour l'apprentissage
de manière à former plusieurs points
dépôts dans le tissu de la glande
ou bien meurt très rapidement
qui survient dans 99 ft, au qui sont
prêt à mourir.

Examen. Il exige dans le commencement
qu'il se manifeste, comme toutes
les autres infirmités l'apparition de
toute enflammation, de saignée locale
que l'on fait avec un desongeur de
dépôt, de saignement de sang.
On a demandé si dans ce cas il faut
d'aller à l'aiter au d'ailleurs, ou
rien ne se fait pas. C'est d'ailleurs
et puis peut-être d'ailleurs. C'est
d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs
à l'aiter, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs
du lait contenu dans le lait.
testifera; Les autres, d'ailleurs, d'ailleurs
qu'on ne fera qu'augmenter l'aiter.

qui se trouve, ce qui est facile de 483
juger, si l'on admet que j'en serais
que l'inspiration du lait n'est
qu'un effet consécutif non primitif
de la lactation.

Laquelle termine par suppression,
au lieu d'être le dépôt, comme
l'on a vu la lactation et la traite
comme une des autres parties du corps.

De l'Uterus Du Sein.

On trouve que l'utérus et l'ovaire
peuvent, que nous nous y sommes
arrête. Dans une manière générale, il est
incapable de passer encore du temps
sans cela, malgré que c'est réellement
du sein dont les autres qui sont
traités le sont de même. Malgré
qu'il y arrive fréquemment chez les
femmes, il y a cependant par
occasion d'autres règles, puisque les
hommes peuvent aussi en parler
ou en être affectés, comme le
démontrent différents auteurs.

Il peut commencer par des
endroits différents par les ligaments,
par la glande mammaire,
ce qui fait qu'est improprement
qu'on dit l'origine du sein pour

Chap.

484 celui des témoignages ^{qui} ~~l'ont~~ ^{donné} de l'ère
disait ~~Causer~~ des ^{testimonies} ~~puissances~~
Causer du ^{secours} ~~qui~~ ^{après} ~~chez~~
la petite ramonata, la ^{meut} ~~est~~
rien à la chose ^{pour} ~~un~~ ^{que} ~~l'indistinct~~
Causer. Il est ^{de} plus fréquents ^{l'ont}
aussi ^{égale} d'ailleurs ^{chez} ~~les~~ ^{trouvés}
aux ^{maîtres} de la ^{publique} ^{et} ^{autres}
critiques ^{qui} ~~à~~ ^{toute} ^{autre} ^{époque}
Il ^{peut} ^{être} ^{la} ^{résultat} ^{d'un} ^{état} ^{de}
chute, d'une ^{pression} ^{sur} ^{la} ^{chemise}
qui ^{dannera} ^{l'air} ^à ^{l'air} ^{développé}
Il ^{peut} ^{se} ^{faire} ^{qu'il} ^{ne} ^{développe}
qui ^{dans} ^{un} ^{seul} ^{point}, ^{comme} ^{il}
peut ^{affecter} ^{une} ^{grande} ^{partie}
la ^{glande}, lequel ^{est} ^{resté} ^{stationnaire}
pendant ^{long} ^{temps} ^{au} ^{moins}, ^{juste}
ce ^{qu'une} ^{nouvelle} ^{cause} ^{dans} ^{cette}
comme ^à ^{le} ^{rappel}
Il ^{est} ^{bon} ^{de} ^{rappeler} ^{qu'il} ^{est}
signes ^{qu'une} ^{effet} ^{secondaire} ^{et} ^{jamais}
^{primaire}, ^{comme} ^{nous} ^{l'avons} ^{dit}
ailleurs, ^{qui} ^{quand} ^{il} ^{adieu} ^{est}
la ^{signe} ^{de} ^{douloureux} ^{très} ^{intenses},
^{pubertaire} ^{et} ^{rigoureux}, ^{qui} ^{sont} ^{des}
^{susceptibles} ^{de} ^{dyspareunie} ^{pour} ^{un}
^{temps}, ^{puis} ^{de} ^{revenir} ^{de} ^{nouveau}
Si ^{peut} ^{qu'il} ^{soit} ^{arrivé}, ^{l'ap}

qui le recouvre en outre des - 488
adhérences avec la glace, de manière
qu'elle s'élève, et qui fait que le
Malinien disparaît en quelque sorte
et ne fait plus qu'un. Pensure
qu'il fait de progrès, la raie
peut avoir l'aspect du terrain en l'air
littéralement, qu'il ne fait pas paraître
par ses bords, mais qui ne fait
que de la surface de la glace
du la grande qui entre dans la composition
Il peut aussi avoir l'aspect d'un
de la glace, ou bien d'un terrain
ce qui le fait distinguer en aigues
étrangères, car cela se remarque
dans les lieux qui sont destinés à
servir d'asile, aux personnes qui s'en
trouvent affectées.

Mais la dernière chose à faire, est
de voir que le Canada s'en est
soustrait, que d'un faire l'attention
requiert le plus de la part
prendre, sans avoir regard à l'avenir
à tous les moyens intérieurs qu'il
qui existent pour lesquels on
est obligé de passer à se conformer
les anciens, attendu leur grande
sécurité. Cette maladie ne survient

486 rien dans le principe, si les femmes
qui en sont atteintes espèrent le
courage de se faire à l'encre ou à l'huile
qu'on leur envoie au quel il faut
se former, le squire même résiste.
Au cas le même insensé
à crainte en pour l'insensé de
Cancer au sein, que pour celui de
testicules, chaque quand il s'agit
à ces derniers et qu'il y a un
des glandes de l'huile de l'huile
ou ne peut pas opérer sur l'impure
le petit pour les hommes, chaque
pour l'huile en même temps le
glandes lymphatiques de l'huile,
correspondant au lieu affecté.

Au l'huile de la même manière
qu'on s'en fait pour les autres parties
du corps, on fait une incision
circulaire autour de la tumeur
ou bien une incision en T, pour
une tumeur que, l'un à l'un de
comprendre l'engorgement de l'huile
supplémentaire de l'huile.

Au a l'huile de la même manière
des glandes lymphatiques de
la tumeur s'engorgent de la même
manière que la tumeur parallèle

Ventre, mais les inspecteurs anatomiq^{ues} 38
ne l'ont pas encore fait voir.

Les instruments nécessaires pour
opérer, consistent seulement en un
simple et non de cet instrument
crust, formé de deux lames
en manière de ciseaux, qui se réunissent
de même, avec lequel on enlève
d'un seul trait tout le kink, il faut
desorte une pince à disséquer des
brins de paille, de la charpie
des compresses et une ou deux
bandes.

On se rend si dans le cas
d'urgence avant des glaires coagulées
il faut commencer par les enlever,
à l'instant il faut faire en premier
lieu l'abaissement de la tumeur.
Il y a des praticiens pour bien et
autre partie, ceux qui disent qu'il
faut commencer par enlever les glaires,
disent pour raison que si on
commence par le sang, les affections
suffrantes de la veine, ne font rien plus
qu'enlever les glaires des
autres disent pour raison qu'une
fois que la tumeur est enlevée
on enlève avec plus de facilité
les glaires. Quelque chose, nous

1889 Lannes de l'École de ses dernières.
 Second 22/ prairial Reput d'arriver à l'incision qui coupe
 Différentes Verticale, horizontale
 plus oblique, en se servant pour
 indistinctement de l'un ou de l'autre
 pour la pratique.
 La verticale est faite de telle manière
 qu'un grand angle doit se trouver
 devant et de l'incision. Hécate de
 classique, tandis que l'autre au contraire
 de traverser au-dessous du même. Mais
 ce qui est surtout la incision est faite
 grand d'après des témoignages, pour la
 magnitude de l'incision, elle est
 très difficile à la faire, j'en suis sûr
 c'est que si l'un est obligé de faire
 une nouvelle incision pour enlever
 grandes arthrose, cette dernière se
 réunit à angle droit ou à la
 précédente, ce qui est très difficile
 à guérir.
 La verticale est présente pas à l'angle
 d'avantage, mais que si elle la fait
 et qu'il faille enlever, les grandes
 arthrose, l'incision pour la pratique
 au dernier lieu, se réunit aussi à
 angle droit, cependant elle présente
 de la difficulté pour la pratique
 l'oblige est des fois la préférée

en enjambant elle se prolonge jusqu'à 490
sans l'écarter, dans les cas d'engorgement
lymphatique, de manière qu'elle puisse
cas au point où elle se termine et
écarter sans suppression à la réunion
des bords de la plaie, que l'engorgement
d'ailleurs prolonge suivant qu'elle
cas l'exige

Art de l'opération du Cancer
Simulée et tout guéri, voici comment
qu'on opère. Le chirurgien doit
se placer au devant du Malade
et se pencher en avant de la plaie
afin qu'il soit dans une position
qui doive empêcher l'hémorragie par
division de l'artère en bas, puis devant
en avant en bas, afin qu'elle soit
massée au moment où elle se coupe
de la continuité par l'opération du
sang qui est coupé, et qu'il ne reste
rien de la plaie du côté du thorax,
après quoi on revient à l'écarter
entière de manière à en rapprocher
l'entière entière dans une
incision, ce qui constitue l'opération
toute de l'opération, ce qui fait
bien attendre en changeant l'instrument
de la plaie
La dernière se compose à distinguer
la tumeur du reste de la plaie qui se détache

491 la posture, ce qu'on fait en commun
par le haut de la tumeur & par le
on s'en rend indubitablement en bas. La
main droite est celle qui est du
costé gauche, qui seule peut suffire
mains qu'elle soit pour se maintenir
à droite qu'elle fasse. Tandis que
la main gauche ou dominante tienne
l'ouverture qu'on lui fait, en allant de
dehors en dedans. Auroit l'air
à grands écarts à l'extérieur, & de
mouvements bas & élevés au dedans.
Sont pour cela aller trop vite & trop
d'intervalle de parties qui, au fond
pour l'ouverture que l'on a faite
se transmettent & se font
des parties cellulaires est trop dure
que les ossements sont trop durs
la partie, on est obligé d'en enlever
ce qui exige alors de l'attention de
part de l'opérateur, qui met & fait
les écarts nécessaires, qui sont
de faire l'opération de l'écarter.
Comme on dit, toujours
un assez grand nombre de fois
en enlevant la tumeur, faut-il
tant de suite la ligature de
au bien attendre que l'opération
soit faite. On peut s'y prendre si l'on
vient à propos, mais on ne

[illegible]

Affections des Organes
général de la femme. Premièrement dit.
Nous nous en occuperons que d'une
manière très superficielle, au dessus
quoique très nombreuse, en laquelle
appartiennent les mesmes accouchements
avec les différents déplacements de la
cervix; l'autre à la chloïde
comme les catarrhes de la membrane
et l'augmentation du vagin, de l'utérus; puis
enfin nous nous occuperons de la traitement de
ces maladies vénériennes, comme aussi
les maladies de ce genre.

1^o Des Vices de Conformation
de la Vierge. Ces vices sont
généralement presque toutes les
vices, soit adhésives, soit différentes
en particulier qui la composent.

langues
extraordinaires
des grandes
lèvres

1^o Les Grands Lèvres elles sont
rarement mal conformées. Quant au petit
pénis, il est souvent en état de tout ce qui
concerne l'hermaphrodisme, qui n'est
que des vices extraordinaires.

2^o Les Petites Lèvres, elles peuvent
être certaines personnes avec une
très considérable, de manière à empêcher
à ce que l'acte du coït soit très
exigé, et les plus fréquents accidents.

qu'à l'excès, ce qui tient sans - 1494

d'autre à une chose de particulier
Si par exemple le prépuce, il faudrait
en faire l'excision, ou bien le couper
un peu; cette opération est une chose
d'hygiène, à la circoncision des hommes.

30 Le Clitoris peut être ~~en~~ Clitoris -
acquies en volume plus considérable augmenté de
qu'il n'est au commencement, de volume.

manière à ce que qu'on en fasse la
résection, attendu qu'il peut gêner à
l'acte de la conception. Mais les plus
ordr. en le fait pas possible
mais bien à cause de la sensibilité
trop vive chez certaines femmes,
qui influe sur les ~~parties~~
du système génital le quel est tellement
fort, qu'il est des femmes qui sentent
jusqu'à l'excitation des hommes pour
y satisfaire, ce qui est d'autant plus
faut, qu'elles ne peuvent pas se
satisfaire comme elle le voudraient
car des hommes le font, au lieu
en à qui se masturbent avec du bien
en irritant le cul de la femme,
qui propage le désir d'une
certaine quantité de plaisir,
qui quand cela est sensuel -

495 *dictoire* Insens la dance de plume
et *Maladies* très facheuses
inapertation 4^e Il faut de faire insens que la
De *Chymen* membrane hyman soit imparfaite
est adire quelle n'est pas parfaite
ce qui peut se reconnaître chez les filles
filles qui naissent tard de suite, agissant
pour remédier à ce le change en l'air
elles si on ne le fait pas, on en fait
apparaît qu'à l'usage de la parité
en ce que les filles apprennent des accoucheuses
à chaque époque de la menstruation
par l'accumulation du fluide que l'on
fait dans la cistivité
Il faut pour le reconnaître l'usage
de cela, l'insensibilité de l'air au test
la jeune personne en question, si elle
a déjà eu des règles (car on ne
peut demander tout de suite à une jeune
l'opération des parties), si elle a été
sage, la conduite des personnes avec
et quelles elle trouvant inférieure que
cela. Si au contraire tout cela au regard
est de suite l'accumulation, il faut
venir à l'usage de la parité
de *Maladies* reconnues, il y a
d'autres parties à prendre qu'il faut
faire l'insensibilité avec un instrument

1. C. tranchant, comme au testicule, qu'il y a
l'annee garnie de linge jusqu'à la pointe
après quoi on place de l'effluve
un corps dilatable pendant qu'il y a trop
pour s'appuyer de la cage l'admission
de l'admission se résume.

Ligature
13 prairial

2. Maladies Organiques de la
partie de l'generation chez la femme.

1. Le grand levrier, l'union
est une zone expressée de l'union
organique, que celle de l'autre
partie du corps. L'union tissulaire
peut être le siège de dipente pénétrante,
de l'union, un amas grand, qui
est assez fréquent.

2. L'union se voit par des petites
levres.

3. Le Clitoris, la membrane
unipennée ne présente pas de l'union
particulière, il en est de même pour
la tige, qui n'est pas exposée
car les corps se trouvent de l'union,
pour la tige, à une distance
considérable, en manière de l'union.

4. Le Vagin. Il y a que la tige de la
membrane de l'union qui n'est pas
l'union de l'union de l'union,
qui est l'union, qui n'est pas

497 que son infirmité que l'on désigne
l'on a le nom de Gonorrhée quand
à son autre tumeur, quoiqu'on se représente
de celui de la Matrice, on n'en connaît
pas.

La Matrice la membrane
et le vagin, peut également être
siège d'infirmité, ce qui donne lieu
De la Blennorrhée ou balatation ou gonorrhée plus ou moins
ou catarrhe utérin considérable, que l'on désigne sous
le nom de catarrhe utérin, ou bien
de Blennorrhée, que l'on peut aussi
appeler appétite pour le blanc,
qui ressemble en cela à la Gonorrhée,
qui peut avoir un caractère aigu
ou bien chronique et se manifester
comme elle peut l'être.
Il faut remarquer que, si l'on
a vu ignorer à tout ce qui est
possible comme une lésion indig-
ne la chaude-pièce, à qui elle
est due, ainsi que l'infirmité si la
forme à être sage, si elle a une
forme ou bien sans elle et sans
attaquer de la Matrice l'infirmité
Mais il y a cela de particulier, c'est
que les femmes souffrent plus
douloureusement que les hommes
ce qui fait que malgré qu'elle

elle peut encore servir à l'acte 498
de coït.

Comme l'utérus, il n'y a pas
d'autres moyens à employer que
le traitement aux Vénériques.

Les autres maladies de la Matrice
peuvent avoir un autre caractère, ou
bien elle peut être mal conformée,
ou bien être atteinte organiquement.

D'abord elle peut être déplacée,
de manière à former hernie. Déplacement
entraînant le vagin, ce qui est une cause de la Matrice
ou une indigne Cellule, ou qu'on ne
retrouve pas. Il y a d'autres
déplacements qui peuvent également
avoir lieu, soit par la Matrice,
ou bien l'utérus après, ce qui n'est
pas toujours indigne, car appartenant
aux accouchements, les quels peuvent
avoir lieu dans le Bassin ou bien
au-dessus dans la cavité abdominale.

Elle peut dans la cavité du Bassin
se présenter sous une forme première ou 1^{re} Dureté
de la grosse, ou une grosse saignée
dans le temps, la Matrice se jette le long
du Bassin. Ces déplacements peuvent être évités
se faire. en devant, que l'on désigne
dans le cas de rétention, puis

499 en arrière et qui est désigné dans
 celui d'anti-rétroversion. Ils mûnt
 vers le lieu que par la tendance
 qu'on la matrice de prendre une
 position horizontale, de l'écarter
 quelle a naturellement. Il nous semble
 dans tous les cas, qu'il est très
 difficile de reconnaître
 l'anti-rétroversion est toujours
 très facile, même dans ces
 la partie de la matrice qui agit
 contre le Rectum pour causer une
 situation de matrice faciale, c'est-à-dire
 il est très facile de reconnaître
 la quelle on a pu dans l'écarter
 temps dans l'écarter, même la
 mort par l'écarter, qui sont
 12 de faire une dissection et l'écarter
 qu'on donne une vue des cas qu'il
 remonte par l'écarter, même
 alors la matrice tend à se relever
 son premier état. Le de faire
 l'écarter de la dysphagie, sur
 20 autres qu'on donne l'écarter.
 Les déplacements de la matrice
 vers la cavité abdominale
 peuvent avoir lieu devant ou
 derrière au à droite ou
 à gauche. Celui qui se fait en
 l'écarter. Celui qui se fait en
 devant à l'écarter dans tous les
 grossesses, mais il n'est considéré

commune et maladie qui guérit il
est trop considérable, puis qu'il y a
est des moments au fœtus d'un
pas en q^{ue} sorte entre les
Pariétales // y a de toute esp^{ce} qui
ont lieu en l'utérus, en l'un la
Guaiche de l'abdomen // In l'empêchement
de la matrice
Le déplacement qu'on a observé
peut s'expliquer après la grande
et celle qui le fait par la façon
de toute sorte qu'il se maintient dans
l'intérieur de cet organe, qui va Pendant
l'un que par son rapportement
au tronc l'un est ce qui arrive
le plus ordinairement en la que l'un tire
l'un bas sans par le second
ombilical, par l'intervention de
placenta, // fait l'empêchement
l'un d'un des vaisseaux qui la
matrice et la placenta se joignent
fortement un ensemble, que dans
ce moment l'accouchement ne s'accomplisse
par cause des vaisseaux de la matrice
l'apertion de ce de l'organe alors
voici ce qui arrive, est qu'on s'efforce
toute la placenta, au moment la
matrice par un de l'un pas
plus, attend que cela s'accomplisse
les accouchements ainsi qu'on les
autres de l'un d'un, en disant.

501 que ne convenussent qu'à la réduction
et la maintenance avec des moyens
convenables. D'ailleurs de l'attitude
secondaire le prolapsus relâchement de l'utérus
le 4 prairial de l'année de la chute de la République
Duguesne a vu dans le cas de l'utérus
de la chute de l'utérus en même temps que
pour la vagin est considérable, en même temps que
les ligaments qui fixent l'utérus
les parties latérales du bassin sont
bien distendues.

Il est bien toutes choses égales d'ailleurs
causer plus chez les femmes qui ont eu des
enfants et chez celles qui sont âgées
la force par l'usage des efforts
qui chez beaucoup.
Il est bon de ne pas la confondre
avec l'admission de l'alanguissement
vagin chez les femmes qui ont eu des
enfants, mais que dans ce cas il
n'est pas aussi étendu qu'il l'est chez
celles qui n'en ont pas eu, qui ont
pas une chute de l'utérus, mais que l'utérus
n'est pas aussi étendu qu'il l'est chez
celles qui ont eu des enfants. D'un autre côté
signes considérables du cas de l'utérus
au la racourcissement. D'abord l'unique
rayons de l'utérus, qui distend

éprouées instantanément pénible dans gar-
tes lumbes, les reins; la présence
comme d'un corps étranger dans le
Vagin, qui si loin y porte le doigt,
s'accommodant en effet si la chose
existe, qui la présente sous la forme
d'un corps pénétrant dans le Vagin
qui se trouve enfoncée par lui, qui
se suffit à porter la bonté doigt
à son point d'arrivée au sein en cet
de sa ~~inspiration~~ du canal de
la che, de suite sur la tumeur, une
anastomose quinquennaire, qui est
l'origine de la Maladie. De suite au
point si loin tout s'élève sous la main
en la passant un peu en haut, la
recevoir dans sa position naturelle,
qui peut elle même la rendre par
une position horizontale de la femme
qui la porte.

Conduit dans toutes les Maladies
du Vagin même de l'Utérus portées
en effet le doigt dans le premier point,
par lui on parvient à arriver des
éclaircissements plus exacts de la
Maladie. Le toucher est chez les
femmes ce que le cathétérisme est
chez l'homme, pour les canaux de l'office.

305. Il est impossible de déterminer
sur cette maladie si l'usage bien
attentif à tout ce que nous avons
de dire et à tout ce qui a pu servir
la maladie. On doit encore remarquer
quelle cause de difficulté d'urine,
ou ce que dans ces cas la difficulté d'urine
d'une manière très forte. On doit
au cas de la difficulté d'urine, puis ensuite qu'il
y a des difficultés de miction.
On a vu d'autres maladies pour
certaines y remédier, que de faire prendre
une position horizontale des malades,
après l'urine réduite et l'urine crasseuse
de ne pas faire d'effort, ce qui
peut dans certains cas suffire, si la
maladie n'est pas très ancienne, et
que la difficulté ait de la tendance
à reprendre son premier état. Si
cela ne suffit pas, il y a d'autres moyens
à prendre, que de faire uriner
parce que l'on place dans le vagin
une l'ingénierie est de faire uriner
sont obligés de porter, tant que la
maladie existe, lesquels médicaments
sont les parties latérales du vagin.
Les femmes sont de trois sortes
il y en a 1^{re} de rudes, que l'on fait
susciter du siège, au lieu d'uriner d'abord.

qui se trouvent mélangés de l'écume, qui
l'empêche d'être liquide et fluide, qui
l'en laisse refroidir indistinct. Cette
première espèce n'est qu'un employé,
avec le sica peut fondre dans certains
cas et par la cause des associations
par la présence contre le vagin, au
lieu de supposant que ce ne soit pas,
il se peut devenir rude et irrité
par son contact heurte, qui peuvent
donner lieu à des développements de
petites verrues. 2: Il y en a d'autres
qui sont de mêmes couleurs et ovalaires,
fait en écorce, mais en différent en
ce qu'il se trouve adapté au vagin
qui est destiné à la stimulation
avec, qui se trouve à l'écume. 3:
Enfin il y en a de jaunes et rouges,
qui ont forme allongée et creuse
au dedans qui sont les derniers insectes
et sont destinés à faire le plaisir
sans comment qu'on les entendit,
les uns et l'autre pour eux de la
première espèce, il faut les faire entrer
verticalement jusqu'à fond du
vagin, contre le cul de la femme
qui y étant parvenu au contact

505. ~~faute de~~ De sorte à affecter
une position verticale est ~~travé~~
Personnel pensait se faire qu'en
rien pas about, il est y ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~
de faire à une partie supérieure
en petit rebord à cauler, qui
est à la tirant en avant, en même
temps qu'en les pousse par en bas, ce
qui n'a rien de commun l'un ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~
la cause l'un introduit d'une manière
horizontale. Pour ceux de la même
on les introduit de la même manière
que précédentes, toute fois, après
avoir été avant l'âge, quel
et adapté après, une fois qu'ils
sont, ce qui ne peuvent assigner
au moyen de la ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~ quelle position
l'après cela ceux de la tradition,
rien de plus facile à même d'aller
forme, qui les introduit en même
de l'air.

En cet ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~ obligé de la ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~
à trois espèces toutes les ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~
beautés, au ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~ est des ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~
qui, ne peuvent pas ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~
espèces, tandis qu'elle ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~
telles autres, aussi est ce ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~
il ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~ toujours ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~
une certaine ~~g~~ ~~g~~ ~~g~~ parce que

comme étant obligé de les soigner
il est des femmes si elles s'avisent
qu'elles ont déjà le sort, elles ne
demandent pas d'autant qu'elles en
seront, attendu, qu'elles savent très
bien qu'il n'est permis elles qui ont
du mal, avec la possibilité de
que cette maladie pourrait leur
être communiquée.

Il faut aussi savoir qu'une femme
qui rapporte, de lui ramène de tels
autres de temps en temps, pour les
météores et employer la malpropreté
qui se amasse, qui pourrait être la
source de Maladie.

On pourrait dire celles qui n'ont
plus de règles, le service de fait
fait avec de l'éponge, qui se retirent
sur les parties, sont très mauvaises
quels on a tiré de grands effets.
D'autant est même ceux qui tiennent
servent le plus, et qui a servi à
leurs employes.

Altérations organiques de
la gestation

Il y en a beaucoup, mais

507. Des qu'il les nous en parlerons de toutes
en acquiesçant apparemment à la même
env. les fleurs blanches ou catarrhe
utérin. les ulcères, nous ne parlerons
qu'indes Polypes.

Des Polypes de la Matrice.

On entend ordinairement par là
le développement d'acrobases qui
se développent à la surface interne
de la Matrice, qui le percent dans son
ter. pointe de manière qu'à son
et dans le Vagin, qui grandit
est acquit un volume assez
considérable, s'élève et se présente
dans l'intérieur de ce dernier organe,
et même se présente à la surface
Mais il est reconnu maintenant
que ces Polypes peuvent se développer
non seulement sur la membrane
interne de la Matrice, mais
encore au-dessous d'elle, dans le
tissu même de la Matrice, puis
enfin au-dessous du Périvaginal. Cette
connaissance se doit aux anatomistes
modernes. Comme ils ne dépendent
pas tant de notre objet, nous ne
présenterons que de celle de la Matrice
Même qui peuvent être d'une

Substance spongieuse, prise filtrée 308
On ignore entièrement la cause,
quoiqu'il y en ait plusieurs causes
d'écoulement, puisqu'ils arrivent
chez les jeunes femmes comme chez
les âgées; chez celles qui ont éprouvé
du coït, car celles qui n'ont
pas fait, chez celles qui ont une
des enfants en partant, comme qui
n'en ont eu qu'un petit nombre, et
est également à remarquer qu'il y a
une plus ou moins de la même chose
chez les femmes qui ont une
et qui ont perdu leurs règles.
On les reconnaît aux rapports
qu'on leur fait des femmes, qui
disent ressembler un corps dur
du ou dans l'intérieur du vagin, puis
ensuite qu'il y a une dureté des
kénaragies, qui survient très-tôt
pendant tout le temps de l'écoulement
mais on s'aperçoit aisément de cela
le toucher, par l'induration du
doigt dans le vagin, avec lequel
on sent un corps dur, résistant
accroît, qui ne présente pas de
cel de la substance, mais

509 une petite foule, rainée, dans le
quel on peut faire pénétrer l'air
du doigt. Il y a par suite de
petite fente dans la tumeur.
Dans le cas de hernie de la matrice,
il faut comme l'on voit par les
cratères qu'ils dépassent le col de
la matrice.

On ne peut acquiescer les femmes
que par le moyen de la légèreté,
ce qui n'est en usage que depuis
le milieu du siècle dernier, ce qui
doit à l'usage qui est le premier
qui a fait connaître cette manière
de guérir.

Pour cela il faut des instants
particuliers, qui ont été ensuite
modifiés, et ensuite en très grand
nombre, lesquels ont été plus ou
moins compliqués, et à quel point
nous sommes parvenus à décrire
même les instants, nous nous bornons
à ces instants par l'usage, qui
ont au lieu d'être plus simples
pour être plus d'autre en l'état
maintenant, qui peuvent être appliqués
en même temps, à ceux de la
haine.

Ces instruments - usent de deux
deux simples canules, dans l'une des 592
quelles se trouve une petite pince,
destinée à embrasser le fil. Dans
l'autre pour faire la ligature, puis
démontée.

Voici la manière d'opérer de
cette façon. Pour cela il s'agit que
de passer d'abord un fil dans la
capule, qui y étant, on enfait
une des extrémités au plat de la
et l'engage avec les deux autres
autres fil qui est destiné à former
une anse. Dans les mors de la
pince, qui se trouve dans une autre
canule on nous l'avons dit, en ayant
soin que l'anse soit placée de telle
sorte qu'elle corresponde à l'autre canule,
que l'on tient en tirant par
son extrémité, qui en rapproche les
mors.

Les instruments ainsi armés les
trois bouts du fil se laissent d'une
part rapprocher, contre la canule,
tenue de manière à ce qu'ils ne puissent
pas, puis l'autre bout du fil qui
se trouve passé dans la canule et
dans la pince également saisit, on

342 les poste sur la racine du Polype,
on ayant baillé un jâlit interne,
par l'intermédiaire du fil entre les instruments,
et étant parvenu, on tient fixe la
pièce de la main gauche, tandis
que de l'autre on entoure le Polype
avec le fil, qui étant parvenu vers
l'autre, on le dirige en dessous, de
manière à entourer toute la circonférence
du Polype avec. Cela ainsi fait,
on le donne à tenir à un aide
pendant que l'on prend l'écou du
fil indigène, maintenant par la pièce
que l'on dirige de manière à y faire
paraître la saute que l'on tient,
Cela fait, une fois qu'elle y est, on
tire les deux extrémités de la même
fil qui forment l'aiguille, après avoir
l'écou le mors de la pièce, en la pointant
en haut, et non le bout de l'aiguille
qui se trouve dans la cavité, ainsi
l'aiguille parvient en haut de cette
dernière, qui se saute le fil
qui en les tirant toujours (Redoublant
l'aiguille de l'aiguille) l'autre, attendu
qu'il ne se trouve aucun par
rien, ou qu'on l'a baillé aussi de

la main gauche, ainsi tiré, le §13
folique se trouve toujours embrassé
qui pour y maintenir ou le déter-
miner, avec quoi on tire le col
du folique jusqu'à l'achute, un peu de temps
toute la journée. 25 prairial

De l'opération Césarienne et
de la symphyse
C'est une opération que chez les femmes
dans le cas d'obstruction, quand les
seuls efforts de la nature n'ont pas
puient procurer l'enfant.

1.^{re} Cette opération ^{césarienne} que a été encore
appelée hystérotomie consiste à ouvrir
la matrice, pour en extraire un enfant
qui ne peut être expulsé. On y
rapporte la gastrotomie, quand pratiquée
quand l'enfant est hors de la matrice.
Dans l'obstruction d'opération Césarienne
Vaginale, qui consiste dans l'ouverture
de la matrice par le vagin, lorsque
son orifice est obstrué.

2.^{re} La section de la symphyse n'est
plus usée ancienne, elle fut faite par
un nommé Legault, qui dans d'autres
fut conduit par l'opinion de ceux qui
la préféraient, mais elle ne compte depuis
lui que peu de partisans.

314 Ces deux opérations ne se pratiquent
que dans le cas de rétrécissement du p^{er}
que l'infant doit traverser d'ailleurs
pour des cas particuliers, l'est aussi que
l'opération Césarienne est nécessaire quand
il y a brèche de la matrice, mais alors
l'opération s'opère avec quelques modifications
quand l'opération de la symphyse
est indiquée pour la rétroversion de la matrice
q^{ue} ne l'aît pas encore pratiquée dans
ce cas, pour lequel on a proposé encore
la ponction de la matrice, ponction
qui occasionne l'avortement et expose
la vie de la femme. La section de la
symphyse est encore tentée quand
quand la cavité que l'infant doit
parcourir est trop peu spacieuse
Au reste quand les efforts de la
nature, l'appelation des forces et
l'assistance pour les aider se ne peuvent
être employés, on ne peut avoir recours
qu'à des moyens directs, l'usage
de la tête agrandie des forces naturelles
pratiquée avec une route artificielle.
1^o quand on voit l'usage de la tête que
quand on est certain de la cause
du fœtus et encore elle est dangereuse
pour la mère.
2^o l'opération Césarienne, conçue

peut pratiquer une cautelectomie §15
Elle peut être employée dans
les cas, cependant elle est insuffisante
quand la tête est enclavée dans le
Bassin.

Cette opération a été pratiquée
très anciennement et même après
la mort de la mère, mais depuis
Bouvier n'a fait. Male vivant
et ce n'est que depuis trente ans
après, qu'on a voulu y substituer
la Symphyse.

Les suites de cette opération, considérées
par rapport à l'enfant, ne sont
nullement dangereuses au contraire
il en est même de risque que par
les voies ordinaires.

Par rapport à la mère, les
parties qu'on incise est extrêmement
dangereuse, cependant il est à
remarque que la moitié des
femmes, qu'on y a soumises, ont
survécu.

La section de la Symphyse est
indispensable, quand la tête est enclavée
dans le Bassin tant qu'on a les autres
cas, elle suffit et peut être employée

516. ainsi que l'opération Césarienne

Les suites sont plus craintes pour
l'enfant que dans l'hystérotomie; la
Mère après l'accouchement il n'y a guère
de distension des ligaments, il y a guère
d'écoulement de lait, l'enfant est immobile
trop tôt, l'état qui gêne la marche, cette
opération d'ailleurs est favorisée par
le relâchement presque constant des
lignes fibreuses, relâchement qui est tel
qu'on peut obtenir entre la symphyse
du pubis, un écartement de deux pouces
demi au moins.

Précaution de l'opération Césarienne

Il se saige que la femme soit couchée
naturellement placée sur un lit, au lieu
besoin pour la pratique que de se
faire transporter sur un lit, avec une éponge et
des bandes et des agitations pour la
précaution.

On doit pratiquer cette opération
tôt que le fœtus est dans le bassin, ou
après l'opération de l'écoulement de
l'écoulement, car dans le cas où il y a accouchement
de l'écoulement, l'écoulement, d'un autre côté
si on pratique l'opération, avant
que le corps soit recouvert de l'écoulement
l'écoulement sur elle même et l'écoulement
la recouvre presque à rim, d'autant

lipanchumet des années l'abbé de 517

explanchemet qui n'est pas fait à
prévision, au reste de la même manière
qu'on fait l'opération, il faut
tout d'abord examiner la nature de l'opération

L'opération Césarienne se fait de
deux manières, on effectue tantôt une
divise l'abdomen longitudinalement,
tantôt transversalement, cette dernière
manière a été pratiquée par les
premiers fois par les Egyptiens, il y a
à peu près vingt ans.

Quand on la première manière
d'opérer la matrice se trouve
divisée longitudinalement, elle
est divisée en deux parties ou lobes
côtés, au bout externe des muscles
droits au bas la ligne blanche.

La première partie à dire incomplète,
en effet si l'on divise un bœuf de
la ligne blanche antérieure à l'ombilic
de 8. on se considère et on voit
que la matrice est susceptible de
mouvements de torsion, elle peut être
au reste dans le lieu où elle se trouve
le plus de saillies importantes.
La 2^e partie est attribuée à
Platon, ensuite des écrivains paracelsus,

Si 18 c'est évident que l'on voit le plus
communément en usage, quoiqu'il n'en
ait rapproché de l'opération de l'opération
autonne dans la Matrice à l'épave
dans l'épave.

Quant à l'opération de l'opération
l'épave, elle consiste à diviser les
parties molles de la Matrice en
faisant une incision étendue depuis
le ~~col~~ externe de l'utérus jusqu'à
jusqu'à l'entrée d'un incision
qui doit s'ouvrir à sept pouces
C'est incision à l'avantage, en ce que
dans le cas, la section de la Matrice
est faite plus facilement, & par
l'incision faite sur l'os de l'utérus
est de la plus grande utilité
pour l'épave des fluides. Mais
on a fait à cette manière d'incision
beaucoup de reproches qu'à celle qui
se pratique sur les parties molles
est à dire de diviser les vaisseaux
du sang.

Quant à la manière d'opérer
pratique l'opération, voici les règles
qu'il faut observer pour faire l'incision
de l'abdomen. Il faut que les parties
soient préalablement lavées, l'incision
se fait avec un bistouri cannelé,

amène à lui donner une longueur de 319
lig à sept lignes.

Les parois abdominales divisées il faut
explorer les parties pour voir si l'on
présente par d'autres organes que la
Matrice, si celle-ci est le seul
seul au praticien le second temps
en faisant une incision à son pôle,
puis on agrandit l'ouverture avec une
Bistouri bantanne, en le prolongant
toujours du côté du pôle de la
vagina pour ménager le plus possible
la partie inférieure.

Il faut aussi éviter le rhagisme
par la lésion du placenta, ce qui n'est
pas toujours possible, ou si après
l'incision ou la résection, il faudrait
le décoller, lorsque l'incision est faite
et les sangs ne s'écoulent pas, elles
partent à l'instant par l'ouverture
et s'écoulent et on doit aussi en même
temps faire l'extirpation du fœtus.

L'opération terminée on presse les
parois de l'abdomen fortement, mais
comme il faut se faire un pressement
dans l'abdomen après la réunion de la
plaque on doit favoriser l'écoulement
des loches en dilatant le col de la Matrice.

520 et faubert médecine vire d'innu
l'achies.

Opération de la Symphyse. Cette
opération ne s'est pratiquée sur
aucun grand nombre de fois que la
présente, même un virgast d'innu
une description bien exacte, qu'il est
fait lorsqu'on voit la symphyse, il est
exposé le Rectum et le Vagin et l'air
un algat dans l'utero pour l'éloigner
de la symphyse et éviter l'opération.

Le Malade est tenu comme pour
l'opération. Le Chirurgien au cas de
finir, et le chirurgien place entre
les jambes de la Malade, porte le
doigt dans le Vagin pour l'écarter
l'endroit où existe la symphyse, et
il divise les ligaments en faisant une
incision p. m. suivant l'embouchure
ou la poignée de la femme, mais
ordr. elle s'étend jusqu'à la cavité
des grandes lèvres, en ayant soin
d'éviter le Clitoris, et d'être gel
fait faire l'incision au lieu de l'autre
Après avoir ainsi pratiqué l'opération
avec un fort bistouri, comme
on ne tremble pas précisément trop

sur la lymphée, on cherche avec l'instrument 521
l'endroit de son existence, on s'aperçoit qu'on
la trouve par une pénétration facile; On divise
alors, non seulement la lymphée, mais encore
le ligament triangulaire, à l'instant même de
la division. Il s'établit un écartement entre les
deux os, mais il faut quelquefois l'augmenter, en
faisant exécuter aux cuisses, de légers mouvements
de circumduction; une fois opérée, la lymphe s'écoule
se présente; il faut laisser à la nature, le soin de
sa expulsion.

Si la mère étoit affaiblie par l'opération,
ou que l'enfant se présente de travers, ou par les
fesses, ou termine l'accouchement par les pieds,
ou le fœtus, l'enfant s'accouchement fait,
on applique un bandage de corps autour du
bassin, pour maintenir le fœtus lymphée dans
un contact immédiat quand aux parties molles,
on les maintient par des bandes à torsion agglutinatives.

Cours terminé en 315 leçons, le vingt six -
septième au treize, ou bien en huit ou quatre,
de l'ancien calendrier.

Table Des matières contenues

Dans le troisième tome.

De la continuation des maladies De l'organe De l'oeil De la vue.	1
De l'ophtalmie Du globe De l'œil	2
De ses végétations	3
Des ses phtisiques et Dépôts	4
De leucome	5
De unguis	6
De l'albugo	7
De phtisique	8
Des Vues de la cornée et de la sclérotique	9
De la proéminence De l'iris	10
De la hernie de la corne	11
De la cécité	12
De l'aphakie	13
De l'hyposphalie	14
De l'ophtalmie	15
De l'hydrophthalmie	16
De la cataracte	17
De l'opération De la cataracte	18
De l'inflammation De l'œil	19
De son saignement	20
Des maladies résultantes du trouble des fonctions	21
De la Myopie	22
De la presbytie	23
De l'astigmatisme	24
De la mydriase ou vue de nuit	25
De l'hypermétropie ou vue de jour	26
De la faiblesse de la vue	27
De l'amorose ou goût de saumure	28

Des maladies de l'organe de l'ouïe	53
A. Des maladies originelles	ib.
De l'oblitération du conduit auditif	ib.
De l'oblitération de la trompe d'Eustache	54
De la surdité amovible dans le conduit auditif	ib.
B. Des maladies organiques	55
De l'inflammation du conduit auditif	ib.
De ses dépôts	57
Des excroissances fongueuses	58
De l'accumulation du fluide muqueux dans la	
cavité du tympan	59
De l'inflammation de la même cavité	ib.
Des dépôts	61
C. De les maladies par trouble de fonction	ib.
De la surdité	ib.
Des maladies de l'organe de l'odorat	66
A. Des maladies originelles	ib.
De l'oblitération des fosses nasales	ib.
B. De les maladies organiques	67
Du nez	ib.
De l'épistaxis	68
Du gonflement de la membrane muqueuse	
nasale	70
Des ulcères des narines	71
De leurs polypes	73
Des vers et sinus frontaux et maxillaires	81
Des os	82
Des fongus des sinus maxillaires	84
Des maladies du Cerveau	87
A. De les maladies originelles	ib.
De l'épilepsie	ib.
B. Des maladies organiques	88
Des excroissances au fongus de la dure-mère	ib.

De ses convulsions étouffées	92
De l'hydrocephale	93
De l'hydrocèle ou spina bifida	94
Des maladies du larynx	95
A De ses maladies originelles	96
Il n'en existe point	97
B. Des maladies organiques	98
De l'angine laryngée	99
Du croup	100
Des rétrécissements du larynx	101
De la laryngite et de la trachéite	102
C. Des maladies par trouble de fonction	103
De l'augmentation, diminution et de la suppression	104
De la voix	105
Des maladies de l'appareil locomoteur	106
Des maladies des muscles	107
A Des leurs maladies originelles	108
Il n'en existe pas	109
B. Des leurs maladies organiques	110
Des contractures angineuses	111
De la paralysie cérébrale	112
De la paralysie nerveuse	113
De la paralysie musculaire	114
Du traitement des paralysies	115
Des paralysies suivant l'espèce de muscles affectés	116
De la paralysie de la langue	117
De la paralysie de la face	118
De la paralysie du larynx	119
De la paralysie du muscle sternomastoïdien	120
Des contractures en général	121
Des contractures cérébrales	122
Des contractures nerveuses	123
Des contractures musculaires	124

[illegible]


De l'écoulement des larmes	80.
Des aptitudes de la langue	216.
De l'usage de la langue	16.
Du gonflement de la langue	218.
De la chute de la luette	219.
De l'engorgement des amygdales	216.
De l'écoulement des dents et de leur usure position et direction	220.
De la carie et marote des dents	14.
De l'oedème	22.
De l'érythème des dents	22.
De l'écoulement des dents	22.
De l'arrachement des dents	22.
De l'implantation dans les dents ou cavités	16.
De l'inflammation des gencives	220.
De l'écoulement des gencives	16.
De la gangrène des gencives	224.
Des ulcères de l'intérieur de la bouche	229.
Des tumeurs fréquentes de la bouche	230.
De la gorge et du pharynx	231.
Des obstacles qui s'opposent à l'alimentation de la bouche à l'estomac	231.
De l'imperforation du rectum	236.
Du gonflement de la membrane muqueuse du rectum	238.
De la chute de l'anus	239.
De l'inflammation de la membrane muqueuse du rectum	240.
Des fissures du rectum	16.
Des hémorrhoides	16.
De l'hygiène du rectum	240.
Des vices de l'alimentation	240.


Des fistules des intestins	244
Des anus contre-nature	245
Des fistules du rectum	247
De la continence des matières fécales	258
De la continence des matières fécales	259
De l'hydropisie du bas-ventre et des organes	260
Des maladies de l'appareil respiratoire	262
	26
De l'hydropisie thoracique	263
Des maladies de l'appareil circulatoire	26
De l'hydropisie cardiaque	264
Des maladies de l'appareil lacrimale	26
A. De ses maladies originelles	26
B. De ses maladies organiques	265
De l'inflammation et du squirre de la glande lacrimale	26
De l'obstruction des points lacrimaux	266
De l'écoulement des points lacrimaux	267
De la fistule lacrimale	268
De l'épiphora	269
De la rétention des larmes dans le sac lacrymal	270
Des maladies de l'appareil salivaire	271
A. De ses maladies originelles	272
B. De ses maladies organiques	273
De l'inflammation de la glande parotidienne ou de l'écoulement	274
De la tuméfaction et du squirre de la glande parotidienne	275
De la glande parotidienne	276
C. De ses maladies rendant augment de fonction	277
De la glande parotidienne	278
De la fistule du conduit parotidien ou de la glande parotidienne	279
Des maladies de l'appareil salivaire	280
A. Des maladies originelles	281
B. Des maladies organiques	282
C. Des maladies rendant augment de fonction	283

B. De ses maladies organiques	295
Des abcès du foie	296
Des abcès du péricard	299
De la rétention de la bile	299
Des maladies de l'appareil urinaire	300
Des maladies primitives	301
De l'écoulement et de la diminution du nombre des urines et des uréliques	301
De la suppression de la vessie et de son nombre double ou triple	302
B. De ses maladies organiques	306
De l'inflammation de la membrane séreuse de la vessie	307
Des dépôts de la vessie	308
Des calculs charnus de la vessie	308
De l'obstruction de la capacité de la vessie	309
De l'inflammation de la vessie	310
De l'hémorrhagie vésicale	311
Des calculs vésicaux	312
Des tumeurs variqueuses vésicales	313
Des tumeurs et fongosités de la vessie	314
Des abcès de la vessie	315
Des calculs de l'appareil urinaire	316
Des calculs rénaux	317
Des calculs urétéraux	318
Des calculs vésicaux	319
De l'opération de la taille	320
De l'opération de la taille sous-ombilicale	321
De l'opération de la taille	322
De l'opération de la taille	323
De l'opération de la taille	324
De l'opération de la taille	325
De l'opération de la taille	326
De l'opération de la taille	327
De l'opération de la taille	328
De l'opération de la taille	329
De l'opération de la taille	330
De l'opération de la taille	331
De l'opération de la taille	332
De l'opération de la taille	333
De l'opération de la taille	334
De l'opération de la taille	335
De l'opération de la taille	336
De l'opération de la taille	337
De l'opération de la taille	338
De l'opération de la taille	339
De l'opération de la taille	340
De l'opération de la taille	341
De l'opération de la taille	342
De l'opération de la taille	343
De l'opération de la taille	344
De l'opération de la taille	345
De l'opération de la taille	346
De l'opération de la taille	347
De l'opération de la taille	348
De l'opération de la taille	349
De l'opération de la taille	350
De l'opération de la taille	351
De l'opération de la taille	352
De l'opération de la taille	353
De l'opération de la taille	354
De l'opération de la taille	355
De l'opération de la taille	356
De l'opération de la taille	357
De l'opération de la taille	358
De l'opération de la taille	359
De l'opération de la taille	360
De l'opération de la taille	361
De l'opération de la taille	362
De l'opération de la taille	363
De l'opération de la taille	364
De l'opération de la taille	365
De l'opération de la taille	366
De l'opération de la taille	367
De l'opération de la taille	368
De l'opération de la taille	369
De l'opération de la taille	370
De l'opération de la taille	371
De l'opération de la taille	372
De l'opération de la taille	373
De l'opération de la taille	374
De l'opération de la taille	375
De l'opération de la taille	376
De l'opération de la taille	377
De l'opération de la taille	378
De l'opération de la taille	379
De l'opération de la taille	380
De l'opération de la taille	381
De l'opération de la taille	382
De l'opération de la taille	383
De l'opération de la taille	384
De l'opération de la taille	385
De l'opération de la taille	386
De l'opération de la taille	387
De l'opération de la taille	388
De l'opération de la taille	389
De l'opération de la taille	390
De l'opération de la taille	391
De l'opération de la taille	392
De l'opération de la taille	393
De l'opération de la taille	394
De l'opération de la taille	395
De l'opération de la taille	396
De l'opération de la taille	397
De l'opération de la taille	398
De l'opération de la taille	399
De l'opération de la taille	400

De la Effluuation de la verge	16
De l'ouverture naturelle de l'organe mâle	17
De l'achèvement du frot de la verge	18
De l'écoulement de la verge	19
De l'hypospadias	20
De l'epispadias	21
De l'ectopie de la verge	22
De l'ectopie de la verge	23
De l'ectopie de la verge	24
De l'ectopie de la verge	25
De l'ectopie de la verge	26
De l'ectopie de la verge	27
De l'ectopie de la verge	28
De l'ectopie de la verge	29
De l'ectopie de la verge	30
De l'ectopie de la verge	31
De l'ectopie de la verge	32
De l'ectopie de la verge	33
De l'ectopie de la verge	34
De l'ectopie de la verge	35
De l'ectopie de la verge	36
De l'ectopie de la verge	37
De l'ectopie de la verge	38
De l'ectopie de la verge	39
De l'ectopie de la verge	40
De l'ectopie de la verge	41
De l'ectopie de la verge	42
De l'ectopie de la verge	43
De l'ectopie de la verge	44
De l'ectopie de la verge	45
De l'ectopie de la verge	46
De l'ectopie de la verge	47
De l'ectopie de la verge	48
De l'ectopie de la verge	49
De l'ectopie de la verge	50
De l'ectopie de la verge	51
De l'ectopie de la verge	52
De l'ectopie de la verge	53
De l'ectopie de la verge	54
De l'ectopie de la verge	55
De l'ectopie de la verge	56
De l'ectopie de la verge	57
De l'ectopie de la verge	58
De l'ectopie de la verge	59
De l'ectopie de la verge	60
De l'ectopie de la verge	61
De l'ectopie de la verge	62
De l'ectopie de la verge	63
De l'ectopie de la verge	64
De l'ectopie de la verge	65
De l'ectopie de la verge	66
De l'ectopie de la verge	67
De l'ectopie de la verge	68
De l'ectopie de la verge	69
De l'ectopie de la verge	70
De l'ectopie de la verge	71
De l'ectopie de la verge	72
De l'ectopie de la verge	73
De l'ectopie de la verge	74
De l'ectopie de la verge	75
De l'ectopie de la verge	76
De l'ectopie de la verge	77
De l'ectopie de la verge	78
De l'ectopie de la verge	79
De l'ectopie de la verge	80
De l'ectopie de la verge	81
De l'ectopie de la verge	82
De l'ectopie de la verge	83
De l'ectopie de la verge	84
De l'ectopie de la verge	85
De l'ectopie de la verge	86
De l'ectopie de la verge	87
De l'ectopie de la verge	88
De l'ectopie de la verge	89
De l'ectopie de la verge	90
De l'ectopie de la verge	91
De l'ectopie de la verge	92
De l'ectopie de la verge	93
De l'ectopie de la verge	94
De l'ectopie de la verge	95
De l'ectopie de la verge	96
De l'ectopie de la verge	97
De l'ectopie de la verge	98
De l'ectopie de la verge	99
De l'ectopie de la verge	100

De l'Inflammation intérieure des mamelles - - -	478
De l'Inflammation des mamelles - - -	479
De l'Amas graisseux des mamelles - - -	480
Des Dépôts lactés des mamelles - - -	483
De la cancer des mamelles - - -	483
Des maladies des organes génitaux de la femme proprement dits - - -	490
A. De leurs maladies originelles - - -	491
De la lèpre extraordinaire des grandes lèvres &c. - - -	494
De l'augmentation de Volume du clitoris - - -	495
De l'imperforation de l'hyman - - -	496
B. De leurs maladies organiques - - -	496
Des Dépôts des grandes lèvres &c. de leur cancer &c. &c. - - -	497
De l'ortie vaginale - - -	497
De l'Élimination - - -	498
De l'antiversion et rétroversion - - -	498
De l'augmentation de la matrice - - -	499
Des polypes de la matrice - - -	500
De l'opération péritonéale et de la hystérectomie - - -	501
Des polypes de la Matrice - - -	501
Des polypes de la Vessie - - -	501





MS.
B
302
V.3

